






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2806/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2806/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2806/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2806/A

coll.

2806

A.

N XIV

16/8

imp. Det. 36.

DE STIRPIVM COLLECTIONE TAB


BVLAE TVM GENERALES,
TVM PER DVODECIM MEN-
ses, cum Germanicis nominibus, & alijs ha-
ctenus à nemine traditis, olim per Conra-
dum Gesnerum conscriptæ ac æditæ: nunc
aut oris opera locupletatæ, & de no-
uo in vsum Pharmacopolarum
luci datæ,

PER CASPARVM WVOLPHIVM
Tigvinum Medicum.

ACCESSERVNT DE STIR-
pibus & earum partibus tabulæ ex Theo-
phraستي præcipuè libris confectæ,
eodem Gesnero authore.

TIGVRI
IN OFFICINA FROSCHO.
ANNO M. D. LXXXVII.

26. n. 17.



CASPARVS VVOL

PHIVS TIGVRINVS MEDICVS,

D. LVCAE STOECKLIO PHAR-

macopolæ Constantiensi fideli & in-

dustrio, amico suo

S. D.



VANTVM in medicamento-
rum, quæ in vsum medicum ad-
uocantur, tum in vniuersum o-
mnium, tum verò potissimum
stirpium ipsarum, exacta cogni-
tione situm sit, id ipsum, vir industrie, abunde
testatur, non solum ea voluptas, quæ foris ocu-
los, & animum intus mirificè afficit atque ob-
lectat, & præterea honestas, quæ ex cognitione
manat, & sola hominis est ornamentum: verum
insuper & quidem cumprimis hæc ad benè fæ-
liciterq; viuendum utilitas, qua nihil magis se-
cundum naturam est. Quum enim Deus Opt.
Max. pro sua diuina prouidentia facile nouis-
set, quis esset futurus hominis status aut condi-
tio, quæne in morbos præceps & perpetua rui-
na: varijs hisce morborum incommodis, varia
quoque, eademq; admirandis viribus prædita
antidota statim opposuit, ne qui modò in lucem
esset æditus homo, aut per omnem reliquam vi-

EPISTOLA.

tam misere degeret, aut penitus ab exortu statim succumberet atque periret. Quin insuper eadem etiam, et ea ipsa cognoscendi, recteque ipsa utendi notitiam studiumque ingenuit: quod propensissimae erga nos suae voluntatis argumentum est. Hinc nimirum, quia maximam esse huius cognitionis praestantiam paulatim homines persentirent, eorundemque usu, naturae humanae imbecillitati subsidia magna comparari, quotidianum comprobaret experimentum: factum est, ut omnis generis et conditionis, summae, infimae, homines: ὥς φιλοῦσι αὐτὰς πᾶς ἀνθρώπος καὶ οὐδεὶς τὴν ἑστίαν, quotidie ad observandum, et amplius experiendum studio et animi quasi quodam impetu ferrentur: id quod multorum nostri et superioris seculi scripta selecta luculenter testantur. Nam quia haec materia varia et multiplex, proindeque non uno tantum modo afficiat, delectet, et ad sui cultum inuitet: pro cuiusque ingenio et voluntate, modo haec eius partem, modo illam familiarius tractare, studioseque excolere singuli instituerunt: Sunt etiamnum, et ante haec fuerunt tempora multi, qui externa tantum stirpium facie oblectati, sexuum inuenerunt discrimina, partium singularum lineamenta curiosius obseruarunt, et singulis ingeniosas insuper descriptiones affinxerunt: quae profecto

EPISTOLA.

profecto cōtemplatio, vti per se est iucunda gra-
 taq̃, ita quoq̃, in medico vsu, sua non destituitur
 vtilitate. Plurimos contra videas admirari,
 reconditam illam interius, penitusq̃, abditam
 formam. solam miraculorum omnium, quæ ho-
 die in medicina passim & multa & magna fi-
 unt, effectricem causam: facultates dico, cum
 específicas & occultas, tum manifestas, hoc est,
 primas, & eas quæ has proximè sequuntur. Atq̃
 hi quidem, dum quod querendo experiendoq̃
 sunt consequuti, omne ad communē vitæ vsum
 contulerunt, laude egregia apud quoscunq̃ sunt
 conspicui, inter doctos verò amplissimis dignita-
 tum titulis clari. Caterum ad comparandam
 absolutam huius contemplationis studiūq̃ noti-
 tiam (dummodo quod profuturum nouimus, ad
 vsum vitæ conferendum quoque arbitremur)
 præterea etiam requiritur diligens & accurata
 Præparatio: & qui hanc rectè præcedit, in col-
 ligendo asseruandoq̃, cum ratione Delectus: in
 quibus duabus partibus, commentando exor-
 nandoq̃, haud perinde multos speciatim labo-
 rasse nouimus. Quantum verò referat, quamq̃
 sit necessaria tum Medici tum Pharmacopœ
 diligens & exquisita circa stirpiū, earundemq̃
 partium ad vsum collectionē conseruationemq̃
 industria, (de præparandi namq̃ ratione hoc
 loco non agimus) sæpe hætenus ipse nos rerum

EPISTOLA.

euentus satis superq^{ue} docuit. Qui enim hac in
 parte committuntur errores, quæ temporis lo-
 ciq^{ue} curiosam rationem & tempestiuam expo-
 scunt obseruationem, plerunq^{ue} non ægri solùm
 valetudinem in discrimen vocant, sed ipsius
 quoq^{ue} medici, quantumuis præstantis famæ exi-
 stimationiq^{ue} periculum creant, nec nisi peruenien-
 do, quicunq^{ue} sic error commissus fuerit, corrigi
 potest. In grauem errorē inducunt, nostramq^{ue} ex-
 pectationē prorsus decipiunt compositorum vi-
 res, si, quibus ea constant, facultates ignauæ &
 inertes, aut prorsus obsoletæ fuerint. Proinde
 non sine ratione Galenus in Theriacæ compo-
 sitione, simplicia omnia & quidem singula seor-
 sim eam componentia, diligenter exploranda
 præcipit: ne tota antidotus inutilis reddatur:
 ἢ ὡς ἐν τῷ τὸν δὲ γὰρ, inquit ille, πολλὰ καὶ
 διαφθείρεται πάντα. In idē studiū nobis quoq^{ue},
 quotidie medicamenta præscribentibus, incum-
 bendum est, vt ea, si modo profutura speremus,
 theriacæ nomen & antidoti, contra præsentis
 morbi vim, habeant, ea tantū assumendo, quæ
 fuerint viribus integra, & in suo genere præ-
 stantia. Quid enim quæso attinet, simplicium fa-
 cultates nouisse, si nullæ insint? putare autem
 inesse, quum non insint, quod colligentis siue in-
 scitia siue negligentia, non naturæ vitio acci-
 dit, viri

E P I S T O L A.

dit, viri prudentis non est. Magna igitur medicina nostræ pars in medicamentorum delectu posita est, maior medici gloria, & maxima eorum spes. Solatium ingens est ægrotis, si medicamentorum auxilia præsentia esse viderint: in maiorem verò spem eriguntur, quum de inuentis præscriptisq; remedijs, & eorum integritate nihil penitus sibi dubitandū nouerint. Hæc aliaq; cum satis nota essent Gesnero nostro, putauit suo labore & studio huic necessitati obuiam eundum. Quare ante multos annos, de herbarum, florum, fructuum, &c. colligendi tempore, & conseruandi reponendiq; modo & loco, tabulas generales & particulares edidit, breues quidem illas, pro occasionis nimirum præsentis ratione, alterius verò operis, & plenioris considerationis, quasi quoddam rudimentum. Atque hoc suum propositum persequutus procul dubio fuisset, si Dei voluntate ætas ei fuisset prorogata. In eum namq; finem, paulatim plura obseruare & consignare cœpit, quæ ad locupletandū exornandūq; priorem laborem spectabant. Verum haud incommodè, quum per fati necessitatem suum perficere institutum ipse prohiberetur, voluntatem eius promouit hoc tempore, quo res necessariae omnes in angustum sunt contractæ. Typographus noster, qui, vt interea dum ad Germanorum πτυογραφικ ipse descendit, in suori

EPISTOLA.

operariorum gratiam, ut illorum nimirum domesticam necessitatē subleuaret, hunc qualemcunque à me flagitando, impetrauit. Quaecumque igitur ipse vel studio obseruauit, vel quotidie in hortulo proprio producta vidit, eadem nos, pro ut ipse instituerat, duplici ordine, secundū florum fructuumque tempora disposuimus. Alphabetice primum: ita enim initia & fines florendi, fructificandi, commodè indicari, & quæ de vna stirpe hacenus diuersis in locis scripta legebantur, coniuncta & simul apparere, putauit. Deinde verò iuxta primum institutum, sed breuius, etiam secundum Menses, adiectis plerisque Germanicis appellationibus. Ad generalē verò tabulam accessit, ex clarissimi Matthioli in Dioscoridem commentarijs, de eodem argumento, quod placere poterit. In frontem insuper totius libri retulimus generales aliquot de stirpibus, ex Theophrasti magna ex parte libris, depromptas tabulas, nec inelegantes nec inutiles: quas, si per paginae spacium licuisset rectius diducere, & membra membris opponere, multò elegantiores & ad vsum aptiores apparerent. Cæterum hunc Gesneri libellum, & meum in eundem collatum laborem, tibi vir spectatissime, offero & multis de causis dedico. Ac primo quidem, quod cognitum habeam, te authoris, quandiu in viuis esset & obseruatorem semper
& ami-

EPISTOLA.

*Et amicum extitisse. Deinde, ut quoniam hic
 liber præcepta & instituta præscribit, quibus
 futuri Pharmacopolæ instruendi informandiq;
 sunt: tuq; ipse eius artis usu excellis, præceptisq;
 egregiè præ cæteris abundas: per te tyrones non
 officij solùm sedulò admoneantur, sed tyrocinij
 sui etiam rudimenta deponant, rectiusq; ad pra-
 xim accedant. Ad has accedit præterea etiam
 ea, quam ipse iam pridem tum domi tuæ lautè
 accipiendo, tum hic familiariter conuersando,
 multis tuis humanitatis & beneuolentiæ offi-
 cijs mihi præbuiisti. Ne itaq; ingratus omnino
 videar, meam vicissim tibi hoc ipso probatam
 volui voluntatem. Rogo igitur te, ut hanc qua-
 lem cunque animi grati significationem, hilari
 vultu excipias, & boni consulas. Vale.*

Tiguri calendis Maij, anni

1587.

* 5

CONRADVS GESNERVS M B
dicus Tigurinus Nicolao Speichero
pharmacopolæ Argentinensi
peritissimo S. D. P.

DAuid Kyberus Argentinensis, felicis memo-
riæ vir optimus & doctissimus, diligentissi-
mo suo Rei herbariæ Lexico Tabulas temporum,
quibus singule stirpes florent aut fructum æde-
rent, ceu corollarium adiungere statuerat: id verò
eius propositum mors immatura interceptit. Huic
igitur ego suauissimæ amici memoria inuitatus, vt
aliquo modo satisfacerem, quantum per occupa-
tiones meas licebat, eiusdem argumenti Tabulas
conscripsi. Tibi verò in primis, optimè Nicolæ,
nuncupare eas volui, non tantum quod professioni
tuæ, in qua excellis, coueniant, tuq; easdem ali-
quando augere ac perficere possis: sed magis quia
Kyberus utriq; nostrum amicissimus fuit, vt eius
amissi hoc veluti solatium quoddam haberes, &
me quoq; propter communis amici memo-
riam amares. Vale Tiguri anno Salu-
tis 1553. pridie Nonas Aprilis.

DE

DE VSV HARVM TAB-
ularum.

ABVLAE istae non pharmacopo-
lis tantum, tyronibus praesertim &
minus exercitatis, utiles sunt futu-
rae, sed omnibus stirpium notitiae
studiosis. Qui cum singulis fere mensibus ver-
nis, aestiuis & autumnalibus, partim cognitio-
nis, partim animum remittendi & corpus ex-
ercendi gratia, rusticatum exire soleant, occa-
sionem ex hisce tabulis capient, quanam eis
plantae potissimum quaerendae aut sperandae
sint. Libuit autem non medicis tantum vsitatas
stirpes, & quarum necessaria pharmacopolis
est cognitio, hic enumerare, sed quasuis simpli-
citer quae nunc in mentem mihi venire potue-
runt: & de quibus mihi quo tempore florerent
aut fructificarent constabat, reliquas sibi quis-
que suo loco addet, vel nos aliquando si vita
diuinitus prorogetur: neque enim vnus aut
alterius anni hoc opus est. Atque ita non me-
dicinalis tantum haec per anni tempora dige-
stio stirpium fuerit, sed etiam physica & philo-
sophica. Sic Theophrastus & Plinius non re-
medijs modo quaesitas, sed omne genus stir-
pium, cum aliter tum secundum tempora qui-
bus quaeque florem & fructum addunt diffe-
rentijs, descriperunt. Sed quoniam caeli &
regionum discrimen facit, ut plurimae descri-

ptæ à veteribus stirpes apud nos non proue-
niant, & illarum quæ proueniunt tempora nō
respondeant, operæpretium visum est vt nas-
centium apud nos siue sponte, siue satione tem-
pora distincta notarentur. Scio etiam in vna
eademq; regione diuersitatem reperiri. Diffe-
runt enim in singulis loci, humiles, æditi, aqui-
lonares, austrini, opaci, aperti, vmbrosi, apri-
ci, vento expositi, tecti vel non expositi, a quo-
si, aridi. Memini ego me in altissimis monti-
bus Augusto mense & autumnii initio, eadem
ferè omnia quæ in planis Aprilj & Maio nas-
cuntur, reperisse, violas florentes & varios
flores vernos, fraga maturescencia & matura,
&c. Quin & pro annorum diuersitate hyems
aliàs magis, aliàs minus extenditur, & annus
alter altero magis minúsue pluuius est. Itaq;
fit vt nihil his de rebus omnino constans &
perpetuum tradi possit. Rursus verò non adeò
incerta hæc ratio est, vt nullum in ea descri-
benda operæpretium habeatur. Quamobrem
volui pro vnius regionis, hoc est Germaniæ
nostræ, vsu, has tabulas conscribere, partim ex
observationibus meis cum alijs tum ambula-
tionum & rusticationum mearum, partim ex
Collectaneis amici cuiusdam philiatri, qui
quo stirpes quæque florem fructumq; æde-
rent tempore ex Hier. Tragi & Leon. Fuchsi
illustribus per Germaniam nostram scriptori-
bus, per singulos menses annotarat. Quòd si
non

non per omnia satisfecerit hæc diligentia no-
stra pharmacopolis cæterisq; rei medicæ stu-
diosis, cogitent hanc lucubrationem hac de re
& primam & extemporaneam esse, & sibi
quisque ubi voluerit vel emender vel augeat.
Nullo enim periculo tum omittere multa, tum
labi in quibusdam, hisce tradendis potuimus,
vt facilius nobis non dico venia danda (neque
enim grauibz istis & vt sibi videntur doctis-
simis scribimus, à quibus exoranda sit venia,) .
sed potius gratiæ agendæ sint à candidatis me-
dicinæ & benignis ac æquis lectoribus. Cæte-
rum vt pluribus prodessem, non singularum
duntaxat stirpium tempora, sed insuper com-
munes quasdam obseruationes statim ab initio
proponere visum est, vt appareat minimè no-
bis placere pharmacopolas collecturos certis
anni temporibus astrictos esse. Et quanquam
illi quibus generalis hæc colligendi doctrina
intellecta fuerit, singularium enumeratione
non admodum indigeant, arbitratus sum
tamen eam quoque nec iniucundam
nec prorsus inutilem futuram.

ACHILLES P. GASSARVS L.
medicus, Conrado Gesnero medico.

CVM aliud nunc opere precij ad te
scribendi non habeam, Conrade do-
ctissime idemq; amicissime, volui saltem
veteris nostri amicali carmina ista ad te
mittere, vt simplicibus tuis vel extremo fo-
lio adderes. Bene vale cum tuis omnibus.

CARMEN IO. MOIBANI MEDI-
ci doctoris Augsburgenſis, continens ca-
talogum medicamentorum purgan-
tium simplicium, quorum nunc
vſus in Myropolijs eſt.

SVNT ſuſpecta ſatis Tithymallus & Eſula quævis
Et quod habet nomen flebile Dacridij,
Eſt Turbith turbans, ſic Hermodactylus is qui
Colchicon eſt, ſeruis pernicioſa ſalus,
Euphorbiq; liquor, ſed & Anticyræ medicamen,
Quodq; ſolet viduas reddere Mezereon,
Sic nec amara placet Colocynthis, & ipſe lapillus
Pulchro ſtellarum cœrulus igne micans,
Namq; hæc calloſus vel carice textus acuta
Venter, quo ferrum ruſtica turba coquit.
Aut ſtomachus ſimilis rugoſis arte cothurnis
Militis indomiti dira Aconita coquens,

Vix

Vix impune feret, vel si feret, ardua res sit,
 His quæ tormentis subdere colla iubet.
 ¶ Contra civili qui gaudent lege medendi,
 Et quibus haud vlla est poena luenda grauis.
 His plenis baccis frondescat Prunus in horto,
 Et placeat quiuis Irida murus habens,
 Et suaves spirent Violas in cespite prata,
 Ornent & pulchras pulchra Roseta domos.
 Nec desint Manna Calabrorum roscida mella,
 Et fuluum quod dat Barbara terra Rauced,
 Indorumq; Thamar, Balanusq; Aloëq; Cetrachq;
 Lymphatas undas & Galathea ferens,
 Soldanella, Filix, Ebulus, Sena, Cassia, Nitrum,
 Et veteris Galli mollia iura placent,
 Absinthi, Capniq; liquor, vel Agaricus illis
 Sit cura, tuto quis redimenda salus.

ERRATA CORRIGENDA.

ἀράκων, pag. 24. b. Differentiæ sunt, p. 22. a.
 in præfationem, p. 42. b. in pratis, p. 71. b
 Saurfle/ pag. 123. b.

CONRADI GESNERI DE PAR-

TIBVS ET DIFFERENTIIS

PLANTARVM PHYSICA SY-


nopsis, secundum Theophrastum, Plinium &

Dioscoridem: in tabulas methodicè dige-

sta, introductionis vice ad quas-

vis stirpium historias

legendas.



HILOSOPHI nostri omnē
ferè de plantis consideratio-
nem nō solum quæ historiam,
sed etiam quæ causas attinet,
partim ad rem medicam, par-
tim rusticam reiecissee videntur, vt in pleris-
que etiam alijs Philosophiæ amplissimam
professionem circumciderūt, vt ipsis, quan-
tumuis in paucis vtcunq; eruditi, philoso-
phos se profiteri minori negotio possent,
hoc est videri magis quàm esse,

PLANTA, stirps, *φυτόν*, corpus est na-
turale compositum, animatum, telluri ceu
parenti, vt alimentum continuè attrahat, af-
fixum, speciem suam de se propagans, loco
immobile, insensibile.

A

TABVLAE STIRPIVM

Stirpium aliæ sunt

Herbæ,

Frutices,

Minores,

Arborescentes.

Suffrutices, herbæ lignosæ, quarum cau-
les non pereunt quotannis.

Arbores

Iustæ

Fruticosæ.

Quædam fortè ad certum genus vix
referas, vt sunt Viscum, Fungi, Cora-
lium, Lens palustris.

DIFFERENTIAE STIRPIVM

unde sumantur.

Loci, à quibus stirpium & partium singula-
rum differentia sumuntur, in historijs
Dioscorid. Plinij, Theophra. &c. sunt vel
1 Substantia,

Secundum genera & species planta-
rum, vt

Arbor.

Herba.

Frutex.

Olus.

Legumen, &c.

Secundum

IN GENERE.

2

Secundum corporis cōstitutionem
& partium cōcrementum, οὐσαν, compactionem,

Durum.

Molle.

Densum.

Rarum, vel partium

Tenuium.

Crassarum.

Alias tactiles qualitates secundas,
Quod singulæ vel habent vel non ha-
bent partes aliquas.

2 Quantitas.

Numerus.

Magnitudo.

3 Qualitas.

Actu & sensibilis

Communis,

Figura

Similitudo

Vnius,

Duorum aut plurium,

Propria

Tactui

Graue, leue, Asperum, lene,

Durū, molle. Lubricū, aridū.

Crassum, tenue. Rarū, densū.

A 2

TABVLAE STIRPIVM

Visui

Fulgor.

Color.

Odori

Grauecolēs, virosum, fœtidū.

Inodorum,

Acre, acutum.

Odoratum,

Suauiſter, fragrans.

Caput tentans, grauans.

Gustui

Inſipidus, ἀποῖστος.

Dulcis.

Amarus.

Acris, acidus, &c.

Potentia & occulta qualitas. Ab inſito autem calore noſtro ex potentia in actum producitur.

Prima,

Calidum	ἡ	1. Obſcure.
Frigidū	π	2. Senſibiliter.
Humidū	σ	3. Vt ledat ſenſū.
Siccum	ρ	4. Vt deſtruat ſē.

In quarto gradu delibutoria,

δηλητήρια, venena ſunt.

Secundæ qualitates à medicis dictæ, omnes ſenſibiles ſunt, odorū præcipuè & ſaporum differentiæ.

Tertiæ,

IN GENERE. 3

Tertiz, quæ priuatim ad aliquam corporis partem aut morbum facit, propter qualitates, vel propter totam substantiam, & vim aliquam occultam, vnde dicuntur alia

Cephalica
Ophthalmica
Cathartica
Diuretica, &c.

4 Situs, locus natalis totius plantæ. Et partium situs singularum.

5 Tempus

Ortus

Occasus

Maturitas.

6 Actio, sed hanc inter qualitates retulimus, quæ si per verbum aut verbale actiuum efferatur, huc pertinet.

7 Vfus, ad aliquid, vt ad

Medicinam

Cibum

Potum

Condimenta & voluptatem

Alia diuersa, vt olea, &c.

Hominum

Brutorum.

TABVLAE STIRPIVM
DE STIRPIVM DIFFERENTIA
*quatenus vel hyemis ferunt inclemen-
tiam, vel non ferunt.*

Ex stirpibus sunt quædam, quæ hieme aut
Pereunt, idq; vel
Penitus & totæ, quarum multæ sunt.
Ex parte, idq; aut
Caule tantum, seruatis folijs circa ra-
dicem : cuius generis ferulaceæ
pleræq; puto sunt.
Folijs tantum, seruato caule, vt ple-
ræq; arborum, fruticum, & suffru-
ticum: Solanum perpetuum.
Floribus tantum: vt Leucoia.
Superficie tota, vt Inula.
Manent, idq; secundum
Totum, præterquam flore: sed consili-
go, elleborus, & paucæ aliæ etiam flo-
rent hyeme.
Partibus, vt supra dictum est.

PARTES STIRPIVM AN-
nua & caduca.

Præcipua, & propter quam cæteræ sunt, Se-
men seu fructus, σπέρμα, καρπός. Licet
fructus nomine ferè semen vnà cum am-
biente

biente pericarpio comprehendatur, vt in

Pomis, ὀπώεα

Sine ofsibus

Cum ofsibus, inter quæ nuclei latent, πυρήνες.

Nucibus, ἀκρόδρυα

Acinis, ῥάξ.

Baccis, Baccæ dispersius rariusq; enascuntur, in hoc ab acinis, qui densius proueniunt differentes. Constant autem acini & baccæ

Carne

Succo

Nucleo.

Vinateis, γίγαρτα, in acinis vitium.

Sanfis, ofsiculum oliuæ.

Acinorum congeries in vite vua, in reliquis etiam corymbus vel raze-mus, botrys nominatur. Licet raze-mus propriè sit, qui & Scapus quo acini fulciuntur.

DE DIFFERENTIA STIR- pium circa semen & fructus.

Semine quædam carent, vt

Adiantum *

TABVLAE STIRPIVM

* Polypodium

Trithomanes

Asplenon

Phyllites

Filix vtraq;.

Fructum non proferunt arbores infelices,

ob hoc dictæ, Salix Homero ὠλεσίκαρ-

πῦρ: Similiter tamarix apud nos.

Semina quædam

Præueniunt

Flores

Florum instar paniculæ.

Fouent & tuentur

Folium, φύλλον

Pes

Pericarpia.

Fructus

Præcoces

Serotini

Nunquam maturenscentes, vt

Labruscæ, ὄμφακες

Grossi, ἐεινιοί, in caprifico.

DE DIFFERENTIA STIR-
pium circa flores.

Flores, ἀνθη, nam alijs sunt

Duplices, διανθη, quod violæ Martiæ tri-
buitur: & floribus illis, qui stamina
quædam

IN GENERE

5

quædam seu crocos, quos & apices vo-
cant, in medio habent, veluti filamenta
ab intimo floris sinu: cuiusmodi Pli-
nius in belli flore pastillicantes barbu-
las dicere videtur.

Multiplici folio, *σαυπόδια*, gefüllte Blü-
men: quod arte fit.

Rosæ

Violæ

Caryophylli

Pes corui

Bellis

Malua.

Aquilegia

Bacilli, *Moosblumen*.

In pappos (*πάππας*.) id est, lanuginem
quandam deciduam abeunt.

Lactariæ multæ, vt Lactucæ

Sylvestres

Hieracion vtrumq;

Sonchi

Chondrillæ

Gerontopogon.

Domesticæ.

Cardui omnes, Atractylis, Scolymus.

Chamæleones, &c.

Et aliæ quædam, vt

Senecio *

A 5

TABVLAE STIRPIVM

Gramen quoddam palustre,
Alopecuros quibusdam.
Vnius folij in calathi formam, vt in
Conuoluulo
Maiore : rudimenta naturæ lilia fa-
cere condifcentis, Plinius.
Minore , qui Helxine cissampelus
videtur.
Iasone.
Solano Romano.
Rapum syluestre. Vuulariæ.
Calathiformes
Plurium foliorum
Diuisorum vndiquaq; , vt lilium.
Continuorū infra, vt rapū syluestre.
Vnius folij, vt conuoluulus.
Quatuor foliorum, violæ matronales.
Pluriū foliorū , vt rosa à quinq; ad centū.
Folij florū crenatis.
Exemptiles,
Borago, Alsine syluatica.
Buglossus,
Cynoglossus
Radiati singuli, per singulos coliculos,
Bellis
Maior,
Minor.
Gerontopogon.
Hieracium. * Caly-

- ✱ Calycibus plurimi includuntur antequā
dehiscant, quo tempore in rosis alaba-
stros (à valorum forma) & nymphas,
νεμφας vocant, quòd recens appare-
re incipiant.

Pendentes à

Siliquis, vt in

Herba S. Antonij,

Maiore,

Minore.

Rhododaphne puto: species filio-
rum ante patrem.

Petiol s.

Flores, *ἀνθ* sunt vel

Florentes

Particulatim

Cū in vna ceu panicula infimi prius
& alij paulatim post florent.

Bellis item particulatim floret.

Vniuersim.

Muscosi, nudi calycibus, multi, parui, con-
fercti, molles. Sunt qui spongiosam
hanc florum congeriem, muscum ap-
pellent: vt Ligustrum, Barba caprę, Ru-
bea, Galion, Cruciata.

Inordinati.

Ordinati & digesti per

Corymbos, vt Androsæmon

TABVLAE STIRPIVM

* Paniculam (aliqui iubam vel comam vocant.) quæ sublonga vel subrotunda effigie tumet, veluti lanosa coma, in

Milio

Panico

Arundine

Iuncis

Et graminis generibus aliquot.

Muscaria vel umbellas : quæ sunt in orbem radiatæ herbarum comæ: caculaque in fascies coacta, à flabris similitudine, cuius ventilatu muscæ à conuiuis abiguntur. Aliàs Umbella floris seminisq; pedamentum est, in plures digestum longiores pediculos, qui simul ex fastigio eodem orti, in latius continuò radiantur, in orbem circumactum. *Σκιάδρον* ab effigie umbellæ muliebris, qua faciem à sole & æstu defendunt. Apij genera omnia umbellas habent, & his ferè longiuscula, simplex & neruosa radix est.

Verticella, *σφονδύλια*, quæ caulium & ramulorum artus ambiunt & coronant, vt in marrubio, clinopodio: ab instrumenti muliebris similitudine, * quo

IN GENERE.

7

* quo fusi vertendi gratia vtuntur.

Spicas, *σάχυν*. Quanquam fortè magis
ad semina siue grana hoc ordine di-
gesta quàm flores hoc nomē accom-
modetur.

¶ In spica, quæ olim specæ, à spe, con-
tinentur

Grana.

Grano minus

Summum

Frit.

Vruncum.

Infimum,

Gluma, grani inuolucrum.

Solisequi

Heliotropium, per excellentiam ma-
ius & minus.

Seris, cichorium.

Lutei ferè omnes, & aureo colore
splendidi, vt calendula, pes corui.

Bellis & radiati pleriq;

Colocassia.

Pilei acuti specie seu cucullati.

Aquilegia, seu Angelica.

Aconitum

Cœruleum

Flauum.

Staphis agria.

TABVLAE STIRPIVM

Flores, ἀνθ, sunt vel

Foliati, in quibus lata & distincta folia
sunt. Muscosi enim pilei formes, nō pro-
priè foliati dicuntur.

Vngues in rosis & foliatis floribus. Sunt
imæ foliorum partes quibus in capite
suo cohærent.

¶ Florum colores sigillatim persequi in-
finitum foret.

¶ Quæ in floribus à figuris dicta nomina
viſurpatur, eadē in feminibus similiter.

Florum instar est panicula, quæ dicitur

Cachrys, καχρυς, pilula Plinio, in

Larice

Picea

Platano

Iuglande

Tilia

Abiete.

Iulus, ἰελα, in auellana, sic fâzle.

Nucamentū, κύτταρον, præcipuè in nu-
cibus, deinde in illis etiā, quæ (Græcè)

Canchryn ferre dicuntur.

STIRPIVM PARTES QVAB

semen fouent ac tuentur.

Folium de quo supra.

Pes, petiolus.

† Peri-

* Pericarpium,

Vas, vasculum, theca, loculi, inuolucrum,
conceptaculum seminis.

Folliculus, de diuersis pericarpijs di-
citur, de calyce, gluma in spica &
membranosa cute acini.

Calyx, ἀπὸ τῆ καλύπτειν, folliculus
quo flos primū, mox seminis fœ-
tus clauditur. Sic etiam in glandibus
vocatur, vulgò cupula.

Gluma, tenuis grani tunica. Acus
purgamentum frumenti leuissimū,
pars glumæ inde acerosum.

Siliqua, λοβός, valuulus peculiariter
in leguminibus. Aliæ

Obliquæ vel dependentes, vt legu-
minum, quæ singulæ & longio-
res visuntur.

Erectæ, breuiiores, quinæ ferè, vt
Aconiti cœrulei & flauī, & sta-
phis agriæ puto, & Aquilegiæ.

Corniculatæ vt in Cardamomo.

Scutulatæ figuræ.

Lenticularis figuræ.

Folliculus vt in ormino, nomen quod
sciam non habet.

Vulga, instar sacculi pecuniarij:

Caput, (vt in papauere, κώδιον, fortè

TABVLAE STIRPIVM

* in carduis etiam, vt cinara, caput discipoteſt) loculamentis, id eſt, paruis capſulis diſtinctum, in quibus abſoluta ſemina ſunt. Quædam ſine capſulis ſunt, vt polemonion, ſos Iouis.

Folliculo

Vndiq; adhærente

Inani, vt

Halicacabus,

Verbitne fūchle / frutex arboreſcens.

Echinus, pluribus, vt in caſtanea.

Murex (in tribulo) paucioribus.

FOLIORVM DIFFERENTIA.

Plantæ aliæ aut

Sine folijs ſunt, vt

Spartos

Cuſcuta

Adiantum Apuleij.

Habent folia.

Crenata, id eſt, ferrata, per ambitumq; ſecta.

Fimbriata, quæ in ambitu in quaſdam fimbrias exeunt.

Laciniata, membratim per flexuras di-
* geſta,

* gesta, vel natiuis segminibus dissecta.
Lacinię enim partes sunt extreme de
coris causa concise, orarumque sum-
marum cęsurę. Sic Vetonici sylue-
stris genus quoddam floribus est la-
ciniatis. Sunt tamen qui laciniosum
pro sinuoso vsurpent.

Stellata, quę etiam radiata dici pos-
sunt, vt

Rubię

Cruciataę

Aparines

Horum omniũ geniculati sunt
caules, folijs genicula ambientibus.

Bina, terna, quaterna, &c.

In vaginis condita, vt graminis, cana-
rię, tritici, iridis, & similium.

Striata seu canaliculata, singulis, vel
pluribus canaliculis, vt cyperi, pseu-
docyperis.

Annua & caduca, vel decidua: non de-
cidua

Lanuginosa, γναφαλοειδής, vt gnapha-
lij, dictamni.

Aculeata, vt chamęleontis vtriusque,
cinarę,

Hirsuta, vel mollioribus aculeis præ-

B

TABVLAE STIRPIVM

dita, vt auriculæ muris vulgò.

Leuia.

Splendentia, vt aconiti.

Non splendentia.

Aspera.

Pingua, vt lilij & testiculorum genera varia.

Stipulæ, folia sunt culmum ambi-
entia.

STIRPES ALIIS QVIBVSDAM,
rarioribus partibus differunt, nempe,

Lanugine quarundam folia coliculiq; can-
scent.

Mucro est acumen, in quod partes quæcun-
que desinit, vt spinæ omnes, folia multa &
quædam filiquæ.

Vmbilicus id in pomis est, quod in eis me-
dium vel prominet vel conditur.

Spinosa.

Semine, vt spanacia, tribulus.

Seminis conceptaculo, vt quæ echinos
proferunt.

Folijs tantum, spina

Molliore, & figura magis quàm reipsa,
vt asparagus, corruda.

Durio.

* Duriore, vt Iuniperus.

Caule tantum, vt geinstella suffrutex.

Caule & folijs.

His omnibus, quæ acanacea dicuntur,
vt cardui, caule, folijs, & pericarpijs,
(non ipsis seminibus) spinosi.

TABVLA STIRPIVM SEM-
per virentium.

Ex stirpibus semper virentibus, aliæ

Tota superficie semper virent, vt in
Arborum genere

Citrus & cognatæ, Laurus.

Buxus, Hedera.

Coniferæ omnes excepta larice

Glandiferæ pleræque: nam ne nostra
quidem quercus omnino nudatur
folijs. Ilicum genera, Coccus, Aquifolia.

Sabina vtraque.

Fruticum genere, pauci puto: an philycæ, Iasminus.

Suffruticum genere

Odorati,

Samfucum, Thymus, Rosmarinus.

Chamæcyparissus. Salvia

Lauendula, Spica, Hyssopus

Clematis prima. Veronica atilis &
similia.

TABVLAE STIRPIVM

Coronarij plerique omnes, vtpote lignosi.

Herbarum genere.

Αἰάριθις, vt adiantum, trichomanes, filices vel omnes vel mihi notæ saltem.

Quæ liquorem habent,

Acrem duntaxat, vt tithymalli: qui & florent in exitu hyemis aut prius.

Quibus folia & superficies tota densior solidiorq; est, vt

Chamæpyxus.

Elleborus niger.

¶ Item quæ nullo certo genere continentur.

Coliculis summis.

In fruticibus,

Periclymenum

Cytisus, non tota, sed magna hyemis parte apud me in horto: ruri nondum obseruare potui.

In suffruticibus, Chamædaphne horti mei.

Circa radicem tantum. Herbæ

Quæ liquorem habent

Copiosum, dulcem aut subamarum, Tragopogon, Cichoracea omnia, an sic & Lactucæ.

*

Paucum

* Paucum in ferulaceo genere, & si
quæ alia fortè ἐνοπα sunt,

Olera

Satiua, apium.

Syluestria

Annua ferè ab autumno ad sequen-
tem æstatem durantia.

Bellis, pastinaca syluestris, arthritice

Bulbi pleriq;, hyeme amittunt superfi-
ciem totam: pauci seruant circa radi-
cem folia,

Lilium album

Crocus, hyeme præsertim viret: æ-
state se oculit, vt & cylcaminus, a-
risara, &c.

Bulbine maior.

Stirpium aliæ

Semestres, à vere ad autumnum.

Annua, & totæ pereunt hyeme: nisi
fortè autumno serantur.

Bimæ, aut longioris vitæ: & harum
aliæ hyeme

Virent

Totæ

Radicibus.

Non virent, sed radicibus integris
superficiem amittunt.

Τριεῖς, πολυεῖς.

TABVLAE STIRPIVM

¶ An pauciora sunt, quæ superficiem totam amittunt.

¶ An quæ semper virent etiam πολυ-
χρονιωτερα sūt: & magis si etiā florēt

¶ Virent semper lignola potius quam alia: & quæ liquorem habent: hic enim eis pro sanguine est, calidior & concoctus, crassior, (nam succus aquosus tenuior facile gelascit,) inter arbores, quorum lignum densius est. Ideo & in calidiorib⁹ locis plura semper virentia inueniuntur: quia nec frigus magnum est, nec si esset tantum efficeret.

TABVLA EX LIB. IX. CAP.

VIII. Theophrasti de hist. stirp.

De vsu partium plantarum.

Ex plantarum partibus aliis utilis est

Radix fit autem radici-dium. ῥιζοτομία.

Paucissimarum vere, vt ischiades radix
πλεται τῇ ἡρῳ.

Plurimarum, autumno post Arcturum, cum folia deciderint: vel postquam decerptus fuerit fructus, si quarum fructus utilis est.

Eleborus autumno maturus est, vere imma-

* immaturus.

Pauciorum æstate, (ὑπὸ πυροτομίαν,
καὶ μικρῶ πρότερον) per messem tri-
tici (vt bryonia puto) panaces in
Syria.

Radices colliguntur

Totæ

Minores tantum, vt in elleboro.

Liquor, ὁπός. Et hic aut fluit

Sponte, vt tragacanthæ.

Sectione (ὀπισμὸν vocant.)

Caulium in plerisq;, vt tithymalli,
lactu cæ.

Radicum, in paucis.

Capitum, vt in solo papauere.

Et horum si succus

Abundet, πολύοπα, vase excipiunt,
vt tithymalli siue meconij.

Paucus sit, lana, vt lactuca.

Succus, χύλισμα, in ijs qui paucum & a-
ridum succum habent. Fit autem suc-
catio, (χυλισμὸς) vt quæ vrentes, aut
torrentes aquamque infundentes ex-
primunt.

¶ Succus radicum aut est fructu

Infirmior, vt cæteris omnibus.

Vehementior, vt cicuta & thapsia.

B 4

TABVLÆ STIRPIVM
DE STIRPIVM PARTIBVS, EA-
rumq̃ differentijs. tabulæ duæ Theophrasti de
historia plantarum libri primi, capi-
tibus quatuor prioribus, adie-
ctis quibusdam ex cap.

17. 19. & 20.

Omnes plantæ humorem calorémque si-
bi insitum quendam possident. Humor
autem vel

Dicitur humor, vel liquor (succus,
ὕγρον, ὀπός) & si quidam distinguunt,
vt & lachrymam, δάκρυον. Hic parti-
bus omnibus cōmunis est, nihil enim
est quod careat humore.

Differunt humores vel ratione. Vide
Plin. lib. 13. 28.

Coloris. est enim quidam lacteo simi-
lis, vt fici, papaueris.

Odoris. est enim odoratus, aneso, ce-
drulæ, apio, fœniculo, & similibus.

Saporis. est enim alijs

Vinosus, vt viti, moro, myrto.

Acidus, vt punico & quibusdam malis.

Sed omnes qui huic generi contribu-
antur vinosos putandum

Dulcis, vt fico, palmæ, castanæ.

Acris,

Acris, vt origano, fatureiæ, nasturtio,
synapi, thymo.

Amarus, vt absinthij, centaurij.

Pinguis, vt oleæ, lauro, nuci, amygdalæ, pino, larici, abieti.

Aquosus siue dilutus (ὕδαρής,) vt pruno, viti, piro, malo, cucumeri, cucurbitæ, lactucæ.

Consistentiæ, (sic nobis diuidere & nominare libet;) vt in abiete, pino, omnibusq; coniferis resinaceus. Huc fortè referri potest etiam lacti similis liquor supra nominatus.

¶ Vnaquæq; planta vt temperamentum proprium, ita succum quoq; peculiarem habet, quo à cæteris omnibus differat. Licet enim pericarpia quarundam stirpium sapore similia videantur, in ipsis tamen seminibus eorumq; tunicis differentia percipitur.

¶ Vniuersæ arborum plantarumq; partes cognationem quandam habent tota cum natura, quanquam odore saporeq; differant, sic vt aliæ odoratæ & benè sapidæ sint, aliæ inodoratæ insipidæq; omninò.

Sunt enim alijs, (ab odore differentia sumpta.)

*

B 5

TABVLAE STIRPIVM

- Flores odorati, folia inodorata.
Contrà, vt coronarijs, quorum folia &
rami magis olent quàm flores.

Neutrum.

Radix, aut alia pars.

- Sapor, succúsue ad cibum aptus in
vna parte, in altera ineptus: vt arbo-
rum aliquot fructus hominibus e-
duntur, folia non item. Tiliæ contrà
fructus pecora non attingunt, folia
edunt pleraq;.

TABVLA DE STIRPIVM *partibus secunda.*

In stirpibus considerantur

Partes, μέρη

Essentiales

Similares, ὁμοιομερῆς, vbi pars quæ
libet idem nomen cum toto ha-
bet. Harum alia

Priores

Nervus, ἵς, hic simplex est,
nec diuiditur in ramulos.

Vena, φλέψ: hæc crassior est
neruo, humorē continet,
& in ramulos finditur.

Caro, σὰρξ, quæ quoquo
versus diuiditur, inter ner-
uos aut venas sita.

• Hæ

* ¶ Hæ partes sic nūcupantur per analogiam ab animalib. petitam.

Posteriores, quæ ex priorib. constant.

Cortex, *φλοιός*, qui flores ambit & separari potest. Constat aut ex prioribus, vel

Tribus, neruo, humore & carne, ut roboris, piri, populi nigræ.

Duobus,

Humore & neruo, ut vitis,

Carne & humore, ut suberis.

Lignū, *ξύλον*, hoc fissile est, id est, in longū diuiditur. Cōstat è neruo & humore: quædā etiā è carne, ut quæcunq; per etatē dureſcunt & ligneſcunt, ut raphani radix.

Matrix, *μήτρα*, ligno ambitur: aliqui cor, alij medullā vocāt. *καρδίαν, μυελόν.*

Sed *καρδία*, ppriè est durior matrix, ut *ἐντερία* laxior.) Constat ex humore & carne.

Dissimilares, *ἀνομοιομερές*, & maiores, ut pote ex ſimilaribus compositæ, & primæ quod ad ſenſum: quæ & organicę dicuntur. Et harū quædā *μονοειδές* ſunt, ut tibia, cubitus: quarū particulæ nominibus carent. Alię *πολειδές*, ut caput, cuius partes nūcupantur oculus, naſus, &c. Sūt aut.

TABVLAE STIRPIVM

* Radix, ῥίζα, quæ alimentum attrahit.

Caulis, καυλός, qui in herbis tum promitur (est enim seminis causa.) cum parturiunt, siue eodem anno, siue secundo, siue serius. Hinc in arboribus caudex seu truncus vocatur σέλεχθ. Caulem alia

Habent, non tamen perpetuò, sed annuum, vt quæ diuturnis radicibus viuunt.

Non habent.

Ramus, ἀκρέμων, ὄζθ, qui è caudice proximo oritur.

Surculus, κλάδος, κλών, βλάστημα: qui è ramis nascitur, vt germina annua maximè.

In stirpibus considerantur

Partes essentielles.

Annua, ἐπίτειοι, quæ non propriè partes dicuntur, vt neq; embryon fœtus.

Harum aliæ

Generationi inserviunt, (quæ ferè omnia propter semen sunt.)

Folium, φύλλον. Horum aliæ constant ex

Neruo, cortice & carne, vt fici & vitis.

*

Neruo

* Neruo tantum, vt harundinis, frumenti.

Flos, ἀνθος. Forum alij constant ex

Cortice, vena & carne.

Carne tantum, vt qui inter lolia nascuntur.

Pediculus, μίχρος: à quo folium vel fructus hæret. Pediculorum autem alij constare videntur

Ex neruo tantum, vt harundinis, frumenti.

Ex eisdem quibus caules.

Plura de pediculis leges infra in differentiis foliorum.

Fructus, καρπός: hoc est pericarpium cum semine incluso,

Fructuū alij constant ex

Carne & neruo.

Carne tantum. Nonnulli etiam cute constant.

Carne & neruo, vt pruna, cucumeres.

Humore & cute, vt morum, punicum.

TABVLAE STIRPIVM

Alij secus distinguuntur.

¶ Omnium (vt sic dixerim)
pars exterior, cortex: inte-
rior, caro: quorundā etiam
nucleus.

Semen, σπέρμα.

Aliam ob causam accedunt in qui-
busdam, vt

Muscus, μύσος.

Capreolus, κίτριξ.

Propriæ quibusdam, vt

Robori, galla.

Viti, capreolus.

Partiū differentiæ: vel in eo quod quædā,

Simpliciter habent, aut non habent, vt
folia, fructum.

Habent, sed

Dissimilia, ἀντίμοια.

Figura,

Colore,

Densitate (spissitate) raritate.

Asperitate, leuitate, & alijs huius-
modi.

Sapore.

Disparia, ἑτεροῦς excessu vel defectu, se-
cundum

Magnitudinem.

Multitudinem.

¶ Dissimi-

* Dissimiliter, *ἀντιθέτως*, id est differente
Situ & loco, vt fructum supra vel
infra folia.

Ordine, vt rami

Inconditi, robori.

Ordinati, abieti.

STIRPIVM ALIA DIVISIO GE-
neralis, secundum differentias suas.

Plantæ differunt

Natalibus seu loco. Sunt enim aliæ

Terrestres.

Montanæ

In Iugis montium, Bitterwurz.

Ad latera. Estreatium in saxis &
precipitijs montium. *Flüßblumen.*
Rot *flüßblumen.*

In planicie.

In vallibus.

In pratis.

Circa oppida.

Circa muros & sæpes.

In ipsis sæpibus.

Circa areas domorum.

In ruderibus.

Locis saxosis.

In muris vel saxis

Naturalibus,

Constructis.

In syluis,

TABVLAE STIRPIVM

* In arboribus vel truncis arborum

Viscum

Polypodium.

In hortis

In aruis, vt zizania

Quiescentibus

Non quiescentibus.

Syluestres.

Cultæ, vrbanæ, vel propter

Fructum in cibo.

Voluptatem in

Colore, vt horti pensiles,

Odore.

Figura.

Vmbra, &c.

Ambiguæ vel in vtroq; genere, vt
cerasi. Vrbane verò tantum nul-
læ, aut paucissimæ, vt etiam inter
animalia.

Peregrinæ, vt & aliæ quædam, & o-
mnes nobis Aromaticæ,

Radice, vt zinziber, zedoaria,
cyperus.

Semine, cardamomum

Cortice, cinnamomum

Folijs, vt malabathrum.

Liquore, vt balsamum.

Duobus vel pluribus istorū.

*

Suæ

* Suæ cuiq; regioni.

Aquaticæ: proueniunt enim aliquæ in
Paludibus

Plenis aqua, vt nymphaea, lens pa-
lustris.

Resiccatis, adiantum Apuleij.

Fluuijs, potamogeton.

Mari

Corallium,

Fucus,

Alga,

Bostryches,

Ampelides,

Otacides.

Ripis & littoribus, vt fium, menta-
strum, sisymbrium, Marinas di-
xeris, in mari nascentes: Mariti-
mas, iuxta mare.

Tempore differunt plantæ,

Partium anni quibus crescunt, aut vi-
gent, aut fructum ferunt, &c. Sic a-
liæ sunt

Per totum annum.

Vernæ.

Æstiuæ vel alsiosæ, vt ocymum.

Autumnales, vt caltha.

Hybernæ, vt elleborus niger.

Durationis, vt aliæ sunt annuæ, aliæ

C

TABVLAE STIRPIVM

duobus vel tribus, vt angelica, laſer. Vel
pluribus annis durant.

Sexu, ſic alia dicuntur

Mares, nigriores, duriores.

Fœminæ, albiore, fruticioſiore, fœcun-
diores.

DIFFERENTIAE STIRPIVM

*ſecundum partes, (quarum plu-
rimæ ab animalibus
mutuantur no-
mina.)*

Stirpium partes alia

Simplices,

Compoſita,

Communes

Omnibus.

Plurimis.

Paucis.

COMMVNES OMNIBVS ET

ſimplices partes.

1. Humor natiuus

Exprefſus, ſuccus, χυμὸς.

E vulnere profluens, liquor, ὀπὸς.

Lachryma, δακρύδιον. Eſt autem la-
chryma humor, qui ſtatim deſecto
caudice

- caudice vel ramo, aut ipso ligno, profilit & apparet.

Lacteus,

Croceus, &c.

Gummi,

Resina.

2. Nervus fissilis est, per carnē & aliam substantiam meat. Fibræ verò seorsim etiam in radicibus procedunt foras, licet pro nervis aliquando accipiantur.

Pectines, ut vocant in ligno, nervi esse videntur.

3. Vena maior & crassior nervo, humorem habens & ramulos, in folijs apparet.

4. Interuētū, quod inter venas intercipitur.

5. Caro diuidi potest omnibus dimensionibus, cortici subest.

Pulpa in arboribus est, quod in animalibus musculus appellamus.

Tori, *κόνδυλοι*, prominentes partium tori, & in se pulparum modo collecti, unde torosum aliquid dicitur.

6. Tunica est tenuis cortex veluti membranaceus, quo arbor vel radix inuestitur.

Imò pars omnis suam ceu cutim & putamen habet. Cæpe folliculis tunicatum est.

In arboribus librum dicimus. Thallia dicitur cæpæ folliculus: In malo punico putamen, malicorium.

TABVLAE STIRPIVM

Partes aliæ ab animalibus dictæ.

Caput dicitur

Infra, vt in bulbaceis, rotunda radice.

Supra, vt in papauere, vbi & *ῥαδὶς* *ἰοῦ*
priuatim.

Caput etiam vocant extremam vitis par-
tem, id est vltimum & productissimum
flagellum.

Vertex,

Cacumen.

Frons, vt paulò post dicetur.

Cerebrum in palma.

Medulla pars similis, cor, matrix. Hæca-
lijs est

Multa

Pauca

Fungosa & laxa

Compacta & solidior

Nulla, vt buxo, ebeno.

Ceruix, pars à capitatis radicibus prodiens,
prælonga teresq;.

Capillamenta, fibræ, acetabula: vel cirri, si
crispentur: in floribus quibusdam croci.

Coma, quicquid hilari venustate, crinium
modo, summa ramorum vel coliculorum
exornat.

Iuba, arundinacea coma effusa, qualis in mi-
lio est, à iubis animalium. Alæ,

Alæ, Alarum caua, Sinus, *μυχάλαι*, ex quibus noua semper germinatio prodit: cum adnata nullam habeant certam partem vnde emergant.

Adnata, Adnascencia, Appendices, *παρὰ-φύξις*,

Caulium

Radicum.

Brachia, maiores arborum ramī.

Laterā.

Genicula, vel Artus, in geniculatis vel articulatis.

Caulibus, vnde polygonos & polycnemon dictæ.

Radicibus, vt polygonaton, arundo, doronicum vulgò dictum.

Internodium, inter genicula medium.

Pes, pediculus, petiolus, tenax, *μίσχθ*, quo folium, fructus, aut flos dependet.

Pars

Prona ad terram.

Supina, remotior à terra.

Partes stirpium compositæ, communes plurimorum. RADIX.

Radix, oris instar, ad alimentum attrahendum, vt planta sit tanquam animal inuersum. Sunt autem aliæ

*

C ;

TABVLAE STIRPIVM

* Bulbaceæ, bulbosæ, capitatæ. Radices i
psæ bulbi dicuntur : æq; vel sunt
Tunicatæ, vt

Cæpe

Porrum, &c.

Solidæ, vt aliquatenus tamen distin
cta rubera separentur, vt

Croci

Liliorum.

Narcissi

Scillæ

Arundinum.

Oblongæ, vt in cartilagineis.

Simplices, (quod ad radicem scilicet, quæ
recta in profundum agitur, & veluti
stirps est) vt olerum.

Multiplices, fibratæ (per excellentiam ni
mirum, fibris enim omnino radicē nul
lam carere putarim) multis adnatis.

Rectæ,

Obliquæ,

Spongiosæ, vt asparagorum, quam radi
culas illigatas & connexas, ac multis
irretitas capillamētis, spongas & spon
giolas vocant.

* De radicum diuisione plura leges apud
Theophrastum hist. lib. 7. cap. 2. & 3. Et
rursus 7. 11. Et lib. 9. cap. 13. Item in Sea
ligero in plantis Aristotelis, fortè & in

Anticardano. Lib. 16. radices vocat synecdochicè pro plantis, quarum radices in usu medico sunt, &c. Herbas vero, quarum folia.

2. Pars à radice surgens in
Arboribus, simplex
Fruticibus, multiplex,
Ut sunt codex, caudex, stipes. φιτέρις,
τέλεχος.

Stolones, μοχεύματα, inutilis fructificatio è radicibus : utilis tamen plantandis nonnullis, ut

Corylo
Mespilo
Fico
Viti.

Herbis,

Caulis, καυλός

Scap⁹, in styli modum sursum proreptas,
à columnaribus scapis.

Thyrus, rect⁹ in virgulæ vel teli modum.

Culmus, κάλαμος, in frumento.

E frugibus sectos, stramen, stramentum
vel paleam vocant.

Virgultum surculus est, qui terræ committitur, ut in arborem insurgat.

3. Caulis

Mollis, ut amplexi caulium.

C 4.

TABVLAE STIRPIVM

Lignosus.

Leuis.

Striatus. Striæ partes sunt, quæ protuberant & eminent in longum.

Cauus.

Solidus.

Rotundus.

Angulosus.

Latus. Vnde lastuca, πλατύκαυλος.

Teres.

4. Amplexi caules,

Cum capreolis à capiendo, quibus adminicula complectitur vitis.

Cucumis.

Pepon.

Cucurbita.

Vitis.

Cultina,

Syluestris,

Labrusca, quæ fert ὄμφακας.

Caustica, aliàs Viburnum.

Alba, aliàs Bryonia.

Nigra.

Sine capreolis, clauiculæ.

Periclimenon

Volubilis,

Maior,

Minor.

Cycla-

- * Cyclaminum alterum.
- Cassythia, vulgo cuscuta.
- Lupus salictarius.

5 Cortex, cuius.

Partes

Tunica, extrior.

Liber, interior, in arboribus.

Differentiæ

Planus.

Asper.

Hiulcus, quibusdā veluti squammatus.

Tenuis.

Densus.

Colore etiam, & alijs medijs differunt.

6 Rami, quibusdam nodi dicti.

Maiores, tabulata. Aliqui brachia scribūt esse ramulos.

Minores, ramuli, qui in surculos, furculi in germina desinunt. Vocantur & Asparagi seu Turiones, recentia germina stirpium, & tenerrima, quæ edendo sunt: vt Cymæ olerum, brassicæ maximè, delicates coliculi, in quibus florum calyces adhuc includuntur.

7 Termes, ram⁹ cū folijs & fructu. ἑρπιδῶν.

8 Spadix in palma.

9 Crada in fico.

10 Viticulæ, ὀδόντες, id est dentes, & flagella

TABVLAE STIRPIVM

sunt, vt in vitibus & cucurbitis, oblongiores & productiores ramuli, qui longè vagantur & vicina complectuntur, olim flabella dicta, quòd ventis impetantur. Quidam etiam arborũ cymas flagella vocant.

11 Frons, pro ramo capitur, sed proprie est, quod ipse ramus circumquaq; producit, multa interdum folia habens, & nonnihil corticis ac velut cauliculi.

12 Virga ex radicibus, aut caudicis laterib; exit, Soboles quibusdam dicta.

13 In vite palmites, è stirpibus ac furculis quotannis prodeunt, dictæ quod instar palmarum hominis virgulas quasi digitos ædant.

Pampini, frondentium ramusculorum comæ, coliculiq; fructum fouentes, & ab impendente vindicantes iniuria: hinc pampinare.

Sarmenta, prælongæ virgulæ, in quas vitis luxurians spargitur, id est, Vitis ipsius brachiorum & caulium ligna, tam dũ sunt in vite, quam dum excæta & exempta sunt.

Malleolus, nouellus est palmes, innatus prioris anni flagello, vbi deciditur ex veteri sarmento, prominens vtrinq;, & malleoli speciem præbens.

Palma,

Palma, maius flagellum, vnde nascuntur
vux.

Propago grüb:äben/ vitis vetula depres-
sa, atq; in terram per inflexos arcus sub
mersa, vt ex vna plures emergant.

Gemma vel oculus, in vite & alijs etiam,
germinis tuberculum vocatur. Vide Ca-
roli Stephani Vinetum.

ARBORVM DIFFERENTIAE, EX
Theophrasti de hist. plant. lib. i. cap.

5. & deinceps.

*Nota asteriscis distincta poterant hic omitti,
(quanquam Theophrastus ponat) quoniã
infra repetuntur. Vt urbanae etiam & syl-
uestres in differentijs locorum. Durum, læ-
ue, pulchrum & contraria: corticis ferẽ
aut ligni vel caudicis differentia sunt. Ad-
ijciuntur autem tanquam obiter, aliarum
quoq; stirpium differentiae.*

ARBORVM differentia, quæ cæteris etiã
stirpibus in plurimis accommodari pos-
sunt, sumuntur ex his generalioribus lo-
cis, nempe

- 1 A toto, siue tota substantia
- 2 A locis, in quibus proueniunt.
- 3 A partibus singularibus. Sũt autem
 - 4 Caudex.
 - 5 Rami.

TABVLAE STIRPIVM

- 6 Cortex.
- 7 Lignum & caulis.
- 8 Medulla.
- 9 Radices.
- 10 Nodi.
- 11 Folia.
- 12 Semina.
- 13 Flores.
- 14 Fructus.

De quibus sigillatim tabulis per numeros distinctis agemus ordine.

ARBORVM DIFFERENTIA I.

*quæ à toto, vel quæ ad substantiam totam refertur, de qua
Theoph. 1. 23.*

Sunt autem arbores alix

Urbanæ

Syluestres. quædam enim cultu deterioriores redduntur, vt abies, pinaster: & in omni stirpium genere, quæ loca frigida niuosaq; adamant.

Fructiferæ, steriles.

Germinæ vel fructu præcoces, *πρωϊ-βλαστῆ, πρωϊκαρπα, ὀψίκαρπα.*

Floriferæ, *αἰθνηπα.* Flore carentes, *αἰανθῆ.*

Magnæ,

Magnæ, parvæ. Itemque alię (quæ huc referri possunt, ex cap. 14.

Excelsæ, ut abies, & quæcunque simpliciore caudice assurgunt, nec radicibus nec ramis multis præditæ.

In profundum descendentes, (suis radicibus.)

* In ramos illico sparguntur, ut malus.

* Ramosæ, & molem superiorem grandiore gestantes, ut punica.

¶ Fiunt autem hæc singula vel Natura

Arte & cultu.

- ¶ Adhæc plurimum refert alimentum, locus & cultus. Eadem enim si crebræ ferantur, excelsæ gracilesq; redduntur: si raræ contrâ. Et si statim ramos succidas, excelsæ, ut vitis: si relinquas, breves assurgent. Olera etiam nonnulla arboris figuram capeffunt. Omnia locis suis melius augescunt. nam & inter congenera, quæ suis in locis manent, enodiora, ampliora, pulchrioraq; extant. Et in totum sylvestris materies pulchrior & commodior & copiosior parte montis aquilonia, quâ meridiana enascitur.

TABVLAE STIRPIVM

Duræ, molles.

Læues, asperæ.

Cortice.

Folijs.

Pulchræ, deformes,

Fructus

Boni

Praui,

Syluestres quidē plura ferunt: sed vr
banæ meliora, suauiora, & in totum
temperatiora.

Folia amittentes. Perpetuō virentes.

Plantæ quædam in totum folijs carēt.

A loco, differentia II.

Ex arboribus nascuntur aliz in

Aquaticis

Paludibus, τέλμασι. Quædā palustres
(ἐλεια) omnino sunt, vt salix, & pla-
tanus.

Lacubus, λίμναις.

Fluuijs.

Mari

• Minores, in nostro.

Maiores, in rubro.

• Plantæ quædam nisi in solo madento
nasci non possunt: quædam nascuntur
quidem, sed longè deteriores.

Aridis

Aridis.

Terrenis.

Littoreis: vt ex minoribus quædam.

Vtrobique, quas amphibias dixeris, vt
myrtum, salicem, alnum.

¶ Addi possunt urbanæ, syluestres: & syl-
uestrium aliæ montanis, aliæ planis
gaudent, &c.

A partibus, differentia mul-
tiplex: & primo III.
in genere.

Arbores differunt suis partibus: sunt au-
tem aliæ

Generales: quoniam aliæ aliæ

Habent: sed vel

Plures

Pauciores

Dissimili modo, &c.

Non habent.

Particulares, cuius generis prima dif-
ferentia sumitur, à

A partibus differentia III. &c.

4. Caudice: qui est aut

Procerus μακροστέλιον.

Breuis βραχυστέλιον.

Rectus ὀρθόφυλλον.

Con-

TABVLAE STIRPIVM

Contortior, σκολιάτερα.

Simplex, μονοσελέχη.

Multiplex, πολυσελέχη.

Sic in herbis μονόκαυλα, δίκαυ-
λα, ἀκαυλα. Cæterum in arbori-
bus μονοσελέχη eadē ferē sunt
quæ ἀπαλάβλαστα: & πολυσελέ-
χη, quæ παραβλασινά.

Herbis nullus, ἀσελέχη.

Crassus, tenuis.

¶ Olea & oleaster caudicum ca-
uitate, vitio peculiari laborant.
cap. 13.

5 Arbores differunt ramis, κλάδοις,
qui vel sunt

Multi, πολύκλαδα.

Pauci, ὀλιγόκλαδα, vt palma.

Crassi, Tenues.

Validi, Infirmi.

¶ Nodorum, qui rami maiores
sunt, differentia, inferius ha-
betur.

6 Arbores differunt Cortice

Tenui, Crasso, λεπτόφλοια, παχύ-
φλοια. Laxi,

Leui, Aspero. λειόφλοια, τραχύφλοια.

¶ Quædam dum adoleſcunt læui ſunt cortice, cū ſenuerūt, aspero.

Diſſectō, vt vitis, ριζοφλοια, quibus cortex radicis ſpeciem gerit, Gaza. Ego χιζοφλοια legerim.

Deciduo, vt potulaca, arbutus.

Carnoſo, vt ſuber, populus, σαρκώδεις.

Neruoſo & macilente) ἰνώδεις ἢ ἀσάρκας) ντῖνις, (arundo, triticum.)

Multiplici tunicis; πολυλόπων, vt tiliæ.

Simplici tunicis, μονολόπων, vt ficī, arundinis.

7 Arbores differunt ligno et caulibus idē vel

Partibus. Sunt enim aliī vel alia

Carnoſi, vt roboris, ficī, σαρκώδεις.

Macilenti, ἀσάρκοι, vt cedri, cupreſſi.

Neruoſi, ἰνώδεις, talia enim ligna ſunt abietis & palmæ.

Enerues, (In Græco eſt μανὰ.)

Venoſa, φλεβώδης.

D

TABVLAE STIRPIVM

Venis priuata, ἀφλεβα.

Et insuper inter frutices & suffrutices caulis quarundam est,

Geniculatus, arundini

Spinosus, rubo.

Inseptus (indistinctus) et equalis,

ἀδιάφρακτος καὶ ὁμαλός, iunco.

Qualitatibus, ut

Duritiae, Mollitiae.

Lentitiae, Fragilitate

Leuitate, Grauitate, &c. Suber

viride statim leue est; salix sicca,

buxus & ebenus ne siccae quidem. Bu-

xus & ebenus grauius sunt densi-

tate: robur, quia terrenum.

Item quod alia sunt.

Fissilia, ἐυχίσα, ut abies propter

meatum rectitudinem.

Fragilia, ὑβραυσα, ut olea; pro-

pter obliquitatem & duritiem

materiae.

Enodia, ἀόζα, ut sambucus.

Nodosa, ὀζάδην, ut abies.

Flexibilia, ὑκαμπτα, ut tilia pro-

pter humoris lentitiam.

§ Arbores

8 Arbores differunt Medulla, μήτεα, quoniam alia

Habent, eaque vel

Carnosam, ut vitis, sambucus.

Lignosam, ut abies, pinus: & quidē hęc præcipuē quod tædæ plurimum in se gerat.

Duriorem & spissiore, cornus, ilex, robur, cytisus, morus, celtis. Harum omnium, Medulla nigra est, & durior ligno suo, ideoque flecti non sustinet. In robore priuatim melandryon vocatur à colore nigro.

Solutiorem, μαυοτέραν.

Minus solutam.

Membranis similem, ὑμνώδην, ut

Arundo,

Ferula, & alia inter fruticosa vel suffrutices.

Arbores verò nullæ vel raræ.

Magnam & perspicuam, ut ilex, robur, & aliæ prædictæ.

Incertiorem, (minus conspicuam) ut olea, buxus, haud enim ita in his distincta spectatur. Quamobrem sunt qui eis medullam non in medio, sed per totum lignū dispersam esse affirmant.

TABVLÆ STIRPIVM

Nō habāt, vt videtur, sambucus & palma.

9 Radicibus differunt arbores. Sunt enim alijs. Cap. 9.

Multæ longæq; vt fico. καὶ μακρόρριζα.

Paucæ, vt punicæ, malo. πολύρριζα, ὅλιγα ῥίζα.

Craſſiores. Tenuēs omnes, vt viti. Inæquales, vt lauro.

Vna, μονόρριζα, vt abieti, pino: ita vt vna prægrandis in imum descendat, paræ aut complures ab ea exeant. Harum rurſum quædam mediam radicem

Maiorem & profundiorē habēt, vt amygdala.

Paruam: cæteras verò grandiores contortioresq; ὡς περ κεκαρχινω μέλας, vt olea.

Læues, Aſperæ.

Saræ, Spiſſæ & diuerſæ. Omnium quidem radices rariore corpore partibus ſuperioribus ſunt.

Neruoſæ, ἰνώδεις, vt abietis. Carnoſæ, vt roboris.

Nodoſæ villoſæq; ὀζώδεις καὶ θυσαϊώδεις, vt oleæ. Tenuiores enim radices multas & conferctas emittit.

Altæ,

Altæ, vt robori, βαθύρριζα. Fico radi-
ces profundiores: item omnibus ra-
ris & rectâ descendentibus. Stirpes
circa vigorem longiores & profun-
diores radices habent quàm vetustæ.
Summæ terræ adhærentes, vt malo.
cupresso, ὅτι πολυόριζα. Profundi-
ores quidem & simpliciter longiores
sunt, si solum sit leue, rarum, & facilè
transmeatu.

Rectæ & æquales. Obliquæ & inæqua-
les, idq; natura, vt lauro, oleæ, non tan-
tum loci obstantis ratione, vt fico &
alijs.

Prolem sursum versus procreant, vt vi-
tis, ὡς βλαστὶ καὶ εἰς τὸ αἶψα. Non
procreant, vt abies, ἀπαράβλαστα.

Radices omnes medullam habent, vt &
caudices & rami. Omnes prius crescunt
quàm superiora: nec altius descendunt,
quàm Sol penetrat.

Suffruticum quoque, herbarum, reli-
quorumque, eadem ferè differentia
sunt: nisi quæ penitus radice carent, vt
ruber, fungus, cranium.

In cæteris enim Radices vel sunt Cap.
10. & 11.

D 3

TABVLAE STIRPIVM

Numerosæ, vt tritico, ordeo, tiphæ, et huiusmodi. Πολύριζα.

Paucæ, vt leguminibus.

Singularis, vt maiori parti olerum, sed quædā propagines (ἐπιρράδας) magnas subgerunt, vt apium, beta: quæ pro corporis sui ratione altius quàm arbores sanè radicantur.

Carnosæ, vt raphano, aro, betæ, asphodelo, croco, perdicio, vingo in Ægypto: & arachidnæ, &c. silphio, magydari.

Magnæ & carnosæ, vt ferulaceis.

Lignosæ, vt crucæ, ocymo: & syluestribus magna ex parte, quibus non protinus plures & fuscæ exeant, vt tritico, ordeo, & priuatim dictæ herbæ. (his enim statim finduntur.)

¶ Annua & herbacea omnia radicib, vel Statim fiduntur in partes æquales.

Vnam aut duas magnas emittūt, & quibus prodeunt minores.

Quædam quasi ex carne & cortice constantes, vt raph anorū & raporum (cartilagineæ Plinio.)

Geniculatæ, vt graminum, & omnis generis harundinacei, caulibus seu calamis suis supra terram similes.

Tunicis multiplicibus constantes & corticosæ

ticosæ, λεπυρώδεις ἢ φλοιώδεις:
 vt scillæ, bulbi, cepæ. Videntur autem
 hæc omnia, & in vniuersum quæcun-
 que capitata terraque condita sunt,
 (κεφαλοβαρὴ καὶ κατὰ ῥίζα, malim,
 quæcunque capitata sunt, & radículas
 à capite deorsum duntaxat emittunt)
 duplex quodammodo genus radicis
 habere: nempe carnosam illam & cor-
 ticosam; & eas (minores fibras) quæ ab
 illa proueniunt. Videntur enim toto go-
 nere differre, non crassitie tantum & te-
 nuitate vt in alijs radicibus. Aut forte
 caput illud quasi cyma seu fructus est:
 non enim omne quod infra terram, ra-
 dix est, vt neque tuber. Fibræ verò tan-
 tum quæ deorsum dependent, propriè
 radiculæ.

Magnæ, frequentes & validæ, vt capitatis
 iam dictis, item gramini & harundina-
 ceo generi.

Radicibus præterea

Succi omniū insuauiores (λειπότεροι)

quam in fructu suo habentur, & qua-
 rundam amari cum fructus dulcis sit.

Hinc fit vt radices quædam sint.

Medicatæ, φαρμακώδεις.

Odoratæ, θυώδεις, vt iridis.

TABVLAE STIRPIVM

Radices quædam aliquid singulare ha-
bent:

Vt quæ prodeunt

E germinibus, vt in fico Indica (cu-
ius germina ad terram reflectū-
tur, radican- turq; in toto circui-
tu, ita vt caudicem non attin-
gant.)

E folijs, vt in herbula quadam cir-
ca Opūta, quæ etiam suauiſ in
cibo eſt.

Lupinum terram amat, terraq; ope-
riri non vult, Plin. 18. 14. Et mox,
Tellurem adeò amat, vt quamuis
fructuſo ſolo coniectum inter fo-
lia vepreſq;, ad terram tamen radi-
ce perueniat. (Gaza ex Theophra-
ſto, aliter vertit, nec placet.)

110 Arbores differunt Nodis, ὀζοις.

Sunt enim arbores aliæ

Nodoſæ, ὀζώδεαι, vt olea, pinaſter, olea-
ſter, idque vel

Natura. Sic paucos nodos habent
ſambucus, laurus, ficus, & omnia
quibus cortex læuiſ, quæuè conca-
uo & laxo corpore ſurgunt. Spiſſæ
etiam materiæ arbores, nodoſiores
quàm

quàm raræ sunt: item rarius confitæ
nodosiores, breuiiores, contortio-
resq; , quàm densius confitæ.

Loco, nam quæ in vmbrosis & à vento
silentibus & dilutis locis nascuntur,
ferè enodia sunt: contraria verò, no-
dosæ. Montanæ campestribus, & sic
ex palustribus nodosiores. Sylue-
stres vrbani, tum simpliciter, tum
congeneres.

Enodes, ἄνθοι, id est, paucis nodis præ-
ditæ: nam prorsus enodes stirpes
nullæ sunt in arborum genere: sed
inter palustria, vt iuncus, tipha.

Nodi quibusdam

Inordinati, ἀτακτοί, & vt fortè euenit.

Ordinati, τεταγμένοι, tam interuallo
quàm numero, ob id eas egregias
vocant, δένδρα ἀξιολογώτατα.

Constant enim aliæ nodis

Binis, δίοζα.

Ternis, τείοζα.

Pluribus.

Quinis, πεντάοζα.

Pares ferè vndiq; magnitudine.

Apsiduè grandiores, quo propius cras-

TABVLAE STIRPIVM

fiori adiacent parte, vt in oleastris apparet, & in arundinibus, quarum geniculus veluti nodus est.

Inuicem respondentes κατ' ἀλλήλας, vt oleastrorum.

Promiscui, ὡς ἔτυχεν.

Recti & quodammodo infixi tum nodi, tum rami, abieti, ceteris minimè, quam obrem abies validissima est.

Faciebus belluarum similes, malo peculiariter, est enim vnus prægrandis, alij circa eum parui complures.

Cæci, τυφλοί, quibus nullum germen nasci potest, idq; vel

Natura

Læsione.

Fiunt autem cum pars arboris ictu læsa, ad vulnus consolidandum enitens, oris vndique plagis circumactis, callo cicatriceq; tumuerit. Hoc crassioribus ramis potissimū euenit, nonnunquam etiam caudicibus.

Fœcundi, γόνιμοι.

Quibusdam veluti cradæ (nam proprie dicta cradatio, κράδ' ὅ, sico euenit, cum rami eius quos cradas peculiariter vocant, ardescunt.) gignuntur, cœu vltimo, robori,

bori, & præcipuè platano, quæ si asperis, aridis, ventosisq; locis stent, ita omnino fiat necesse est.

Ramus proximus terræ, & quasi iuxta caudicis caput, senescens crassior reditur.

¶ Nonnullæ gongros à quibusdam vocatos habent, vel simile quid pro arboris natura. Gongrus enim oleæ fermè peculiaris est morbus, quem alij premium, alij crótonam, alij aliter nominant. Rectis vnistirpibus minusq; ab imo plantigeris, id aut nullo pacto, aut minus accidere solet.

Ramuli omnium nodosiores semper videntur, quod minimum ijs internodium interiacet: vt ficulnei qui nuper prouenerint, & vitis palmitum sumitates. Est enim gemma in vite, vt geniculum in arundine, nodus in cæteris.

II. Arbores vel plátę differũt folijs, *φύλλοις*.

Secundum hæc enim Plantæ

Aut semper virent, vt

Arbores

Urbanæ: Olea, palma, laurus, myrtus, pini, (*πεύκης*) genus quoddam, cupressus.

Syluestres: abies, pinaster, iuniperus, smilax (taxus Plinio) thuia,

TABVLAE STIRPIVM

phellodrys, tilia, cedrus, picca, myrica, buxus, ilex, aquifolia (ἀγεια) celastrus, philyra (φιλύκη) acuta spina, apharca (quæ monte Olympo proueniunt.) Item terebinthus, laurus. ¶ Potulaca & arbutus, cacuminibus perpetuò virent, folia inferiora dimittunt.

Frutices, edera, rubus, harundo, rhamnus, cedrula.

Suffrutices herbæq;: ruta, brassica, rosa, abrotonum, samfucum, serpyllus, papauer, & complura syluestrium. ¶ Origanum, apium, equapium, cacuminibus perdurant, amissis reliquis. Ruta etiam affligitur atq; mutatur.

¶ Omnia quæ perpetuò virent, folijs angustioribus sunt, & pinguedinē quandam suauemq; olentiam reddunt. Sed hæc quoq; non semper eadem durant, verum alia proueniunt, alia exarescunt, idq; circa æstiuum solstitium.

¶ Nonnulla quanquam sua natura semper virere nequeunt, tamen ex loci causa folia nunquam dimittunt, vt quæ in Elephantino agro & Memphi proueniunt, &c.

Aut folia abijciunt. Omnes quidem autum. ●

summo & per autumnum, sed aliæ

Ocyus. ¶ Decidunt sorbo vniuersa,
cæteris paulatim, Plinius.

Tardius, vt quædam etiam ab hyeme
occupentur.

¶ Quædam germinant præmaturius,
& tamen tardius folia dimittunt, vt
amygdala. Quædam ferè germinant,
nec tamen tardius abijciunt, vt
morus.

¶ Regio solamq; madidum ad perdu-
randum conferunt. In siccis & om-
nino tenuibus locis natæ, prius fo-
lia deperdūt, & veteres priusquam
nouæ: quædam & antequam fru-
ctum percoquant, vt piri syluestres.

Folia aut sunt

Sibi dissimilia, vt quæ

Noua orbiculantur, veterata in an-
gulum exeunt (in quod omnium
mutatio desinit) vt populi, cro-
tonis.

Edera contra.

Vertunt partes supinas mox post
solstitium æstiuum

Olea

Tilea

Vlmus

Populus.

TABVLAE STIRPIVM

Sibi similia, vt in cæteris arboribus omnibus.

Ampla seu lata: viti, fico, platano.

Angusta, oleæ, punicæ, myrto.

Rara, vt pino, abieti, cedro, *σπανόφυλλα*, Plinius *τριχόφυλλα* legit, vertit enim capillata, pino, cedro. Rara verò inferius, vt sequetur.

Carnosa, quia constant pulpa

In rotunditatem

Cupressò, myricæ, Arboribus,

Cneoro, stæbe, Fruticibus,

Sedo, polio, Herbis.

In latitudine, vt betæ, brassicæ, rutæ.

Harundinacea, *καλαμόφυλλα*, vt palmæ, coici, cæterisq; similibus, quæ folijs angularibus constant, vt harundo, gladiolus, butomus, & cætera palustria. Horum folia quasi ex duobus constare videntur, mediumq; veluti carinam habere, vnde & cæteris meatum medius amplius porrigatur.

¶ Omnia folia parte prona supinaq; inter se distant: ac cæterorum pars supina viridior leuiorq; est: neruulos enim & venas in pronis habent, vt manus. Oleaginosaurum verò pars ea ipsa candidior, minusq; leuis. Edera quoq; frondes leues
superne

IN GENERE.

superne habet (Nervos callum & articulos superius habent, incisuras vero subter, ut manus humana, Plin.)

¶ Omnium folia quotidie ad Solem oscitant, interiores (inferiores, pronas) partes tepescere valentia, Plin. Theoph. ut sæpe dubium sit utra pars potius ad ramulum vergat, &c. Theoph.

Differunt figura

Angularia, γωνιόφυλλα. Vide Harundinacea.

Orbiculata, ut piri.

Oblonga, ut mali.

In acutum producta, & in angulum depressa, ut similacis, εἰς ὃξὺ προήκοντα, καὶ παραγωνύζοντα. Plinius vertit angulosa edera.

Multifida & quasi serrata, εὐχισα, καὶ οἷον πριονώδη, ut abieti, filici. Infecta pectinum modo, piceæ, abieti, Plin. Vitis quoque aliquatenus fissa, (χιστὰ) laciniata & (ut ita dixerim) cruciformia σχολοπώδη.)

Infecta, (ἐντομας ἔχοντα) ut vlmī. roboris, coryli.

Cum extrema, tum lateribus sinuata (πα

TABVLAE STIRPIVM

εγναθίζοντα, vt ilicis, roboris, smilacis,
rubi, paliuri. (Sinuosa toto ambitu ro-
bori: spinosa cute, rubo, Plin.)

Extremitate pungentia, pini, laricis, abie-
tis, cedri & cedriæ. (Plinius legit agriæ,
id est aquifoliæ.)

Spinas pro folijs arborum nulla habet, sed
inter suffrutices *φυλλάνθηα*.

Acorna.

Drypis.

Acanus.

Et omne ferè genus spinosorum. His
enim omnibus loco folij spina ori-
tur. Quod si quis hæc folia esse ne-
gauit, carere folijs ea omninò se-
quetur, vt quædam aculeata qui-
dem sint, folium verò habeant nul-
lum ceu asparagus.

Differunt pediculo, alia enim

Habent

Longum, vt vitis, edera.

Breuem,

Tremulum, vt populi folia, quæ & so-
la inter se crepitant, Plin.

Adnexum, vt platanus, vitis.

Quasi infixum, vt olea.

Carent, vt scillæ, bulbi, *ἀμυχα*.

Prodeun-

Prodeuntia ex

Germine, plerisq;

Ramis

Caudice, vt robori.

(Caule, in suffruticibus quibusdam & herbis.)

Radice illico, oleribus plerisq;, vt intybo
erratico, cæpe, allio, & bulbosis omni-
bus, quorum non solum quod primò
oritur, verumetiam caulis omnino si-
ne folijs est. Quorundâ folijs iam per-
fectis caulis assurgit, vt lactuce, ocymi,
apij & frumentorum. Item nonnulla
ex his caulem primò mitem, post hor-
ridulum spinis gerūt, vt lactuca & cun-
cta folia spinosa redduntur. Atq; etiam
magis in fruticum genere, vt rubus,
paliurus.

Mali quodam in genere parua medijs po-
mis emicant folia, interim & gemina,
Plinius,

Multa, pauca.

Lata, Angusta.

Plinius aliter: Iam densa ac rara, sem-
perq; lata rariora.

Ordinata, Myrto. Inordinata plerisq; a-
lijs, (pomis, Plinius.)

Concaua, in genere olerum, cæpa, gythyū.

E

TABVLAE STIRPIVM

Aspera, Læuia, Aculeata. Sine aculeis.

Fruſtum interceptum gerentia, vt laurus Alexandrina quæ fruſtum ſuper folijs gerit.

Ramuloſa, vlmo, & cytiſo, Plin.

12. Arbores differunt ſeminibus. Theoph. lib. 1. cap. 18. Plin. 15. 28. ¶ Semen partium omnium poſtremum eſt: hoc humorem caloremq; inſitum in ſe habet: qui cum deſierint, ſemen inſœcundum ſicuti vrinum ouum relinquitur.

Quorundam ſemen protinus poſt regmen ambiens ſubeſt, vt palmæ, nucis, amygdalæ, quibus ambientia plura vtique ſunt, ceu palmæ.

Quibuſdam caro & nucleuſ interiacent, vt oleæ, pruni. ¶ Huic diſtinctioni fortè eadē eſt, * quæ paulò poſt ſequetur: Semina (inquit) quibuſdam protinus carnoſa, ceu illa quæ nucum & glandium genere cōprehenduntur. Quibuſdam caro in nucleo eſt, ceu oliuæ, lauro & alijs.

¶ Hæc obſcuriora videntur: & nihil tale lego apud Plinium.

Non deſunt quibus in nucleo tantum, vel nucleacea & quaſi retorrida cōſtēt, ceu enico & ſimilibus: nec non & multis oleribus.

*Hæc ſunt
obſcura.*

oleribus. Palmæ quidem euidentissima.
Cauitatem enim nullam habent, sed tota
plena atq; persolida sunt: quanquam his
quoq; humor quidam calorq; inest.

Semina quædam

Includuntua

Siliquis *λεβοῖς*, vt

Annua quædam.

Legumina, & syluestriū alia cōplura,

Arbores, vt siliqua, cercis & colœtia,
circa Liparam.

Folliculis, *κρίν*, ex annuis quædam, vt
triticum, milium.

Vasculis, *ἀγγεία, ἰσχυρίσματα*, vt papauer
& similia: nam sesameꝯ modus quidam
peculiaris est. ¶ Nullum in vasculo
semen arboris est, nisi conum vascu-
lum dixeris, quod absolui de fructi-
bus potest.

Nuda

Sunt, vt olerum pleraq; , anethum, co-
rianifum, fœniculum, &c. *χυμνίσματα*.

Arborum nulla semine nudo est, sed ob-
ducto aut

Carne

Crusta vel cute pelliculari ceu glâs
& euboicum (id est iuglans.)

Lignosa, ceu amygdala & nux (auel
lana scilicet.

E 2

TABVLAE STIRPIVM

Congesta atq; promiscua, ἀθρόα μετ' ἀλλήλων. Et horum quædam

Putamine aliquo communi aut tunica continentur, vt punicæ, mali, piri, vitis, fici.

Nullo communi (tegmine) includuntur: vt ex annuis spicata, nisi quis spicam ipsam ambiens quoddam esse putarit. Quod si ita sit, racemus quoq; in se habebit, & reliqua quæ racemata æduntur, quæq; vniuersa ob fertilitatem virtutemq; soli prodeunt: quemadmodum in Syria & alibi oleas fructificare affirmant.

Discreta atq; distantia (διεσώτα καὶ χεδ' ὄρι:) vt cucurbitæ, cucumeris: & inter arbores, fici, mali. (Sed ficum & malum inter ea etiam numerat quæ congesta aliquo communi tegmine continentur.) ¶ Plinius videtur pro hac diuisione hæc verba posuisse: Quædam inter se densa, vt vux, sorba: quæ ramos circundata ex omni parte vuarum modo degrauant. Alia rara, vt in persicis. Quædam alio continentur, vt granata.

Dependent alia congesta

Pediculo vno & singulari, vt de racemis spicisq;

spicisq; diximus (vux omnes in scapo vno, &c. grana in vna spica.)

Secus, vt grana panici, vbi vnumquodq; semen seorsim acceptum, principium annexus propriū habere videtur. In ficubus id minus euident est, quod earum grana nimio humore conculcentur: Qui quidem humor in eis vnus granis omnibus communis est: in punicis verò su⁹ cuiq; grano peculiaris humor inhæret.

¶ Plinius hunc locum, ita voluisse reddere (aut saltem imitari) videtur. Dependent alia pediculis, vt pira. Alia racemis, vt vux, palmæ. Alia & pediculis & racemis, vt ederæ, sambuci. Alia ramo adhærent, vt in lauro. Quædā vtroq; modo, vt oliuæ: nam & breues pediculi & longi. Hæc ille. Sed præter Theophrasti sententiam: fructuum enim hæc potius quàm seminum distinctio est.

¶ Differentiæ secundum figuras totasque formas oninibus ferè exploratas habentur, vt explanatione nō egeāt. Vnū hoc dicemus, quod fructus nullus rectilineus, neq; angularis.

13. Arbores differunt floribus. Sunt autem alij, Cap. 21. lib. 1.

E 3

TABVLAE STIRPIVM

Lanuginei, *χλωδαι*: vt vitis, mori, edera.

Foliati, *φυλλώδεις*: vt amygdala, mali, piri, pruni.

Grandes satis, (vt cucurbitis.)

Pusilli, vt oleaginei, quanquam foliati.

Vnicolores Bicolores.

¶ Arborum quidem flores pleriq; vnico-
lores & candidi sunt, punicæ tantum
phœniceus, & amygdalis quibusdam
rubicundi. Ex vrbaniis alia nulla bico-
lor: & si quæ sit, syluestris fuerit, vt a-
bies, cui flos croceus. ¶ Annorum flo-
res pleriq; bicolores exeunt, & dupli-
ces, (*διπλοῖ*.) Duplices dico, quòd in flo-
re alterum florem insidentem mediū
gerunt, vt rosa, viola nigra, lilium.

Nonnulli folio vno emergunt (*μοτίφυλλα*),
descriptionem tantum plurium osten-
dentes, vt flos iasione, &c. Oleæ quoq;
flos penè talis est.

Copiosus & creber est punicæ, & ampli-
tudinem sui quodammodo poni æ-
mulatur.

Plantarum congenerum aliæ

Florent, vt palma mas.

Non florent, vt palma fœmina, quæ pro-
tinus fructum promit.

Simplices & steriles, ceu

Cucu-

Cucumerum, qui postremis sarmentorū
emergunt.

Mali medicæ, illi qui velut colum quan-
dam in medio non habent.

Genus etiam vitis quoddam & punice,
fructum perficere nequit, sed ad florem
vsq; generatio tantum peruenit.

Differentes situ, nam alia, cap. 22.

Florem circa fructum ipsum producant,
vt vitis, olea: cuius postremi flosculi
perforati spectantur.

Complura fructū in medio floris tenent.

Super fructum ipsum florem insidentem
emittunt, vt punica, mālus, amerina,
prunus, myrtus. Et in fruticum genere
rosa, maiorq; pars coronariarum: se-
men enim sub floribus habent, quod
potissimum in rosa conspicitur.

Simili modo & herbaceorum nonnul-
la, vt gith, (anthemion.) Et in olerum
genere pepo, cucurbita, cucumis. Om-
nibus enim flos in postremo fructus, &
crescentibus fructibus flos diu infixus
seruatur.

Cum seminibus ipsis flores ædunt, vt aco-
rus, cnicum. & omnia quæ florem folio
numerofo producant, (παῖτα τὰ ἀνδρά.)

Singulis enim seminibus singulos flo-
res annexos gerunt.

TABVLAE STIRPIVM

Peculiari quodam modo florem in totis fructibus habent, neq; postremis insidentem, neq; in singulas partes ambientem, sed in medijs inculcatum, nisi fortè concerni nequeat propter lanuginem: ceu edera, morus.

14. Arbores differunt fructibus, quos gignunt, aliæ ex

Surculis

Nouellis, vt ficus & vitis.

Annotinis, vt olea, punica, mâlus, amygdala, pyrus, myrtus, omnesq; ferè similes.

Vtrisque, vt mali biferæ, & si quæ alia bis fructificat.

Caudice, vt morus Ægyptia: quam tamen alij ex grandibus ramis fructificare aiunt.

Grandibus ramis, vt siliqua arbor, quæ ficus Ægyptias producit.

Cacuminibus, ἀκρόκαρπα: plura ex alijs quàm ex arboribus, vt

Frumentorum quæ spicâ pariunt.

Fruticû, erica, piræa, amerina.

Olerum, quibus radix capitata.

Lateribus, πλαγιόκαρπα.

Parte vtraq; tam arborum quædam, vt
olea

olea aliquando, quod copiae indicium
esse fertur: quàm olerum, blitum, attri-
plex, brassaica. Palma etiam fructū quo-
dammodo cacumine gignit, vt & folia
& germina.

¶ Fructuum differentias secundum odo-
res, sapores, & consistentiam: quære su-
pra, vbi inter partes similes primas
de humore diximus.

Finis diuisionum in primum Theo-
phraستي librū, de historia plan-
tarum, anno 1552.

TABVLA DE FRVCTIBVS AR-
borum, ex Plinij lib. 15. cap. 24.
potissimum:

Fructus arborum aut sunt foris

Carnosi, vt

Poma in genere dicta, (ὀπώρεα.)

Mâla tum reliqua, tum cotonea per
excellentiam μήλα dicta: & in alijs
generibus, persicum, medicum siue
citream & punicum: cuius tamen
non caro sed acini, nec foris, sed in-
tus, edendo, sicut & citrei, nō quod
foris est, sed pars interior succo &

TABVLAE STIRPIVM

carne constans, edi solet, &c. Coton-
neorum alia mâlis, alia piris propiora
sunt.

Pira, pruna, è quorum genere & Armo-
niaca sunt.

Mespila, sorba fructus Perseæ.

Ficus communis, Cypria, Ægyptia (an
ad Mora?) Palmulæ & muza dicta.

Myxa (& Sebesten.)

Aliud corpus est terrestribus fragis, al-
liud congeneri eorum Vnedoni.

Cerasa medio inter baccas acinosque
genere.

Mora

Arborû, cõmunia. (An alia Ægyptia?)

Ruborum, communis, chamæbati, I-
dæi duplicis.

Acini, vt vuarum, ederæ, sambuci, (Ri-
bes vulgò dicti, &c.) Punici mali aci-
ni soli & interius sunt & angulosi: nec
cutis vlla singulis, præter commu-
nem, quæ est candida, totisque suc-
cus & caro est, ijs præcipuè quibus
paululum inest ligni.

Baccæ, vt oliuæ, lauri, corni, myrti, len-
tisci. Aquifolij quidem & spinæ (albæ
nimirum hodie cognominatæ) sine
succo. ¶ Baccæ & acini quid differât

non

non satis explicauit Plinius: sed videntur acini complures simul iungi, minores plerunq; & succulenti: baccæ pauciores & ficciores ferè, &c. Germanica lingua discrimen non habet. De baccis vide plura apud Plin. lib. 15. cap. 28.

Medio inter baccas acinosq; genere, pomis adnumerauimus. ¶ Taxi fructus sui generis est. ¶ Frutices pleriq; acinos ferunt, pauci fortè baccas.

Duri, & ceu crusta operiti, testæue.

Nuces

Iuglandes

Auellanæ (Pistacia.)

(Balanus, Myrepfica.) nux muscata vel myristica, simili iugladiū, operimēto.

Amygdalæ, tenuiore sed simili iuglandiū summo operimento secundo putaminis (ligni scilicet.) Nucleus dissimilis latitudine & acriore callo. ¶ Persicum fortè inter poma nucesq; ambigere dixeris.

Nuces pini aliarumq; coniferarum: & oxyæ vulgo fagi: Nux cupressi, piceæ, pinastri, piceastri, &c. coni potius quàm nuces dici debent.

¶ Hæc verè ostracodermis animalium conferri possunt, ob testam duriorē. ¶ Nux Indica, Nux vomica.

TABVLAE STIRPIVM

Glandes : quarū minus dura est crusta, ceu malacostracis animalium. Glandi ferarum arborum diuersæ sunt species, vt quercus, robur, escul^p, cerrus, suber, ilex, fagus veterum Græcorum. Nuces vocamus & castaneas, quanquā accommodatiores glandium generi. Armatum echinato calyce vallū, quod inchoatum in glandibus, Plinius.

Balanus cognomine myrepfica, inter nuces est.

¶ Anucum natura haud procul abesse videtur & prædulces siliquæ, nisi quod in ijs cortex ipse manditur, Plinius. vulgò S. Iohannis panem vocant. Huc & siliqua Ægyptia vel atra quibusdam cognominata cassia hodie medicis, pertinet. Arbores quidem tam paucæ siliquas gerunt, de vna & altera tantum Theophrastus ac Plinius id prodiderunt, nempe Colutea, ni fallor: sed Anagyris quoque & laburnum siliquas habent: & Acacia. Sicut & in pappos abire fructum, soli arborum coggyriæ Theophrastus: quod tamen in vite syluestri & in cotino nos obseruauimus.

TABV-

TABVLA DE IIS QVAE E RO-
bore nascuntur, ex lib. 9. Theophra-
sti hist. Cap. 8. & 9.

Robur, *ῥύς*, arborum omnium præter fru-
ctum suum alia plurima gignit, vt

Gallam

Paruulam, (& læuam)

Resinosam aliam & nigram.

¶ Galla deterrima ex robore : signum
eius quòd cauernæ translucent, Pli-
nius.

Mori specie quiddam durū & fractu dif-
ficile, id tamen rarum.

Αἰδοιῶδες, id est, effigie colis quiddam,
quod cū perficitur, durū quid parte e-
micate & perforatū, & tauri caput quo-
dammodo æmulans profert : id perra-
ptum nuclei oleæ speciem initium o-
stendit.

Pilum, *πίλον*. Hic pilula est lanacea, *σφαλ-
εῖον ἐλευῶδες*, Plinius videtur legisse
καρυῶδες. Mollis, sed nucleo (*περιπυ-
ρνήε*) durior, qua in lucernarum lu-
minibus vtuntur. Flagrant enim probe,
vt galla nigra. (Nascuntur in eo & pi-
lulae nucibus non absimiles, intus ha-

TABVLAE STIRPIVM

bentes flocculos molles, lucernarū luminibus aptos: nam & sine oleo flagrat, sicuti galla nigra, Plin.)

¶ Pilulam comigerā, cætera inutilem, ver-
no autem tempore succo melligeno in-
ficientem tum tactu tum gustatu.

Pilulam aliam in ramorum alis sine pedi-
culo, concavoq; sessilem, peculiarem,
versicoloremq;. Nam eminentes quos-
dam vmbilicos candicantes, vel passim
variantes nigris maculis habet: partem
mediam cocci tinctura infectam splen-
didamque ostendit. Aperta, nigra & pu-
tricans cernitur. (Φύει δ' ἐν περιώνη
τῇ ῥοπαῶν μαχαλίδας ἑπερὶ σφαι-
εῖον ἀμυχον καὶ κοιλόμυχον.) Gignunt
& alæ ramorum eius pilulas, corpore
non pediculo adhærentes, candicantes
vmbilicis: cætera nigra varietate disper-
sa. Media cocci colorem habent. Aper-
tis amara inanitas est, Plin.

Pilulam è folijs cōuolutam, compressam
atq; oblongam.

Pilulā super folijs tergo adhærentē, candi-
cantem, translucidam & aquosam dum
tenera est. Hæc etiam muscas interdum
intus continet, veniensq; ad incremen-
tum

IN GÈNRE.

94

tum iustum, in modum lævis paraula
gallæ indurefcit. Sed hæc rarenter adna
fcitur. (Et in folio rubente aquosos nu
cleos candicantes, &c Plin.)

¶ Pilulæ diuerfæ (σφαίρα) quinq; generū
& cachrys sexta. Sed & cætera omnia
(præter lapillum fortè) pilulæ dici poffe
videntur à figura.

Lapillum, pumiceū ferè, (χιονοειδὴς)
sed rarò. (Aliquādo & pumicos gignit.
Plinius.)

Horū quædam Gaza obfcurius tranftu
lerat. Tranftulit & Pli. 16. 7. fed quædā
omifit: in quibusdā differt, vt anno
tauimus.

Ferunt robora & cachryn, (quæ postquā
folia decidere, hyeme durat in platano
quoq; nuce, tilia, picea, larice, abiete.)
Eft autē pilula in medicina vrendi vim
habens, &c. Plin. An cachrys etiam flos
quercuum?

Fungi è radicibus & iuxta radices.

Viscum. Sed hæc duo, fungi & viscum, cū
alijs etiā arborib. cōmunia habēt, Theo.

Item mel & apes teftè Hefiodo. Nafcitur
aut hic melleus humor cælo cadēs, nec
alijs magis infidet frondibus, Theoph.
Videtur aut drosomeli, id eft, mannam
intelligere.

TABVLAE STIRPIVM

Quin & cremati roboris cinerem nitro-
sum esse affirmant, Theoph. interprete
Gaza. Sed Græcus textus habet, ex
robore cremato nitrum fieri. Ga-
za pro κατακολεθῆ rectè
κατακλυθῆ.


DE COL-

DE COLLECTIONE

STIRPIVM IN GE-

NBB.

*De colligendis stirpibus ex præfatione
Dioscoridis.*



NTE omnia curandum est, vt tempestiuè legantur & seruentur omnia. Ex hac siquidem obseruatione efficacia sunt aut euanescent medicamenta omnia. Serena itaque tempestate colligi debent. Refert enim magnopere ne à siccitate aut imbribus legantur: & vt è montanis, ventosis, frigidis, nec vliginosis locis, potius quàm contrarijs petantur. Nam quæ in campestribus, vliginosis, vmbrosis nec vento perflatis proueniunt, plerunque ignauiora sunt: Multòq; magis quæ non sua tempestate & importunè lecta fuerint, aut infirmitate distabuerint. Nec ignorandum illud etiam, sæpenumero hæc ipsa loci proprietate & anni temperamento, ocysus aut serius in integram ætatem absolui.

EX EPISTOLA HIPPOCRATIS
ad Cratenam.

F

DE COLLECTIONE

Tu quo ad fieri potest, nobis montanas maximè & in altis collibus nascentes herbas radicitus refeca. Sunt enim aquosioribus solidiores & acriores, propter terrę densitatem & aeris tenuitatem. Nam quod attrahunt frigidius est. Conare tamen vt etiam de his quę circa stagna nascuntur, & de palustribus, fluuiatilibus aut fontanis, flores colligas: quas sanè debiles, & exolutas, ac dulcis succi esse scio.

Et inferius, Sed & herbis multa reptilia venenum immittunt, & hiatu suo internæ ipsarum teneritudini adflictionem pro auxilio inspirant. id quod latet, nisi sanè nota aliqua aut macula, aut odor ferus & grauis, rei factę indicationem fecerit.

DE COLLIGENDIS HERBIS, EX *lib. 1. pharmaco. Iac. Syluij.*

Ex herbis plurimę solùm virides in vsum recipiuntur, dum hæ vel harum succi in syropos coquuntur, & in apozemata, clysteres, forus, cataplasmata, & alia id genus, in quos vsus postremos quouis tempore leguntur. In syropos autem, vel formam aliquam toto anno seruandã, sunt legendę quando sunt efficacissimę, cum scilicet florent,

aut

aut etiam semine iam plenæ sunt, vt fumaria, calaminthe, & aliæ ex sequentibus in syrupos vel alia composita diu seruanda recipi solitæ. Nam fumariam florentem veris initio, semine autem plenam veris fine legit Mesues.

Quòd si herbæ nec caulem, nec florem nec semem edunt, vt adiantum omne, asplenium, legantur in foliorum vigore: quando scilicet maxima & virentissima sunt.

Quædam dum florent aut sementescunt quia lignosæ sunt & exuccæ, ante id tempus in vsum trahuntur, vt beta, bralsica, cichorium, chondrilla, eupatorium, lapatha, plantagines, verbaseum, verbenaca.

In quo virium vigore etiam sunt colligendæ quæ siccantur, & in vsus medicorum varios anno etiam toto seruantur, vt absinthium omne, adiantum omne nobis (quibus enim abundat, virens & vicens vsurpatur) anethi coma, betonica, carduus benedictus, cichorium, centaurium paruum, calaminthe, menta, chamædrys, chamæpitys, eupatorium, eufragia, fumaria, hyssopico-ma, marrubium, maiorana, organum, polium, pulegium, ruta, rosmaris, saluia, (licet hæ duæ etiam sine floribus sint efficaces) scordium, splenium, thymum, thymbra,

DE COLLECTIONE

verbasum. Aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colore, præsertim quæ cacumini sunt propiora.

Absinthium vere legit Mesues ad succum & aquam inde stillandam, flores eiusdem æstatis initio, hic autem æstatis fine vel etiam autumno. Eupatorium quoque legitur & ex eo succus exprimitur in fine veris, Mesues. Siccantur autem in umbra magis, nisi quæ sunt caule crassiore, aut folio humidiores, & ob id apto putrescere. Vbi probè sunt ficcata reponuntur, ut radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutandæ, Hæc Syluius.

De herbis colligendis, siccandis, & reponendis ex Matthioli commentarijs in præfatione Dioscoridis de materia medica.

Demetendi tempus, recondendi locus, perdurandi terminus obseruandus est, tum in stirpium, tum etiam animalium partibus, ut in hirci sanguine, lupi iocinere, intestino, ac etiam stercore, vulpis pulmone, apri vesica, anguium senecta, alijsque consimilibus. Assumantur igitur hæc omnia eo demum anni tempore, quo magis suis viribus sunt præditæ,

ditæ, nullo planè modo neglecto tempo-
rum ratione, quibus singula decerpi postu-
lant. Neq; enim damnandi sunt, qui in qui-
busdam plantis colligendis quædam decre-
ta tempora, nonnullosq; errantium syderû
aspectus obseruant: quippe quod apud gra-
ues auctores scriptum inuenerint, pœoniæ
radices contra comitiales non esse euellan-
das, nisi decrescente luna. Quæ quidem opi-
nio non prorsus reprobanda videtur, nec ad
ineptas incantationum, aliarumque vanita-
tum, quas stultè (vt ait Galenus) prodidit
Pamphilus, comparanda. Nam cum infe-
riora terrestria à superioribus cœlestibus gu-
bernentur, & regantur, fieri maximè potest,
vt luna, vt quæ cæteris errantibus sideri-
bus est nobis magis proxima, motuque ve-
locissima, maximam cum plantis omnibus,
ac rebus quibusuis alijs habeat rationem,
tum cum augetur, tum etiam cum minui-
tur singulis mensibus. Quamobrem non te-
merè à Galeno proditum est, alyssum her-
bam tantum Sirio ardente ad canum rabio-
forum morsus esse euellendam, sicuti etiam
fluuiatiles cancos ad idem peridoneos.
Quo etiam tempore captamus scorpiones,
atque anchusa radice constat sanguineo sue-
co madente. Quemadmodum & stirpes.

DE COLLECTIONE

quibus facultas exalfaciens inlit, perpetuo in locis calidis ac ficcis demetere conuenit. Quocirca Hippocrates ad Crateuam ſcribens: Adnitere inquit, quantum potes, vt nobis montanas maximè, & in altis collibus naſcentes herbas à radicibus reſeces: quandoquidem hæ firmiores, atque acriores ſunt ijs, quæ aquoſioribus naſcuntur locis: idque quod in montibus terra ſit denſior, & aer tenuior, nam quod attrahunt, frigidiuſ eſt. Quin etiam dabis operam, vt flores ex his herbis etiamnum decerpas, quæ circa ſtagnantes aquas, paludes, fluuios & fontes prodeunt, quas ſanè debiles & exolutas, ac dulcis ſucci eſſe ſcio. Hæc Hippocrates.

Herbæ ſimiliter atque radices, legendæ ſunt, ſiccandæ ac aſſeruandæ, his tamen demptis, quæ tum in medicinæ uſu, tum in cibis, tum etiam in obſoniorū condimentis quotidie virentes uſurpantur, veluti lactuca, intubus tam domeſtica, quàm agreſtis (cichorium appellant) portulaca, bugloſſum, beta, atriplex, blitum, braſſica, viola nigra, malua, helxine, linozoſtis, ocimum, apium, hyoſciamus, ſedum, plantago, aſparagus, acanthus, & aliæ complures. Atq; non ſolùm refrigerantibus herbis, verum etiam exalfaci-

cienti.

cientibus recentibus utimur: plerumque enim ex calida potestate præditis, virides siccis præponimus, præsertim ubi minus calfacere sit opus: siquidem humor in virentibus exuberans earum caloricam facultatem haud parum demulcet. Cuius quidem classis habentur, amaracus, crucea, nasturtium, menta, absinthium, thymus, satureia, ruta, calamintha, sisymbrium, pulegium, abrotonum, & id genus permulta.

Sunt præterea & alia, quæ demetiri expetunt, cum primum floribus ornantur, ut centaurium minus, viola purpurea, origanum, symphytum petrum, pulegium, serpyllum, amaracus, polium, thymus, chamedrys, chamæpithys, anthemis, chrysanthemum, stoechas, hyssopum, fumaria, aliaque consimiles plantæ, quas ne longior, quàm par sit, esse videar, ex industria prætereo. Hæc igitur omnia serena cœli constitutione, non nubibus, non imbribus infestis imprimis colligantur oportet. Deinde terra expurgata, atque alijs aduentitijs excrementis amotis diligenter in umbra siccentur. Nisi ex eo genere habeatur, quæ caulis crassitudine, ut in acantho: vel foliorum lentore, crassitie, & humoris exuberantia, ut in portulaca, & crithamo, omnino insolari expetant, quandoquidem si

DE COLLECTIONE

eiusmodi herbæ in vmbra siccandæ reponantur, dubio procul situ obducentur, & putrescent. Cæterum vt rectè exiccatæ fuerint, decusso puluere, in sacculis ex corio, vel ligneis capsulis, recondantur, ac diligenter claudantur, ne earum vires euanescant. Quæ in re errant seplasiariorum pleriq;, qui herbas iam siccatas in fasciculos digerentes ad officinaria laquearia suspendunt, vbi non solum breui viribus destituuntur, aëris ambientis exuptione, ac ventorum perflatu, sed etiam puluere, & aranearum telis obsiduntur, quin etiam muscarum stercore, quæ illis die noctuq; insident, labefactatæ nigricant. Neque verò planè laudibus efferendi sunt ij, qui in linteis sacculis, ipsisq; textura admodum raris eas trabibus appendere consueverunt: quippe æstius aër in ipsos penetrans, quicquid boni inest, absomit & abolet, quin etiam puluere obsitæ corrumpuntur, & contabescunt. Idcirco vt tam herbæ, quam radices suas integras asseruent facultates, nihil quidè præstantius, quàm eas capsulis tiliaceis, vel piccis, vel fistilibus, diligenter clausis reponere, vt docet Hipp. ad Crateuam his verbis scribens. Omnia medicamenta, quæ succi & liquoris fluidi sunt, in vitreis vasis ferantur: quæ verò folia, aut flores,

res aut radices sunt in fictilibus nouis probè obturatis, vt ne ventis perflata, medicinali vigorem, veluti in animi deliquium collapsa, amittant. Quod si Hippocrates in recentibus obseruandum præcipit, id maxime in siccis fieri operæ precium erit. Haecenus Matthiolus.

Sunt quæ in mensis alicuius initio aut fine potissimum florent aut fructificant, quæ nos tamen in tabulis duodecim mensium simpliciter enumerauimus. Itaq; cogitandum est non rarò fieri vt quæ in mensis alicuius initio florere solent, circa finem aut medium etiam mensis præcedentis appareant: & rursus vt quædam à præcedentis mensis siue ad principium aut medium sequentis differantur.

Pulmonaria tota æstate in quercu arbore & saxosis locis inuenitur.

Succus ex herbis colligendus in noua caulium productione, eodemq; modo ex folijs: liquores lachrymæque sectis integra ætate caulibus excipiendi, Diosco.

DE FLORVM COLLECTIONE & repositione ex eodem Matthiolo.

Flores non secus atque reliquarum plan-

DE COLLECTIONE

tarum partes, eo tempore colligendi sunt, quo magis suo in vigore consistunt, non autem cum iam flaccescentes decidui euanescent. At capparum flores muria asseruandi antea quàm se explicent, decerpuntur: rosarum verò cum non planè exciccati visuntur: cæteri deinde cum omnino expansis folijs patent. Verùm cum maiori ex parte omnes flores ferè sint herbis fragiliores, molliores & tenuiores, idcirco tantum abest, vt in sole siccandi sint, vt ne quidem in vmbra, si calida vel eminentia fuerint loca: quippe, vt solis feruore, sic & aeris calore nimio exoluuntur. Siccentur igitur in locis temperatis, quo tempore sæpius reuoluantur, ne situm contrahant, adhibita etiam cura, ne sicci natium colorem perdant, quandoquidè certum est flores, qui inter siccandum à proprio colore degenerant, nullius esse in medicina vsus. Siccantur autem probè vbi substratis lintheaminibus sparguntur, & ijsdem lenibus operiuntur. Flores itaque in vniuersum sicci ad annum duntaxat edurant, etsi anthemidis, centaurij, chrysanthemi, millefolij, spartij, & rosarum flores etiam longiori asseruentur tempore, si ligneis arculis optimè inclusi diligenter recondantur. Matth.

De floribus legendis ex Syluio.

Flores

Fores legantur cū maximè vigent, cœlo sereno, vt capparis in gemma, rosa expandi cœpta legatur : reliqui ferè aperti, sed haud ita pridem : & ex quibus vis nondum exhalauit, nec folia tenuentur, & sint decidua.

Siccantur sole vel aëre calido, magis, minus, pro varia ipsorum natura, quidam sicandos volūt donec ex ponderibus decem vnicum supersit, minus autem ex montanis floribus quàm ex campestribus minuitur, Syluius.

Flores legi debent priusquam decidan Dioscorides.

De differentia florum ratione temporum anni, locorum, &c.

Plantæ plerunquē pro peculiari aut loci, aut anni clementia maturius nunc, nunc verò serius, vt adolefcunt, ita etiam florent: sic in Germania omnia vno aut altero mense tardius florere, quàm Neapoli, aut alijs locis calidioribus videmus. Sic ex Fuchsijs monumentis Geranij speciem primam, quam acum muscatam appellari vulgò ait, Aprili mense florere : in agro tamen Neapolitano ineunte Martio, singulis annis eandem florentem obseruauit Maranta.

DE COLLECTIONE

Anni etiam constitutio eandem rebus affert diuersitatem : Sic brassicas mense Decembri caules edidisse vidit idem Maranta, ac in flores erupisse : cum vt plurimum vix Februario florere incipiant.

Quædam per hyemem flores & folia proferre solent : quædam bis per annum etiam florere, Dioscor.

Anni parte maiore florent multa quæ coluntur, hoc est verè, æstate & autumnò, & quædam inclusa etiam hyeme, vt Caryophylli, leucoia, violæ dasypodes.

Menses omnes videntur aliquas in ipsis florentes proprias habere, excepto Octobre: & hyemalibus, Nouembre, Decembre, Ianuario & Februario, si tamen Februarius in alijs Germaniæ partibus mitior sit quàm Heluetiæ nostræ, proprios ei flores dixerim leucoij bulbosi, tussilaginis, thymelææ maioris quàm zylandt dicimus, quòd Februario florere incipiant licet in Martium extendantur.

Calendula & bellis minor locis calidioribus, toto fermè anno florentes inueniuntur.

Sunt quæ vno tamen mense florent.

Alia non vno aut altero mense tantum, sed diutius, vt pentaphyllum, rhododaphne pu-

ne pumila siue herbacea.

Ocimoides, capsicum, bursam pastoris
hyems superueniens diutius florere pro-
hibet.

Quæ apud authores æstate florere legi-
mus, aut fructificare, ad mensem Iunium &
Iulium apud nos potissimum referemus.
Maius enim aliqua ex parte vernæ, vt Augu-
stus autumnalis constitutionis est, hic suo
fine, ille principio.

Tota æstate florent.

Anagallides à Maio vsq; in autumnum.

Fraga vere & tota æstate, inque maximam
autumni partem. Hyoscyamus ferè per to-
tam æstatem, præcipuè Iulio.

Phu. Ranunculi secundum & tertium ge-
nus apud Fuchsum.

Saxifraga pimpinellæ similis æstate in au-
tumnum vsq; floret.

Sideritis prima Fuchsi, folijs marrubij,
Iunio floret vsq; ad autumnii finem.

Symphytum magnum.

Autumnus velut alterum quoddam ver-
est, & multæ in eo florent, sed parcius incer-
tiusque, quæ vere copiosius non solum her-
bæ, sed etiam arbores apud nos aliquando:
hæc dum scriberet Gesnerus anno 1553. ini-
tio Octobris pyri arboris flores ad eum al-

DE COLLECTIONE

lati fuerunt, ut ipsemet scheda manu sua scripta, testatus est.

De florum differentia, ob cultum.

1 Anno 1556, cum apparuisset cometa, ver fuit satis calidum, & flores plerique duabus aut tribus septimanis praeuenerunt.

2 Stirpes vetustiores, quae in locis subterraneis, aut cellis vinarijs, aut alioquin locis tepidioribus aut hortis per hyemem seruantur, multo citius flores edunt, quam recens & modo satae plantae.

3 Flores multiplices, *gefüllte Blumen*, an & prius incipiunt flores emittere & durant diutius in suo genere? & hortensia multa quam sylvestria prius diutiusque ob alimenti copiam, si frigus & umbra, & loci natura non prohibeat.

4 Nota, Quaedam anno primo non florescere, ut olusatrum, foeniculum nostrum: nam dulce floret primo.

5 Quae primo anno florent, eodem pereunt.

6 Herbae floribus multiplicibus, *gefüllte Blumen*, plerumque steriles.

7 Herbae aliquae abscissae, vel aliter laesae, de nouo postea crescunt & florent, sed tardius.

8 An ubi in eodem genere albi, & aliorum colorum flores sunt, albi praeueniunt? in rosis, ca-

lis, caryophyllis, cyano, aquileia, ocimoi-
de. &c,

9 Quę feruntur, alia prius, alia tardius flo-
rent, prout vel autumnno vel verno, vel ve-
ris initio aut fine aut etiā æstate sata fuerint.

Eorum quę in hortis quotannis ferun-
tur, vel citius vel tardius, maior ex eo ipso
varietas est: & præstat scire quoto tempore
à satione eorum vnumquodque floreat aut
semen ferat. Cnicum Nouembri florere vi-
di, erucam etiam, nasturtium, fœniculum,
sed rara.

10 Multum refert in vasis, vel in arcis plan-
tari: hæc ferè proceriora fiunt, vel citius flo-
rent. In vasis tutiora sunt ab animalculis in-
festis.

*De nonnullis, quę florent, semen ve-
rò non gignunt.*

Sunt ex plantis quędam, quę florent qui-
dem, semen verò non proferunt, vt omnes
ferè stirpes, quę florem multiplicem emit-
tunt, Chamęleuce quibusdam dicta, Arthri-
tica, Viola Martia, dasypus, Sambucus aqua-
tica, Ranunculus, Cerasi genus vt sequitur:
quoniam vis omnis consumitur in florem.
Aquileia tamen, Calendula, & pauca alię,
semen ferunt.

DE COLLECTIONE

Acer maius apud nos, *ahorn*: cuius generis arbores quædam etiam florem non ædunt.

Cerasi genus in syluis prope Scaphusi-
am vt audio flore magno, multiplici. *Gfülle
te wilde friese.*

Erica. *Beid.*

Fraxinus in quibusdam locis.

Arbuscula quædam innominata in ri-
pis fluuiorū quorundam, (*Elzbeebre*) odo-
re nucleorum, perfici ferè in folijs & cor-
tice.

Pseudamomum sæpè apud nos. Nam in
Gallia & Italia fructum maturat, vbi in hor-
tis colitur. Nascitur apud nos sponte circa
ripas & alibi, folijs vt ribes vulgaris frutex,
quem etiam magnitudine ferè æquat. Pseu-
damomum autem esse, non piperis genus,
vt quidam putant, ex veterum descriptione
coniicio.

Salicem Homerus *oleficarpon* à sterilita-
te nominauit. In syluestri tamen latifolio ge-
nere pappos à flore auolantes loco seminis
esse Tragus obseruauit.

Tamarix.

Thymus, cui flos pro semine.

Tilia syluestris.

Viola dasypus, *gfülle violle.*

Que

Quæ semen fructumue ædant flore non antegresso (aut nucamento floris loco) nulla aut quàm paucissima sunt, vt mali quædã apud nos (vt audio) & filix fortè. Omnino quæ nec florem nec semen (aut semen non manifestum) gerunt, toto anno virent pleraque; nimirum quod succus plantæ natius non consumatur in semen: quæ verò semine abundant, vt ferulacea, & quæcunq; umbellulas gerunt in herbarum censu, hyeme ferè omnia intereunt, vbi semel fructum copiosè protulerint: quod quædam primo statim anno faciunt: alia in secundum aut tertium annum caulis germinationem & fructificationem differunt, vt in angelica nostra obseruatum est.

Sabina apud nos alicubi nec florem nec fructum ostendit.

DE SEMINVM COLLECTIONE.

Semina cùm siccari inceperint, legi debent antequam delabantur, Dioscorides.

Semina deligantur matura omnia, benè habita, plena, & corpulenta, & quæ naturæ suæ vires proprias habeant efficacissimas, & odorem, saporem, colorem, sui generis

G

DE COLLECTIONE

perfectissimum, si odoris, saporis est particeps. Sint præterea recentia, aut his proxima. Quæ enim diutissimè fuerunt reposita semina, & alia, vires habent imbecilliores, Syluius.

De seminum collectione & repositione ex Matthiolo.

Non minori studio colligenda sunt semina tam ea, quæ suis in stirpibus nuda innascuntur, vt lithospermi, fœniculi, anethi, & cari: vel vasculis, aut capitulis inclusa, vt papaueris, nymphææ, melanthij, hyoscyami, & ocimoidis: aut siliquis tecta, vt fabæ, ciceris, phasioli, dolichi, & lupini: aut corniculis recondita, vt fœnigræci, fertulæ Campanæ, sinapis & crucæ: aut varijs inuolucris contenta, quàm ea quæ circa medullam quorundam fructuum intus conduntur, quale est mali medici semen, aurantij, limonis, pyrorum, cydoniorum malorum, peponum & melopeponum, cucurbitæ & cucumeris. Veruntamen hæc assumere oportet, cum fructus, à quibus eximuntur, suam maturitatem planè senserint: illa verò vbi herbarum iam sicca, non amplius virent. Et quamuis multa reperiantur semina, quæ ad annum ultra suas asseruent vires, ea tamen quotannis

annis renouare satius ac tutius erit, siquidē pauca sunt, quæ inueterata rancorem non redoleant: quo fit vt calorem nanciscantur extraneum, & sibi non cōgenitum. Vbi igitur sicca fuerint semina arculis ligneis reponantur in locis siccis: facilē enim cōtrahunt locorum humores. Hæc Matthiol.

Quæcunque fruticosa (*φράδα*) sunt, qualis stichas est, trixago, polium, abrotonum, absinthium, seriphium absinthium, hyssopus, aliaq; his similia suis seminibus prægnantia legi oportet, Dioscor.

DE COLLECTIONE ET CON-
seruatione fructuum ex Matthiol.

Cæterum fructus, quemadmodum pruna, serica, myrti baccæ, cydonia mala, cerasa quæ vulgò marascas vocant, corna, sorba, ficus, punica mala, & alia id genus, quæ in medicinæ vsum reponuntur, operæpretiū est, vt maturi ex arboribus decerpantur: quamquam sorba, vt siccentur, immatura decerpere conueniat. At animaduertendum est, quod vbi astrictione, & repressione sitopus, fructus astringentes vt paululū potius immaturi, quàm secus, demetantur oportet. Porro iuglandes, amygdalæ, pistacia, nuclei pinei, & auellanæ non prius ex arboribus

DE COLLECTIONE

excutiantur, quàm planè vltimum maturitatis gradum senserint. Id autem rectè cognoscitur, cum extrema inuolucra sponte sua dehiscunt, & arbore concussa vnà cum fructibus decidunt, alioquin insolatu contrahuntur & sidentur. Ex his igitur, qui siccati afferuantur, capsulis ligneis potius, quàm faccis recondantur, ne extraneos humores concipiant. Qui verò per annum recentes reponuntur, aut maiori ex anni parte perdurant, in locis siccis, minimè asperginem redolentibus appendantur, vt assolet de vuis, pyris, malis cydonijs & punicis: aut super paleas expandantur, vt fit cum malis, sorbis ac mespilis: aut hordeo vel milio sepeliantur, quemadmodum medica, & aurantia mala, Matthio.

Fructus legi debent, inquit Dioscorides, maturi.

Lentiscum arborem quæ mastiché fert, & triplici fructu tria tempora monstrat arandi, Germania ignorat.

Malus medica regionibus calidis per totum ferè annum, si cura adhibeatur, floret atq; fructificat. Cirronen/limonen / vnd pomeranzen.

Seminibus & fructibus omninò carent apud nos December, Ianuarius, Februarius & Mar-

& Martius. Aprilis paucissima nec solita colligi (vt hepaticæ terrestris & cyclamini fortassis) profert.

DE RADICIBVS COL-
ligendis.

Radices quas seruari oporteat, radicumque succos, & cortices, incipiente in plantis illis foliorum defluuio erui, excipi & auferri oportet: & per se puras locis sine humore, vt erunt, siccari: lutosas verò aqua prius lauari, Dioscor.

Et paulò antè, Sciendum ex herbarum radicamentis durare ad multos annos folium candidum & nigrum veratrum, reliqua ad triennium tantum habere vsum.

*De collectione radicum
ex Syluis.*

Radices omnes incipiente foliorum defluuio legendas, & cælo sereno, censuit Dioscorides, cui in quibusdam Galenus & Auienna & Mesues consentiunt, in alijs diuersa sentiunt. Sunt contra quibus placet magis, radices esse legendas priusquam in caulem, folia, florem, fructum, semen, vis plantæ

DE COLLECTIONE

propè tota erumpat. Desfluentibus autem folijs, eas esse foetis animalibus similes, hoc est, velut semianimes ac multum imbecillas, nisi si quæ tantum habebant virium, vt etiam earum satis retineant arefacto caule, vt scilla quomodo valida animalia etiam foeta adhuc robusta permanent, nisi dicas etiam in illis quæ viua & veteri radice repullulant saluam vitalem plantæ velut sanguinem per caulem priusquam arescat, in radices, licet non totum, refluere, vt in arboribus fit.

Quouis tempore colligi possunt, quæ hominum cultu & satione crebra in omnem anni partem vegetæ incidunt, quales ferè sunt hortenses, alimentosæ, vt apij vulgaris, buglosi vtriusq;, betæ, lactucæ, intybi, oxalidis, raphani, napi, pastinacæ, sisari, cari, panacis, cepæ, porri, alij: & præter has erraticæ, dauci, gingidij, caucalidis, ari, dracunculi, cyclamini, periclymeni, cotyledonis: nam hæ quinq;, vt bulbosæ quædam aliæ, etiam æstate siccatis folijs, plenæ sunt, & frequenter autumno regerminant, alimenti pinguis & crassi copia.

Quæ verò solius naturæ sponte crescunt, aut semel à nobis tempestiuè seruntur aut plantantur, ferè sunt optimæ solo aut vere,
aut

aut (vt dixi) autumnno, paucissimæ æstate
aut hyeme.

Quin & hæ quas multis anni partibus
communes diximus, sunt præstantiores
cum tempestiuè satæ adoleuerunt & vi-
gent: alijs verò téporibus ignauiores, quan-
do vi quadam & holitoris opera & irriga-
tione coguntur adolescere sub cælo sibi pa-
rum propitio, quale æstium est ac autum-
nale & hyemale.

Sic vère ipso quando primùm germinare
incipiunt, nobis leguntur in annum inula
(Augusto, paulò post) althæa, iris, acorus,
symphytū, ruscus, (Ellebori albi radicē vere
colligit Aëtius) asparagus, petroselinum, a-
pium, fœniculum, bryonia, cyperus, rubia,
saxifraga, valeriana; cryngium, tormentilla,
pæonia vtraq;, polypodium, gramen, lilium:
nisi recentibus aliquando sit opus, sed quæ
omnino erunt imbecilliores, quàm si quo
tempore recentes colligi debent, in vsum
venissent. Hæc omnia Syluius.

• Et rursus, Radices autem legendas cū m-
folia cadunt, etiam censet Auic. canone 2.
& Platearius in Aristolochia: quædam ta-
men alijs temporibus Saladino leguntur.
veris fine, aut æstatis initio, acorus, gentia-
na: aut mense Augusto, quando etiam spina.

DE COLLECTIONE

alba vulgò bedegar, ruscus, bryonia, cypereus, iris, enula campana, dictamn^s vulgaris, pæonia, glycyrrhiza: vt Septembri peucedanum: Octobri cyclaminus recens & siccus efficax: Decembri eryngium, ijsdem leguntur. Hæc ille.

*Quo tempore radices eruendæ, & quo pa-
cto ad vsum reponendæ sint,
ex Matthiolo,*

Radicum vires, sicut & aliarum stirpium, partium, non eodem anni tempore æquè in omnibus reperiri: quandoquidem alia hoc tempore, alia verò illo humore prægnantesprehenduntur. Tametsi non desint, qui haudquaquam infirmis rationibus innixi, radices à terra eruendæ asserant semper autumno, cum videlicet folia decidunt, & caules cõtabescunt: alij verò ineunte vere, priusquam folia concrecant: siquidem hisce temporibus radicibus maior vis inest, quàm ceteris partibus. Sed vt ingenuè in hac re fatear, quid sentiam, crediderim ego omnino maiorem succi vbertatem inueniri in his qui vere effodiuntur, quippe quòd plantæ nondum caules, folia, neque flores emiserint,

emiserint, à quibus omnis radicum succus exhauritur. Sed & rationi consonum mihi videtur, autumnales radices omnes, tum paucioris, tum imbecillioris esse succi, quàm vernaes, quod scilicet pauco ante tempore & caules, & folia, & fructus ediderint. Non tamen inficiari velim, quod quæ vèrè leguntur, copiosiore, quàm par sit, humore redundantes, illoque longè minus concocto eo, qui in autumnalibus habetur, putredini & corruptioni non sint magis obnoxia, præsertimq; si longo asseruentur tempore. Quare à Dioscoride animaduersa, is sanè iussit stirpium radices effodiendas esse, cum stirpes ipsæ folijs exuuntur. Quod cum varijs anni temporibus eueniat, pro natura diuersarum plantarum, curam impendere oportet, vt suo tempore vnaquæque radix integrè, si fieri potest, cum omnibus suis adnatis euellatur, & in ijs locis, atq; sub ea cœli constitutione, quam maximè familiarem habent.

Porro radices abundè nutritæ sint oportet, ac omni putredine, & labe vacantes: non ita tamen, vt præ nimio alimento ex pingui solo, vbi nascuntur, accepto, debitam & humoris copiam, & corpulentia meram excedant, neque vt eiusdem alimenti inopia ina-

DE COLLECTIONE

nes, & rugosæ reddantur. Quod cum maximè perspexisset Galenus de iridis radicibus differens libro primo de antidodis: In vniuersum (inquit) ex omni medicinarum genere illæ radices inutiles habentur, quæ inanes sunt & rugosæ. Atque illæ quidem deteriores sunt mediocriter nutritis, & mediocrem magnitudinem nactis, quæ crassitudinis modum excedunt, & plus humoris in se continent, quam illis vsu veniat. Hæc Galenus.

Cæterum vbi radices à terra fuerint exemptæ, primum quidem tandiu aqua clara elui debent, donec omni vndique terra, vel limo penitus abstergantur: mox deraditum à fibris, tum capillamentis omnibus, quibus vniuersim ferè omnes comantur: postremo siccare eas conuenit omni adhibita cura. Quod si fuerint quales fœniculi, apij, asparagi, rusci, polipodij, rubiæ, intubi & consimilium, in vmbra, vbi orientales ventii respirent, diligenter siccentur. At omnino cauendum est, ne sole feriantur: quippe quoniam potior earum pars ab eis procul dubio euanesceret, vtpote raris & tenuibus. Verum enimuerò si ex eis fuerint, quæ natura crassæ sunt, veluti gentianæ, heleenij,

nij, mandragoræ, bryoniæ, & id genus alie, & aer sit nubilus, & hyems, ne in vmbra situ tabescant, ac proinde marcescant, in sole ac vento tutò siccati possunt. Quod commodius fieri potest, si frustatim dissectæ, ita tenui funiculo traiciantur, vt partes non se contagant, aut cratibus impositæ quotidie sæpius manibus reuoluant. At qui curandum est, ante quàm siccantur, vt lignea matrix, quæ omnibus ferè radicibus includitur, ipsis in longum fissis, integra eximatur: quippe omnino inutilis est, nullamque vim obtinet, etsi gentiana, cyclaminus, aristolochia rotunda, iris, bryonia, centaurium maius, nymphæa, aliæque complures absque matrice suas præ se ferant radices.

Siccatis radicibus, quòd planè constet, eas sine tabe, & teredine, per tempora asseruari posse, ijs reponantur in locis, ad quæ solares radij non penetrent, neque fumo pateat aditus, & quæ neque vliginosa sint, neque puluerulenta. Sit igitur locus eminens & siccus, ad Septentrionem verges, vel etiam ad meridionalem plagam, quando scilicet radices ipsæ non prorsus exiccatae reconderentur: adhibita tamen cura, ne eo tempore austeri humidissimi flatus admittantur. Ita de-

DE COLLECTIONE

nique recondi ac seruari possunt tot annis, quot ab inanitate, teredine, & tabe vindicari valeant. Nam etsi quæ tenues sunt, vt asari, phu, asparagi, rusci, & id genus aliæ anno duntaxat perennent, veratrum tamen vtrunque, quamuis radicibus constet tenuibus, ad 30. annum vsque perdurat. Hæc ex Mathiolo.

Videtur sanè radix quæque melior ante herbam vere, vel autumno herba denuo marcescente: deinde ante caulem, tertio ante florem, quarto ante semen aut fructum. Quamobrem vtile fuerit scire quo tempore quæque herba floreat, aut semen maturet. Videntur enim quæ autumno florent & semen maturant, aut paulò ante maturaerunt, illarum radices colligendæ vere: contra quæ vere florent aut fructificant, autumno: aut certe vere antequam florent, cum primum scilicet germinare apparent. Porro quæ media æstate florent aut fructificant, harum radices vere autumnòue colligas parum referre puto. si tamen propius autunnum flos fructusue earum accesserit, vere potius radices colliges, & contra. Denique nunquam florentium, radices vere autumnòue colligi possunt, vt filicum: herbæ autem ipsæ earundem, mense Maio potissimum

rum carpente. Filix quidem (vt Tragus docet) circa mediam æstatem semen habere videtur.

Radices stirpium quæ florent colligendæ sunt aliàs

Citius, Augusto nempe vel autumno, vt artritice, ellebori nigri, consiliginis.

Tardius aut diu: vt species gentianæ, saxifragæ pimpinellæ similis, vère.

Sed utroque tempore (vère & autumno) quædam à principio, aliæ medio, aliæ & fine. Vt in fine veris, quæ autumno florent, & germinat tardius: in fine autumnii, quæ æstatis medio aut fine floruerint: initio autumnii, aut in fine hyemis, quæ vère aut initio æstatis florent, Gesnerus.

De radicum tempore collectionis, exsiccationis modo, & loco conseruationis siue repositionis, vide plura apud Nicolaum Præpositum lib. i. cap. 3.

DE COLLIGENDIS ET

*aufferendis corticibus ex
eodem.*

Cortices, qui fructibus auferuntur, vt cytrij, puniceis, & cucurbitis, quique arboribus decerpuntur, veluti thuri, ligno gua-

DE COLLECTIONE

iaco, sambuco, ac fraxino : qui item herbarum radicibus detrahuntur, vt capparum, mandragoræ, thapsiæ, alypiæ, pytinæ, ac aliarum, non secus sunt siccandi, atque radices: quin etiam similiter reponendi, Matthiol.

Cortices, quæ ex radicibus stirpium colliguntur, colligi debent eodem tempore, quo radices legi debere modò dictum est, quæ verò ex seminibus aut fructibus, colligantur tempore seminibus aut fructibus præscripto, & eodem quoque modo reponendi ac siccandi. Durant verò tanto tempore, quanto ea ipsa à quibus illi sunt collecti: nisi quod fructuū cortices, vt citri, aranciorum, granatorum, seorsim à fructu diutius integri viribus conseruari possunt.

ob superflue humiditatis exiccationem. Nicol.

Præpos.

TABVLA

TABVLA STIRPIVM

PRIMA. ALPHABETICE ENVMB

rans tum florendi, tum fructificandi initia &
fines: nec non etiam alia, quæ ad ea-
rum cognitionem sunt non
inutilia.

A Bietes omnes Maio & Iunio folia ve-
tera nouis succrescētibus abijciūt.
*Abrotonum mas, stabw in r, flores Au-
gusto. h. ordine s. recessu. 5. q. s. abrotonum p. fructu ante febri-
bus & rigore. invasione, nung advenit ante infestabilem. Lumbicos interimit.*

Absinthium commune floret Iunio: in
horto verò meo vmbroso, medio & fine Iu-
lij floret.

Absinthij species, vt quidam non rectè
putant, welsamen, flosculis luteis, qui sili-
quis suis præfiguntur, vt in filio ante patrè,
floret Maio.

Absinthium in hortis floret Augusto.

Acer maius, *aborn*, huius generis arbo-
res quædam Maio florent: aliæ nunquam
florent, omnes quidem steriles sunt.

Acer minus, id est opulus, vt ego inter-
pretor, in planis semen maturat messis tem-
pore, hoc est Iulio mense: in montibus Se-
premb.

Aconitum cæruleum, napellus, in hor-

DE COLLECTIONE

is floret Iulio, & in montibus tardius ferè,
nisi aprici fuerint. Semè fert Iulio in hortis.

Aconitum luteum, medio Iunij incipit
florere. In horto meo Augusti principio, flo-
re subalbido è luteo. Semen fert, Augusto.

Aconitum flauum in hortis, floret post
cœruleum, & in fine Iunij.

Aconitum quod Lupariam vocamus,
flore palido, wolffwurtz floret Iulij medio,
vel in fine, nisi loco crescat aprico.

Acorus vulgaris floret Iunio: semen fert
Septemb.

Acorus falsus officinarum, floret Maiq.

Ægolethros vere floret: herba veneno-
sa capris & iumentis, Plinius. Hanc ego in
Boue cap. 3. descripsi, & ostendi esse illam,
quam vinitores nostri malum Heinrichum
vocant, aliqui hundts blumen, Saxones
Schuppenwurtz.

Ægolethros nigra rotunda, semen fert
Maio.

Alcali è semine natum, floret Iulij me-
dio.

Alcea Sigmarwurtz, floret Iunio, Iu-
lio & Augusto.

Algæ palustres & fluuiatiles (wasser vi-
olen: & Ampelos fluuiatilis) itè hydrolapthi
folio & flore quædam in lacu tantum pu-
to, flo-

to, florent principio Iulij.

Alismatis genus, quod Fuchsius Ophryn nominat, Alysson Plinij, simile rubiæ, maius & minus, wald meyster/klein vnd groß/florent Maio.

Alisma Italorum, & centaurij floribus purpureis, principio Iunij floret.

Alliaria floret Iunio mense.

Allium alpinum radice reticulata: foliorum eius forma refert allium vrsinum, floret Maio.

Allium montanum radice oblonga, rubescente, folijs angustis, floret Augusto.

Allium vrsinum, wald noblauch/ramseren/lac exprimitur ei ex pericarpis eius triangularis, floret in fine Aprilis, & Maij principio.

Allium hortense & sylvestre, florent Iulio.

Alnus vide etiam in Betula. Alnus suis iulis, qui ei non decidunt, floret in Vere. Sed autumnò appetente semē maturat circa Nouembrem.

Alfina hennentarm vulgaris, flosculis albis, floret Februario.

Alfinæ specices in vineis, folijs crassiusculis, angulosis, flosculis cœruleis, floret Februario.

H

DE COLLECTIONE

Alsinę species duę, flosculis cœruleis quas pingit Fuchsius: quarum altera folijs est sub rotundis, angulosis, carnosis, pilosis, in vineis. Altera folijs paruis, serratis. Item Alsinę quædam recto caule, pilosa, flosculis candidis, minimis in corymbis, insipida: Cæteris sui generis siccior, florent Martio.

Alsinę maior & minor florent Septem. & Octob.

Alsinę species glutinosa, flosculo concavo, per summum multifido, floret Iunio.

Alsinę semen profert Iulio.

Althæa floret Iulio & Augusto.

Althæa peregrina, luteo flore, floret Octobri.

Alysson Ruellij, pseudalysson in pratis, floret Maio. Alysson Ruellij, quâ ego quidem herbam inutilem & minime Alysson arbitror, floret Iulio. Alysson pratense seu Ruellij, ~~flaffenfrut~~ / crepitu seminum maturorum intra clypeos concussos, semen fert Iunio.

Alysson quorundam, floret Augusto. Sed aliud Patauio nuper ad nos missum est.

Amaracus, maiorana, samfuchum, floret Iulio, Augusto & Septemb.

Amaranthus communis minor, flos amoris

moris, quibusdam, folijs bliti ferè, spica purpurea, folijs, floret Augusto. Et alius flore non vt reliqui, sed herbaceo quodam verticillo floris loco, folij pars media ad pediculum, punicea est. Maior cuius folia nigram maculam habent, paniculis longis, ramosis, Augusto itidem.

Amaranthi Pliniani species procerior, rarior, longissimis paniculis, longe folijs, floret Octobri.

Ammi, floret Iulio & Augusto.

Ammi cuius semen simile est semini petroselini vulgaris, floret Septemb.

Ammi in hortis nostris satum, floret Octobr.

Amomum falsum, pseudamomum, floret Aprili.

Amygdalus cum persico floret in vere, Aprili: fructum fert Septemb.

Anacampteros, habent frut, vide Telephium. Semen fert Iulio.

Anagallis, morsus gallinæ, floret Maio & Iunio.

Anagallis rubro flore, floret Iunio, Iulio & Augusto mensibus. Semen fert etiam Iulio.

Anagallis purpurea, in vitibus, floret Iulio.

DE COLLECTIONE

Anagallis aquatica maior, floret Maio & Iulio.

Androsæmon, floret Iunio. Vide Bellis.

Androsæmon maius, caule quadrangulo cum eminentijs foliosis, & aliud caule rotundo, florent Iulio.

Androsæmon minus, perforata, floret Iulio.

Androsæmon, id est perforata, & androsæmon Fuchsi, cui paucioria, maioraq; sunt folia quàm perforata, fūnrat, ego posteriorem ascyroides dixerim. Sed sunt omnino congeneres herbæ. Vtræq; Iulio & Augusto florent.

Anemone lutea quædam, trollblumen/ floret ad finem Aprilis.

Anemone montana, semen profert Augusto.

Anethū floret Iunio, Iulio, & Augusto.

Angelica odorata, principio Maij floret.

Angelica odorata laser Gallicum, floret Augusto.

Angelica inodora, quæ vulgò Aquileia, floret Maio.

Angelica aquatica, floret Iulio & Augu.

Anguria in horto meo, folijs in cucurbitarum genere maximè diuisis, fert fructū Iulio.

Anisum,

Anisum, floret Iulio.

Anonis, floret Iulio.

Anthemis, flores Iulio.

Antirrhinon folijs hyssopi: & aliud aruense, flosculis purpureis, folijs perangustis, floret Iunio.

Antirrhinum folijs oblongis maius & minus, vel purpureum & album, floret Iunio.

Antirrhini genus, paruis folijs, floribus albicantibus, floret Iulio.

Antirrhini genus flore cœruleo, floret Aprili.

D. Antonij herba, sic dicta, quod igni sacro medeatur: aliqui Lysimachijs adnumerant, vt Fuchsius. Sunt qui filium ante patrē vocent, quod semina in exilibus & oblongis filiquis, antequam flos apparet contineantur. Plures huius sunt species. Floret Iulio.

Aphace Fuchsi, genus viciz syluestris, floret Maio.

Aphacæ vel viciz, aut potius orobi species, floribus flauis in caule recto spicatum digestis: folijs è viridi candicantibus, quorum bina semper eminent cum capreolo medio, floret Iunio.

Apios quorundā, erdnuß/floret Iunio.

Apium, floret Iunio.

EE COLLECTIONE

Apij genus palustre folijs cicutæ latioribus, floret Aprili, & Maio. Vide ne seseli.

Apijs cognata herba umbellifera è semine nata anno 59. in vasis, folijs saxifragæ hircinæ, olens petroselinum, floret Iunio.

Apij genera, hortense & montanum Fuchsij, à quo ille petroselinum vulgò dictum nihil quàm cultu differre conijcit: apium verò hortense veterum id esse quod vulgò apium, Ἐπρίχ vocant: ego neutram eius sententiam probo, sed partim experientia mea, partim doctorum Galliæ Italiæq; consensu, apium vulgò dictum eleoselinon facio, id est apium palustre: petroselinum verò, vulgò dictum, veterum hortense. Vide quid Belonius. florent Iulio.

Apium, semen fert Septem.

Aquilegia, in fine Aprilis floret, & Maio.

Aquilinæ vel Aquilegiæ genera omnia, florent Maio, *gsült/wyß/Blauw*.

Arbutus in calidis regionibus per Galliam & Italiam, fructum fert Septemb. Germania arbuto caret.

Argemone altera, *genseric*, vulgò Potentilla, floret Maij medio, & Iulio.

Argentaria, quæ species herbæ stellæ existimari potest, floret Iunio.

Argen-

Argentaria alpina, floret Maio.

Aristolochia longa, floret Iulio.

Aristolochia phragmites, vt sic vocem, quam nostri hætenus falsò pro rotunda habuerunt, purpurea & alba, floret Martio & Aprilis principio. In fine Aprilis semen fert: siliquæ etiam virides factæ statim dehiscunt: semina nigrore splendent.

Aristolochia crematis, floret medio & fine Maij, & Iunio.

Aron, Iulio & Augusto semen fert, floret Martio:

Arthemisia, floret Iulio.

Arthemisia tenuifolia, vide Mellefoliû.

Arthritica communis syluestris, pallida floret Februario.

Arthritica pallida, quæ singulis pediculis singulos flores sustinet, Curia Retorum, incipit autem florere Decembri si tepor sit, & in Aprilem se extendit.

Arthritica die gfült/floret Maio.

Arthritica præcipuè odorata, & tardius ea montana in rupibus, quam aliqui Lunariam, aut folium montanum vocant, floret Aprili, & species illa Curia missa, tota ferè hyeme floret.

Arthritica alpina lutea, odoratiores flo-
ribus, rubra folijs, Aprili floret.

DE COLLECTIONE

Arthritica alpina, gāle/rote/wyse in mō
tibus iuxta Thunum, floret Iunio.

Arthritica, Schlüssel Blümly, sed pallida,
inodora, preuenit odoratam, Martio floret:
& locis tepidioribus etiam Februario emi-
cat. Montana saxatilis propter loci frigidita-
tem tardius floret.

Arthritica odorata

Montana, petræa, gāl/ret: in hortis
floret Aprili.

Pratensis

Hortensis, gfült/ vnd pngfült

Arthritica inodora

Pallida

Cœrulea

Species est illa Curia missa, cui singuli
flores in singulis coliculis breuibus.

Omnes Martio florent.

Minor arthritica flore purpureo, sed
parum odorato, in horto meo, me-
dio & ad finem Martij floruit.

Arundo, floret Augusto.

Asarum, floret Februario. Aliquando
in fine Martij, vel etiam eius principio & me-
dio, itemq; Aprili. Alicubi Augusto. Circa fi-
nem Maij & Iunio semen fert.

Asclepias, quam vulgo hirundinariam
vocant, circa medium & finem Maij floret:
itemq;

itemque Iulio & Augusto.

Ascyron Fuchſij, hyperici ſeu perforatæ ſpecies, maius eo, Iunij medio & Iulio.

Asparagus, floret Maio & Iulio.

Aspergula herba repens in terra ſuper muris (ciuitatum præſertim) rubiæ cognata, folijs per genicula quaternis, ſuperius binis: plurimis ab vna radice coliculis, floſculorum albicantium corymbis, qui vt plurimum foris puniceo vel roſeo colore ſunt, floret Iunio & Iulio.

Asphodelus Germanis hætenus falſò credit^r, goldgilgen. Ego omnino lilij genus facio. videtur autem lilium cynorrhodon dictum Plinio. floret Iunio.

Asphodelus marinus in Vere ſatus, floruit in Autumno & ſemen perfecit in Vere ſequente demum, in cella ſeruatus, ac rurus flores emiſit, partim eodem caule, partim à radice media, medio Aprili.

Aſter Atticus Fuchſij, floret Auguſto & Septembri.

Aſtrantia, floret Maio.

Aſtrantia, quam aliqui Laſer Germanicum vocant: Ego non hanc, ſed Anglicam odoratam Laſer Gallicum aut Germanicum dixerim, floret Iunio.

Aſtrantia nigra in horto noſtro, floruit Iunio.

H 5

DE COLLECTIONE

Astrantia nigra in monte Pilati, Augusto floret.

Astrantia vel imperatoria nigra, maior & minor, floret Iulio.

Attractylis vtraq;, Kardobenedicten der zam vnd der wild/ Augusto florent.

Atriplices florent Iunio.

Atriplicis sylvestris species, Bonus Heinrichus, floret Iunio.

Atriplex sylvestris, floret Iulio in aruis & alibi; semen fert Octobri.

Auena, floret Iunio.

Auicularia, Syluij, vide Viola.

B

Bäreutaapen, *Spica celtica falsa*, floret in fine vel medio Iulij.

Ballote, in fine Iulij floret, & Iulij initio: Purpureo flore, in medio Iunij. *Ballote* floret etiam Septembri.

Ballote rarior, floret Augusto.

Balsaminæ pomifera herba, Augusto & Septembri floret simul & fructus profert.

Barba caprina quæ in syluis nascitur, floret Iunio: radice magna, lignosa, flore magno, muscoso, albo, odorato. Diuersum ab hoc genus locis humidis nascitur, Vlmaria quibusdā dicta, nostris *Ymbenfraut*, quod & Iulio floret.

Barba

Barba caprina, floret in fine Maij & Iun.
aliquando citius. Fructum facit Iunio.

Barba senis, vide Coronopodem, *Habermarch*.

S. Barbaræ herba, quam Galli carpentariam vocant, erucæ vel nasturtio congener, Maio & Iunio floret. In hortis Maio mense ferè defloruerat etiam eius initio: & siliquas ostendit. Italis herba sancta.

Beinhülzen frutex, floret Maio: semen fert Iulio.

Bellis vrbana & sylvestris, Galli Pasquetam vocant, quod tempore Paschatis floreat, floret Aprili. Sylvestris maior & minor floret Nouem itemq; Augusto.

Bellis maior, quam vulgò à tempore quo floret Diui Iohannis florem nominant, (vt etiam Androsæmon seu perforatam, quæ Iunij tempore florere incipit) floret Iunio circa 24. diem.

Bellis maior, floret Maio.

Bellis maior sylvestris & hortensis, floret Iulio.

Bellis maior & minor, floret Septemb.

Bellis minor hortensis, floret Maio & Septembri.

Bellis hortensis, floret Augusto. & Decembris initio.

DE COLLECTIONE

Bellis minor, quæ cœlo & regionibus tepidioribus hyeme etiam non deest, floret Martio, eadem hortensis alba, purpurea, Martio.

Bellis albus & ruber in hortis: itemq; sylvestris, floret Iunio.

Bellis semen fert Septemb. floret etiam nonnunquam Februario,

Betæ duo genera, florent Iulio.

Betonica, floret Maio, Iunio & Iulio.

Betonica Pauli Turnero: quæ & Aprili floret & Maio: & fortè toto anno, si in loco aprico sit, flosculis paruis, subcœruleis, herba pulegio vel nummulariæ potius similis est, & similiter repit, (alijs puto, *Steinpoley* est illa betonica.) floret Martio.

Betonica Pauli pulegio similis, quam Turnerus describit. Similis est nummulariæ, sed flores exiguos albicantes ædit: seminum conceptacula, vt alysson vel bursa pastoris, floret Iulio.

Betonica altilis, floret Octob.

Betonicum altile, floret Septemb.

Betonicum altile, flores caryophylli vulgò dicti, *Steinnâgele/wilde graßnâgele*/ florent Iulio. In cellis verò domuum vel caueis etiam Decembri floret.

Betonica altilis, caryophyllus flos, medio Iunij

Iunij incipit, albus puto prior, wyß/root/
lybfarb/treu ffr.

Betonica foetida vocetur, herba foetida,
caule quadrangulo, cubitali, flore betonica,
pericarpis leniter aculeatis, vt & betonica,
folijs oblongis, angustioribus quam beto-
nica, floret in fine Iunij.

Betonica species minor, Frieseneugle/
root vnnß wyß / principio & medio Maij
florent.

Betonica Aeginetæ Turnero, floret Apri-
li & principio Maij.

Betonicum montanum quoddam, flori-
bus multum dissectis, purpureis, in pratis
siccis montis Melam, floret Augusto.

Betonicum aliud montanum locis saxo-
sis vbi ferrum eruitur, innummeris ab vna
radice cauliculis, flosculis albis, radicibus
longis, subrufis, floret Augusto.

Betula suis iulis floret in vere, qui simili-
ter vt alno ei non decidunt, donec autumnus
semen perficiant: sunt enim illi loco semi-
nis, vt alno quoq;.

Bistorta maior rugosioribus folijs, & mi-
nor lenibus, Maio & Iunio florent. Limo-
nium interpretor.

Blattaria Fuchsi, verbasco similis, aut po-
tius species verbasci, floret Iunio.

DE COLLECTIONE

Blitum album, floret Iulio.

Blitum hortense rubrum (puto & viride esse, Badæ vidi) contra dysenteriam calceis imponi iubent, floret Iunio.

Blitum maculis nigris in folijs. Item hortense succo rubro, floret Iunio.

Borrago, floret Iunio, Iulio, Augusto, Septemb. Octobri, Nouemb. & locis tepidioribus Decembri. Mihi quoq; Aprili floruit, & in fine Maij.

Borrago montana Curizæ, flore flauo, in fine Maij floret.

Botrys, floret Iulio & Augusto: semē fert etiam Augusto.

Branca vrsina, Iunio et Iulio mensibus colligitur, dū floribus & semine abundat, Fuchs. Facit autem duplicem huius nominis herbam, nempe Acanthum verum & germanicum, qui sanè nō Acanthus, sed Sphondylium est.

Brassica, floret Maio, Brassicæ species florent Augusto.

Bryonia seu vitis alba, floret medio & fine Maij. Itemq; Iunio, Augusto: florem fructui prætendit Iulio. Semen gerit Septemb. Vide etiam Vitis alba.

Buglossus maior, floret Iunio.

Buglossus vulgo dicta minor, quam alij
Cyrion

Cyrsson esse conijciunt, floret Iunio.

Buglossus Italica, floret Maio.

Bulbine, *Blauw meyen rößle*, floret April. Primū minor, postea maior, quæ toto anno viret. Bulbine maior, puto circa finem Martij floret.

Bulbus syluestris, flore luteo, instar calathis, quæ Codiaminū dixerim, floret Mart.

Bulbina minor, flores ostendit Martio, sed aperit Aprili demum.

Bulbus ille Kyburgo, floret Martio.

Buphthalmus, siue cotula non foetida, Iulio & Augusto carpitur, & durat vsq; ad autumnū medium.

Buphthalm⁹ von Augspurg, floret Iun.

Buphthalmus ex Gallia missus, *nicht wie die cotula nō foetida*, vel vt bellis maior suo flore, floret Iulio.

Bursa pastoris, floret Martio, Iunio, Iulio, August. Septemb. Octob. Nouemb.

Buxus, semen fert Septembri, floret Februario.

C

Cacalia lutea, *vnser frauen schüle*, floret in Maio.

Calaminthæ genera tria Fuchsio: sed quam ille tertium genus Calaminthæ facit.

DE COLLECTIONE

ego conyzæ genus tertium dixerim, iudicet eruditi, florent Iulio.

Calamintha aruensis, sisymbrio cognata specie & odore, floret Augusto. Item aquatica similis aruensi, sed in summo etiam florens: floret Augusto.

Calamintha, incipit florere in fine Iunij.

Calamintha montana, floret Iulio: in collibus passim circa Badam, Augusto & Septembri.

Calathiana verna, B: endel blümle/ Jun-
cf here blüm/ April. Blauw / in fine Aprilis:
alias enim autumnales trium generum no-
ui: floret Aprili.

Calathianæ, autumnales violæ cœruleæ,
ex quarum genere Petilium florem Plinij
dixeris, radicibus amarissimis, de genere
gentianæ, floret Septemb.

Calceoli diuæ Mariæ, folijs ellebori, prin-
cipio Maij florēt, & Aprili.

Calendula vel Caltha, floret Maio.

Calendula, floret Iunij medio, Septemb.
Octob. Nouemb. Tota hyeme floret locis
tepidioribus, & in domo condita.

Caltha siue Calendula, floret Iulio & Au-
gusto.

Caltha palustris, maas blümchen: mas ranta
lis rubentioribus, flore magis tincto: fœmi-
na mi-

na minor, albioribus, flore luteo minus tin-
cto, floret Aprilis medio.

Campanula siue vuularia, halß Fraut, Iu-
lio & Augusto floret.

Campanula cœrulea, zäpffle fraut/ vide
Vuularia.

Cannabis, floret Iulio.

Cantabriea quorundam (sed non est, cum
radicem habeat inutilem) caule vno, iun-
ceo, cubitali: folijs vt polemonium ferè al-
bicantibus: calycibus elegantibus, pentago-
nis, calathi forma, è quibus flos quinq; fo-
liorum roseus prodit. Sponte in aruis nasci-
tur, & floret Iunio. Lychnis quorundam.
Cartheüser Blümle.

Capficum siue Cardamomum Arabicum
(non placet) Indianischer pfäffer/ rooter
vnd Brauner Catecutischer pfäffer/ cuius a-
liquot differentias, ex figura siliquorum Fu-
chsius describit: quidam hanc herbam sili-
quastrum nominant. Atqui capficum con-
stat herbam non ita pridem ex nouis regio-
nibus aduectam esse: siliquastrum verò Pli-
nij tempore in vsu fuisse, de qua ille lib. 19.
cap. 12. sic prodidit. Panax piperis saporem
reddit, magis etiam siliquastrum, ob id ppe-
ritidis nomine accepto. Et mox: Libanotis
seritur semine, &c. eadem & siliquaastro satio

DE COLLECTIONE

(Tarchon non seritur semine, sed propagatur) nec alibi aliud quicquam apud veteres (quod sciam) de siliquaastro traditur, & quam à siliquis nomen habere videatur, non tamen est necesse, quoniam id veterum nemo scripsit. Potuit enim aliunde hæc vox detorqueri, ut fortè à Salicaastro, quæ omnino clematis altera est (ut nos obseruauimus) amplexi caulis planta, & vrens, piperis scilicet sapore etiam ipsa. Ruellius costum hortensem vulgò dictam siliquastrum facit, quæ & ipsa siliquas non fert. Sed hæc amariuscula, & quanquam acrimonia non careat, pipere tamen longè inferior est. Itaque quoniam tam angustis descriptionibus adhibendæ sunt coniecturæ, Siliquastrum esse dixerim herbam. Tarchon (Tarch) Arabibus & Symeoni Sethi vocata: quæ duorum generum est, vna syluestris, pyretro recentioreū quidam adnumerat, altera hortensis. Vidi enim in Sabaudia in hortis & piperitum vocari, ad cōdimenta laudatam, aiebant autem semine feri: aliqui draconem acetarium vocant. Vetus quidem nomen aptum, nemo adhuc imposuit.

Capficum, cardamomum Arabicum, floret Augusto.

Caput monachi, halicacabus puto Fuch.
sij, floret Iulio. Carda.

Cardamomum Arabicum, vulgò piper rubrum, floret Septemb. In nostris hortis florere ante hyemem (Octobri) non desinit, fructus interim maturans. In fine Septemb. vel Octobri potius fructum edit.

Cardiaca, quam Lupi pedem Ruellius vocat, lycopodem: floribus hirsutis, mediocriter amara, floret Iulio & Iunio.

Carlina noctu se claudit, ad Solem aperit: in horto meo floruit Iulio.

Caros, vulgò Carui, *Kümich*, floret Aprili, & Iunio. Carus albus & purpureus, *mysser vnd roter Kümich* / floret Maio.

Carduus asininus communis, floret Augusto. Et alius quidam procerus in syluis angustioribus folijs.

Carduus asininus, in nullo medicine vsu, floret Septemb. & Nouemb. fert semen Octob. & Nouemb.

Carduus aruensis maior purpureo flore (qui flore nondum nato moschum olebat,) floret Iulio.

Carduus aruensis, *Haberdistel* / floret Iunio.

Carduus benedictus, de genere Cnici agrestis, sed apud nos & cæteris mihi cognitis regionibus satius tantum, floret Iulio & Septembri.

DE COLLECTIONE

Cardui genus maculis albis, quod à pleuride vulgò cognominatur, floret Iunio.

Carduus palustris, id est, humidis pratis nascens, flore purpureo, &c. nitt hasen fôl. floret medio Iunij.

Caryophyllata floret Iunio: fert semen Iulio.

Caryophyllata vrbana & syluestris, floret Maio.

Caryophyllata syluestris illa, quam aliqui Lychnidem putauerunt, locis saxosis, & apricis, floret Iulio.

Caryophyllatæ syluestris genus, mîrwîllen, flore valdè dissecto, floret Maio & Augusto: dicta mîrwîll, à laceris & dissectis vestibus, quas referunt flores variè diuisi.

Caryophyllata aquatica, floret medio Aprili.

Caryophyllus Indicus vel Portugallie minor, floret principio & medio Iulij. Caryophylli Indici domi inclusi, vsq; ad natalem Domini florent.

Castanea iulis, floret vere: maturescunt verò Septembri.

Caucalidis species puto, multis caulibus, folijs paruis, dissectis vt in Dauco hortensi, rota læuis, radice vt apij, alba, subamara, umbellis albis, Caro similis est specie & radice, eiusq; sapore, floret Maio. Cen.

Centaurij maioris species minor & degener, in campis, flore puniceo, calyce squallido, & squammatim compacto vt cyanus: folijs indiuisis minor, in pratis, heumblumen: diuisis folijs maior, calyce magnitudine auellanz, in collibus, florent Iulio. Vide Rha ponticum.

Centaurium minus, flore rubro: & quod rarius est, albo, floret Augusto.

Centaurium minus, circa finem Iunij floret. Item kleine rhaponickien principio & medio Iunij.

Centimorbia, nummularia Fuchsio, natter Fraut/pfenningfraut/ fortè Echios altera Plinij, pulegio similis, floret Iulio.

Cepe, floret Iunij medio & Iulio.

Cerasus omnis, floret Aprili.

Cerasa duracina, knellkriese, quod crepēt sub dentibus edentium, minora ceteris, sicca, cum puncto eminente in summo: Dulcia etiam in alpibus, maturescunt Aug.

Cerasa dulcia diuersorum generum maturam habem? Iunio & Iulio: acida verò tūm rubentia dilutiora, amarella vocant nostri, tūm nigricantia solidiora, quæ visula dicūt, Iulio. Sed omnium postrema maturescunt.

Cerifolium, chærephyllon maagblumen, floret medio Aprilis & fine, itemq; Maio.

DE COLLECTIONE

Chamæbuxus, vt nos vocamus: suffrutex multis à radice cauliculis pedalibus per terram stratis, folijs buxi, floribus vt viciarum dulcibus, sed colore partim ex albo, partim flauo. Nascitur collibus apricis & siccis, floret Aprili.

Chamæcyparissus, floret Maio.

Chamæcyparissus, Cyp: essent fraut/ quam aliqui abrotonū fœminam putant: ego verò aliam abrotonum fœminā noui, floret Iulio.

Chamæcyparissus, flosculus, qui se in ambitu capituli aperiunt, veluti galion habet, colore & figura, floret Iunio.

Chamædryis vera, floret Iunio & Iulio.

Chamædryis fœmina Fuchsi, cuius apud veteres quod sciam, nulla mentio, floret Iul.

Chamædryi similis herba, quā aliqui Teucrium putant, flore cœruleo, duorum generum, floret Maio.

Chamædryi similis folio, alpina herba, semine lanuginoso, semen facit Augusto.

Chamæleontis genus, quod nostri vulgò radicem apri vocitant, floret in horto meo Iulij medio.

Chamæleuce Ruellij (quam vulgò moosblumen/ id est, florem palustrem dicunt) hortensis, cui folia florum multiplicia, floret Aprili.

Chamæma-

Chamæmalum, floret Iunio, Iulio & Augusto. Floret autem bis in anno, vere inter legetes, & autumnno in agris rapitijs, Septembri.

Chamæmalum nobile repens, floret in fine Iunij.

Chamæpithys, floret Iunio.

Chamæpithys in horto meo, stirps anni superioris, floret Maio & Iulio.

Chamæsyce in aruis, floret Augusto & Iulio.

Chamæsyce, flosculo singulari minimo, vix apparente in hortulo nostro, floret Maio.

Chelidonium minus, floret Aprili: & maius quoq; tempore calidiore.

Chelidonium maius, floret Iunio & Augusto, itemq; Maio.

Chelidonium minus locis apricis, floret medio Ianuar. & Feb.

Chondrilla, floret medio Maij, Iunio & Augusto.

Chondrilla minor propè Curiam, floret Iulio.

Christophoriana, cost^o niger, floret Maio.

Christophoriana acinos nigros profert, cum calidius est ver, floret principio Aprilis.

DE COLLECTIONE

Chrysanthemon Fuchsi, ranunculo simili, floret Maio & Iunio.

Chrysanthemon verum, vnum magis flavum, alterum minus, floret Iunio.

Cicer, floret Iulio.

Cicer sylvestre floribus albis, radice pollicari ferè, foris nigra, intus alba, dulci, cicerum sapore, grad wie käfen, floret Iulio.

Cichorium, vide Intubus.

Cichorium sativum in horto meo, Augusto floret.

Cichorium vel Sonchi genus, flavis floribus, in muris ferè nascens, folijs herbæ S. Barbare, lactescit id, nec abit in pappos, milchen, floret Octob.

Cichorium, cuius flos cœruleus, Iulio mense ferè defloruit: frequentius verò floret illud cui flos luteus, quod Chondrillam eruditi quidam vocant.

Cichorium sylvestre, floret Septembri, Nouembri.

Cichorium, id est, intybus sylvestris, maior & minor, floret Augusto.

Cici, floret Augusto.

Cicuta, floret Iunio, Iulio & Octobri. Et Maio etiam: & ea quam suspicabar Cicutam.

Cicuta aquatica, Bartsenfraut, floret Iulio.

Cicuta

Cicuta maior semine magno aspero, Septemb. semen habet.

Cicuta 8. Iunij incipiebat florere Zurzachi: herba cinericei coloris, odore graui, hyoscyami ferè (lacte nullo) punicañtibu8 per caulem & ramos maculis.

Cicutæ similis minor in prato, seminibus oblongis, quæ in fine Maij apparent, geminis, non grato odore aut sapore, radice simplici, foris fusca, cicutaria minor appellatur, floret Maio.

Cicutariæ quædam calidæ inter vites duæ, florent Iunio.

Clematis Ægyptia, vulgò Peruinca, cærulea & punicea, floret April.

Clematidis Ægyptiæ genus, quod in hortis colitur, puniceis floribus, sed flores rari, vt & violæ hortensi nigræ, dasipodij, floret Octob.

Clematis Ægyptia in siliquis binis vel singulis, vt in hortensi obseruauit, fert semen Iulio.

Clematis purpurea, floret Maio.

Clinopodium, floret Augusto.

Climenum vtrunque Scrofularia alba & nigra, vt Conyza collina, floret Iunio.

Cnicus, vulgò Cartamus, floret Augusto.

DE COLLECTIONE

Codiaminum, codianon, floret in fine
Februarij.

Colchicum, herbſt blumen. Septembri
erumpunt.

Colchicum circa finem Augusti floret,
& prius etiam calidiori cœlo: & semen fert
Junio.

Colchici plantæ paucæ, quæ alioquin
autumno tantum florere solent, anno 1563.
cum Februarius tepidus esset, florebat.

Colytea Fuchſij, welſch Linſen Baum / flo
ret Maio.

Consiligo, leuſtraut/ floret Februario,
Martio, Aprili, Iunio : Maio per paucos am-
plius flores ostendit. Sed, & Nouemb. & De-
cembris initio.

Consolida regia minor & maior, floret
Augusto.

Consolida media, Bugla, gunfelen/ flo-
ret Aprili.

Consolida regalis vulgaris minor, wyß/
Blaww/lybfarbw: & alia magna cœrulea tan-
tūm mihi visa, floret Iul.

Conyza muralis, sic enim vocare libet,
quod in muris circa patriæ nostræ mœnia
nascatur: herba acris, fruticosa quodam-
modo, folijs per caulem digestis sine petio-
lo, ad duos digitos longis, simplicibus, an-
gustis,

gustis, caule cubitali, striato, fungoso, floribus per summos ramulos in ambitu subcaeruleis, foliolis minutis, cum pappis in medio, qui mox ab initio apparent, radice alba cum paucis fibris, flor. Iulio.

Conyza palustris quædam floret Iulio.

Conyza aquatica flore calendulæ, floret Augusto.

Conyza aquatica species indora, insipida, folijs oblongis, serratis, lanuginosis, floret Iunio.

Conyza species, ut videtur, quam Lani floram dixerim, floret Nouemb.

Conyza genus flore luteo, latiore, minus cæteris, odoratum, floret Octob.

Conyza utraq; *Dürrwurz* Trago, floret Augusto.

Conyza species in aridis nascens in horto meo: item *aquatica* longis & serratis folijs, flor. Iun.

Conyza species alia, caule cubitali, singulari (puto) à quo singula folia tres aut quatuor digitos longa, angusta, alternis per caulem sine petiolis prodeunt, flos in summo luteus totus ut *Chrysanthemis*, radiculis minutis, rufis, acribus ut in *ptarmice* no.

DE COLLECTIONE

Astra, nascitur collibus apricis: floret Iunio.
Vide vtrum *Dürrwurtz* esse possit.

Conyza alia!, quam in horto habeo, in colle nascens, floret Iunio.

Conyza alpina in horto meo, flor. Mai.

Conyza montana, *Böny*/ floret Augu.

Conyza genus tertium, vide *Calamintha*.

Conyzoides quædam in collibus siccis puto, in hortis viuax, flore calendulæ, floret Augusto.

Conyzoides cœrulea, *dételariam* puto aliqui vocant, flos subcœruleus, mox ab initio pappos ostendit: calida, acris & sicca herba, in muris ciuitatis: & in quibusdam syluis in montis Tigurini superiore ad dextram parte, floret Aug.

Conuoluulus maior, semen fert Septembri.

Conuoluulus maior, cui flos totus albus, & minor alternis purpureis & albis in flore partibus: qui & *helxine cissampelos* vocatur, & a sine vel iasione Theophrasto, vt nos obseruauimus, floret Iulio. Nascitur propè aquas, sed fluentes ferè, vt *solanum* perpetuum circa stantes.

Conuoluulus maior, itemq; minor, quæ & *Cissampelos*, floret Augusto.

Con.

Conuoluulus minor (helxine Cissampelos) sine lacte, vel potius paucissimo in venis foliorum: nam maior lac habet: & sepiarius rarior adhuc, floret Iunio.

Conuoluulus peregrinus, hirsutus, flore cæruleo, lactis nihil habet, saporem betæ vel cyclamini, floret August. Granum nil vocant in horto.

Conuoluulus aruensis & sepiarius, floret in fine Maij.

Conuoluulo similis præter quam flore, quam Galli tineam vocant, Germani spyn/oder schwarz winden. Ruellius & Tragus Orobanchen esse suspicantur, sed nos aliam orobanchen nouimus, floret Iulio, & Augusto, fert semen Octob.

Corchorus ille, genus apij degeneris & vitiosi, floret Iunio.

Coriandrum, semen fert in fine Iulij.

Cornus interdum Februario floret, frequentius Martio tantum.

Cornus fœmina, virga sanguinea, capris grata, vnde nomen apud Gallos, floret Maio.

Cornus medio & fine Augusti, itemq; Octobri fructum fert.

Coronopus, cornu cerui vulgò, floret Iunio.

DE COLLECTIONE

Coronopus quidam flore cœruleo, calyce ceu squammis multis tenuissimis, aridis, floret Iulio.

Coryli ante folia ædunt flores rubros croci staminibus breuissimis similes: nam iuli, quos nonnulli flores putant, colore luteo sunt, flor. Feb. & Martio suis iulis.

Corylus sativa, cui nux oblongior, frustum fert Augusto: sylvestris nuces fert Septembri.

Costus hortensis minor, floret in fine Iunij.

Costus hortensis, floret Septembri & Octob. Semen habet Nouemb.

Costo hortensi cognata, herba Iulia dicta, Septemb. floret.

Costi hortensis genus minus, quod aliqui herbam B. Mariæ vocant, in hortis nostris satum, floret Augusto.

Cotula foetida, Parthenium Brassauolæ & Fuchsio, floret Maio, & Iunio.

Crocus Vergiliarum occasu floret, id est Septembri, neque ultra mensis spatium flores durât, qui postquam deciderint, mox folia prodeunt, virentq; tota hyeme.

Crocus montanus, in fine Februarij floret: aliquando medio.

Crocus montanus in partis circa Curiam

etiam copiose, cœruleus, candidus, & ex utroque mixtus, principio Martij, in horto meo Martij medio. Unus tantum ex plurimis bulbis mihi floruit.

Cruciata folijs per genicula quaternis, herbula hirsuta, flosculis luteis, florere incipit Aprili.

Cruciata rubræ congener, floret Maio.

Cruciata Gallio cognata, floret Maio.

Crucis flores, dicti à Festo, quod crucis hebdomadam vocant, albi, cœrulei, purpurei, medicis in nullo usu, floret Aprili.

Cuculi flos, mürwillen, floret Maio.

Cucumeres, florent Iulio.

Cucumis anguinus, floret in fine Iunij.

Cucumis anguinus in hortis nostris, floret Iulio, vel ex superiore anno, si planta hyeme seruata fuerit in cella vinaria: vel quod nobis rarum est, ex planta eiusdem anni, vere sata.

Cucumis erraticus, quem aliqui asinum cognominant, floret Augusto, & mihi relictus ab anno priore, medio Maij floruit.

Cucurbitarum genera, florent Iulio, Augusto, & Septembri: maturescunt Septemb. & Octob.

Cumini syluestris genus, quod vulgò

DE COLLECTIONE

consolidam regalem vocant, Kitterspöly,
floreť Iunio, Iulio & Augusto.

Cyanus, Fornblumen, floreť Iunio.

Cyanus albus, cœruleus, puniceus, floreť in fine Maij, & Iulio.

Cyanus montanus, floreť in fine Aprilis, & Maio, in Iunio ferè defloruit.

Cyanus in aruis & hortis, floreť Maio.

Cyclaminus, floreť principio & medio Augusti, & Septemb.

Cyclaminus, ex floribus autumnalibus semen fert Aprili.

Cyclaminus prima in hortulo nostro, floreť Iulio.

Cyclamen puto tardissimè suum semē maturat, quod super terram iacet, nescio an in fine Iulij adhuc maturuerit, cum florem Aprili amiserit, aut Martio fortè.

Cynoglossus minor, flosculis cœruleis, wie vergiß min nitt, propè Curiam Rhetorum, floreť Decemb. initio.

Cynoglossus puniceo flore, floreť in fine & medio Maij.

Cynoglossus, floreť Iunio.

Cynocrambe Fuchsi: Est autem genus Mercurialis sylvestris, floreť Martio & Apr.

Cyperus, floreť Iulio. In horto meo Augusti principio & medio.

Cytisus

Cytisus suffrutex ligno duro in colle
prope Schaphusiâ floribus luteis, wie trauben
fröppfle/floret Iulio,

D

Daphnoides Fuchsi, *Thymeleæ* potius
species, syland/floret Aprili.

Cassutha, id est *cuscuta*, floret Iunio.

Daucorum & *Apiorum* genera confinia
videntur: sed fortè *apiorum* genera umbellâs
nudas habent, *daucorum* vero foliola
subnexa eis in orbem radiata. Itè illa fortè
diuturniora sunt, hæc ubi semen tulerint, in
tereunt. Iulio ferè florent,

Dauci umbellis albis sunt, aliqui etiam
roseis puto.

Daucus palustris in horto meo, floret
in fine Iulij.

Dauci genus paruum asperiusculum,
quod circa sepes & muros nascitur inutile,
floret Iul. semen facit Augusto.

Daucus sepiarius floret Iunio.

Dauci genera tria, & inter alia, vñum ge-
nus cuius semina hirsutiora sunt & multò
maiora, quam in alijs generibus, flores ex-
tremi in umbella medijs latiores, locis cul-
tis nascitur, floret Iunio.

K

DE COLLECTIONE

Dauci inutilis genus in aruis, folijs cori
andri, glyssen/ semen facit August.

Dauci genus in fossa ranarum, in cuius
umbella media nihil purpurei, flor. August.
Vide Pastinaca syl.

Dauci genus aruense, magnis, latis &
hirsutis feminibus: floriflus latioribus in um
bellæ ambitu, flor. Aug.

Dauci sylvestris species folijs non hirsu
tis in prato, flor. Iul.

Daucus quidam sylvestris, flor. Apr.

Daucus creticus vel alpinus, Gärnourz,
Meon vt aliqui coniiciunt, alijs tordilion:
nec multum interest, quando vires (ni fal
lor) eadem ferè omnium, flor. Iul.

Daucus sylvestris maior, (quē Matthio
lus pastinacam sylvestrē appellare mauult)
macula in medio umbellæ plerunque alba,
aliquando purpurea, in collibus apricis. I
tem minor inter segetes & alibi, florent
Iulio.

Dentelaria quam aliqui Irionem vocat,
flor. Iun.

Dentelaria *cinerea*, humilis herba, à
Textore medico missa, flor. Iul.

Dentelaria *petraea*, Vide cony
za muralis.

Dictamnus vulgo dicta, flor. Maio.

Digitalis

Digitalis Fuchfij, incipit Maij medio florere vel in fine, itemq; Iunio.

Digitalis duplex, flore minore, albidior: & alia, flore maiore, pallidior & intus vario, florent Iun.

Digitalis minore flore, vulgaris, albicans & maiore flore, tum aliàs luteo, tum purpureo circa Coloniã, folio minus lævis, florent Iunio.

Digitalis lutea & purpurea, florent in principio Iulij: & albicans in montibus.

Digitalis vtraq; semen fert August.

Dipsacus albus & purpureus, flor. Iun.

Dipsacus floret Iulio. Et similis ei herba carduo exiguo, echinato, rotundo.

Dipsacus flor. Septemb.

Dipsacus minor, floret Augusto: & semen fert Nouemb.

Doronicum in alpibus, flor. Aug.

Doronicum vulgò dictum, in horto nostro, circa Aprilis finem, in montibus: propter niues tardius, gemfenwurz/graffoy/ floret Maio, & Octob.

Dorycnium quorundam, floret particulatim Aug.

Dorycnium Monspelij putatum, flosculis albis per summos ramulos, veluti in orbem dispositis: figura quæ pisorum vel

DE COLLECTIONE .

loti, sed paruis, floret Septembri.

Doricium quibusdam falso dictum, toto Iulio floret.

Draco hortensis, medio Iulio & fine. Item aquaticus, Iulio medio floret serratis folijs.

Dulcis radix, Iunij fine floruit mihi in horto.

E

Ebulus floret in fine Iunij, medio & fine Iulij: baccas fert Augusto.

Echion floret toto Iunio, itemque Septemb. Fert quoque Septemb, semen.

Echion verum, quod Fuchsius triplex facit, floret Iulio.

Echinopus meus, crocodilium quorundam, floret Iulio.

Echinopus carduus, in cuius capitibus flores nulli ferè apparent, sed aculei albicantes undiquaque in diuersum tanquam in echinis rigent, folia puto scissa, angusta, & albicantia, anno 57. defloruerat omnino Aug.

Elleborus albus, floret Aprili: niger quoque eiusdem principio.

Elleborus albus circa lacum nostrum ultra Albium montem, floret Iulio.

Elleborus albus, itemque niger, flor. Apr. initio.

initio. Mas maior & durior : & fœmina maior, & mollior, ex locis ad Larium habui.

Elleborus Agyrtarum, folijs abrotoni ferè, flor. Apr. & Mart.

Elleborus niger, locis tepidioribus, circa natalem Domini, vnde nomen ei apud nos trift wurtz/floret Decemb.

Elleborus niger noster & ex Italia allatus, flor. Febr.

Elleborus niger, Martio.

Eiusdem genus à Trago exhibitum (Anemones species potius) folijs nigellæ, flore ranunculi, magno, luteo, ad solem se conuertente, quo defluente semen etiam vt in ranunculis subnascitur, Aprili mense, &c. flos Mart. fine erumpit.

Elleborus niger noster mas, floret Mar. & fœmina, quam ex Italia habui, non tamen purpureus.

Elzenbaum/floret in fine April.

Elzberg ad ripam Silæ, acinis nigris, magnitudine piperis, osse duro, singulari in- tus, &c. fert fructum medio Iulij.

Enneadynamis Polonorum, läberblüm le/in fine Iul. flor. & Septemb.

Erica vel Solago, heid/floret Augusto & Septemb.

Eruca vera, floret Iunio, Iulio & Augst.

DE COLLECTIONE

Eruca hortensis, floret Maio.

Eruca sylvestris, flor. Iun.

Eruca sylvestris nostra, flor. Maio.

Eruca sylvestris non foetida, tenera, floret Iulio.

Eruca sylvestris foetida, florebat Maio, pallidis, tanquam in spica, flosculis.

Eruca sylvestris Fuchsj, quam sinapi album sylvestre interpretatur, flor. Maio. Itē *eruca sylvestris nostra*.

Eruum sylvestre minus (nam maius in monte Albio reperi) folijs binis, longiusculis cum capreolo per medium: floribus in corymbo pulchris, luteis, loti genus, quod ab ingluvie columbina denominamus, referentibus, flor. Iul.

Eruum Fuchsj, flor. Iul.

Eryca montana Glarona allata, floret ut aiunt rupibus adnata, toto anno, (siue reuera, siue quod flores etiam siccati fortè colorem retineant) aliās Feb. & Martio.

Eryngij id est cardui cuiusdam odorati species, raddistel/*mansthrüw*/ flor. Maio.

Eryngium marinum in horto Argentinensi, ad finem Iul. flor.

Eryngium alpinū cæruleum, edler distel/ flor. Aug.

Erysimon Fuchsj, quod interpretatur sinapi sylvestre, flor. Iun. Erysi-

Erysimon hortense, eruca nobilis vel
vel minor, flor. Iun. Iul. & August.

Erysimon, aliquando Maio incipit flor.

Erysimi sylvestris species, vide in Ver-
bena.

Erysimon hortense, parcè florebat O-
ctobri.

Esula tria genera, flor. Iul.

Esula, pityusa, flor. Apr.

Esula (pityusa Dioscorid.) sed infre-
quens, flor. Aug.

Esula dulcis, Congener Militari Plinij,
florete Aprili.

Esula rotunda, peplos, flor. Iul.

Esula, flor. Maio.

Esulam scabiosam nunquam florere pu-
to: & fortè seminis loco ei sunt asperitates il-
læ in folijs supinis, vt filici, polypodio &
alijs.

Euphrasia, argentrost/ flor. Iul. & Aug.

Eupatorium, Augusto florete sed rarius,
ferè enim iam defloruit.

Eupatorium Græcorum, agrimonia,
florete Iulio.

Eupatorium Auicennæ vt aliqui pu-
tant, quod iuxta aquas nascitur, manifestè
floribus ferè organi communis, Iulio, &
Augusto.

DE COLLECTIONE

Eupatorium Mesue secundum quosdam, costo hortensi cognatum, flor. Aug. Eupatorium aquaticum, manserast.

Eupatorium aquaticum. Vide in Iulio.

F

Faba, floret Maio & Iunio.

Fagus suis iulis circa diem D. Georgij, in Aprili.

Fagus, fert glandes Septemb.

Fagus sepium apud nos dicta, *hagene büch*/cuius lignum durissimum, fructum Septemb. fert.

Ficus principio & medio Septēbri mihi in horto maturuerunt, licet loco ymbroso plantata.

Ficus, in Italia fructum fert Augusto.

Filipendula, floret Maio: principio Iulij ferè defloruerat.

Filius ante patrem maior & maximus, qui rododaphne cognatus videtur; hīc iam in Augusto ferè defloruit, & canos in filiis hiantibus ostendit.

Filius ante patrem maior & minor; vñnd das feur fraut/ id est maximus, floret Iulio. Species vna mollibus & lanuginosis folijs am *farzen see*/floret Iunio.

Filij

Filij ante patrem species maior ad aquas,
floret Iunio.

Filius ante patrem minor, in muris ciui-
tatis, floret Iunio. Et tertia species syluestris
maxima, rhododaphne folijs, floret Iunio.

Filius ante patrem maximus, rhododaph-
ne cognatus fortè, semen fert Augusto.

Filix in nocte, quæ diem D. Ioannis sa-
crum præcedit, vide Tragum, quo tempore
semen faciat.

Filices effodiuntur vergiliarum occasu.

Flos Iouis, incipit florere Maij medio: flo-
ret etiam Iulio.

Flos Iouis purpureus & albus, florent Iu-
nio Augustoque. *Die hirmel blümle*, Sep-
tembri.

Flos Portugallicus vel Indicus minor, flo-
ret Iunio & Iulio.

Flûbirle/propè Curiam, florebat Decem-
bri 63. anno, & fructus nasci incipientes ha-
bebat.

Fœniculum floret Iunio, Iulio, Augusto,
Septembri & Octobri; semen habet Sep-
tembri.

Fœnogræcum floret Iulio.

Fragaria floret Aprili & Iulio: semen fert
Iunio,

Fragaria vere, & tota æstate, floret in-

DE COLLECTIONE

quam maximam autumnū partem.

Fragaria minor sterilis ad sepes apricas (mas) quaternis folijs florum inter se discretis, principio Martij aut prius floret.

Fragaria sterilis, hirsutior, minor, marem dixeris, Feb. floret.

Fraga in altis montibus, Augusto semen ferunt.

Fraga rubra, alba, principio Iulij habentur.

Fraga in fine Maij florent: quædam in medio, pauca. Fructus fragariæ, ætatis initio, ante cerasa, & aliquandiu cum cerasis inveniuntur, montanis quidem locis, & frigidis, tardius quàm contrarijs. Alba Maio & Iunio florent.

Fraxinella, vide Dictamnus.

Fraxinus aucuparia, floret in fine Maij.

Fraxinus, fructum fert Septemb. supra Tigurum ad 4. milliaria copiosè in montibus: apud nos non fert fructum. Bey Walstatt: fructum fert Octob.

Frumentum Turcicum, floret Iulio.

Frumentum Turcicum Fuchsij, quadruplex, granis rufis, purpureis, luteis, subcandidis, florent Augusto.

Fumaria, sed rarissima, floret Febr. aliàs Maio, Iunio, Iulio, aliquando & Nouemb.

Fungo.

Fungorum genus præcipuum, & cibo gratissimum gignitur verno tempore, ab Aprili mense, usque ad Maij principia, hoc Germani vocant *Mo:chlen* (suillos) pileoli instar, foraminulentum foris, hinc dictum proverbum, *du nimmet zu wie die Mo:chlen im Meyen*,

Fungi vulgares, qui vulgò coqui solent, *heiderling* dicti, Iunio mense primùm cernuntur, & ab eo tempore ad Augustum usque mensem, pileolis rotundis, & latis similes.

Fungi genus magnum, quod à figura vocant *hasenröle*, cinerei ferè coloris, Augusto mense reperitur in sylvis propè radices quercuum.

Fungi etiam esculenti vulgò *Rödling* dicti, frutetis & arbustis cæsis, exustisq;, & terra frequentibus pluvijs humectata nascuntur per sylvas, Augusto mense.

G

Galiopsis secundū aliquos, *Braunwurtz*, floret Iulio & Augusto.

Gallion, *Gälber augentrost*, floret Iunio & Iulio.

Genista maior, floret Maio, aliquando autumno.

Genista minor non spinosa, circa Pente-

DE COLLECTIONE

costen floret, mense Iunio, vt plurimum, inde nomen apud nos, *Pfingstblumen*/ *ferbblumen*; Flos tinctorius Fuchsj, Iunio & Iulio floret. Spinosa & foliosa citius floret.

Genistella, genista minor spinosa, Maio, sed copiosius Iunio circa Pentecosten, *Stechendpfrimmen*.

Genistella aculeata, & altera caule foliato, semen facit Augusto.

Gentiana floret Iunio.

Gentianæ species, *madelgâr* dicta vulgò, floret in fine Iulij.

Gentianæ species quam cruciatam aliqui vocant, *madelgâr*, ab incisione radicis cruciformi, floret Iulio.

Gentiana cruciata, à dissecta crucis instar radice, semina minima, subruffa, subrotunda, cum gentiana magna lata habeat semina, profert Aug.

Gentiana minor in alpibus, floribus magnis puniceis, caule cubitali, radice pollicis vel duorum crassitudine, amariore quam gentianæ maioris, *wachst höher vnd wilder*/ floret Augusto. Item *die groß Bitterwurt* in alpibus. Item Gentiana palustris florent Augusti medio & fine.

Gentiana pumilla, flosculo cœruleo instar calathi, in pratis humidis, radiculis albis, rara,

bis, rara, floret Octobri.

Geranium primum, Storchenschnabel,
floret Aprili.

Geranij genus secundum, folio maluacio
tertium & quartum, quæ vulgò dicuntur
Taubensfuß/Rüprechtsfraut/Kranetehals
Fuchsis, floret Maio.

Geranij genus, quod gratiam Dei vocat.
floret Iunio. Et eiusdem genus montanum,
quod radicem sanguinis appellant.

Geranium maius seu montanum, floret
in fine Aprilis.

Geranij, vel fideritidis species, quæ vul-
gò gratia Dei dicitur, floret Augusto.

Geranij species, apij ferè folijs, floret De-
cemb. princ.

Geranium montanum, Blutwurz, medio
& fine Maij floret.

Gerontopogon vel herbailla quam ali-
qui Tragopogona vocant, habermarf, lu-
teo flore, & alia species puniceo, ex Italia,
Girasole, vel barba de becco, floret Maio.

Geum, benedicta, caryophyllata, floret
Augusto. vide Cariophyllata.

Gladiolus seu Xiphium, floret Iunio.

Gladiolus aquaticus, Maio floret.

Glycyrriza, dulcis radix, floret Iulio, & se-
men fert Septembri.

DE COLLECTIONE

Gnaphalij genus, sed mollius, *Basenpfö*
ele, cuius flores non decidunt, candidi ro-
sei, subpurpurei, floret April.

Gnaphalion, *Rürfraut* / floret Iulio.

Wattenflachs / cuius flores non observa-
ui, & nescio an villos habeat, pappi eius in-
star laxe xylinæ dependent, fert fructū Iun.

Graminis genera diuersa, florent Maio.

Gramen Fuchsi, floret Maio.

Graminis genus radice geniculata, denti-
culata, culmo cubitali, flosculis albis, p. spica
puto ceu folijs floret Iulio.

Gramen collinum, panicula vel spica flo-
rum pallida, dodrantali coliculo, *eufoxia* est
foliorum, per transuersum, radiculae albæ,
floret Maio. Vide an Schoenantho cognata
herba?

Gramen vulnerariū, floret in fine April.

Gramen in arenosis & muris minus ple-
risq; in genere graminis, radicibus denticu-
latis (sunt autem dentes initia germinum)
& articulatis reptat, floret Iun.

Gramen quoddam duriusculum, floribus
subflauis, Martio.

Graminis vel auenæ sylvestris genus, ra-
dicibus nodosis vt in xiphio, sed pluribus in
terdum nodis, in fine Iun. fructum vt auena
ostendit. Radicum sapor puto nitrosus.

Grami-

Graminis genera varia fructum faciunt
Iunio.

Granum nil, vide conuoluulus.

Granum Nil, cuius flores noctu se ape-
riunt, in meridie pereunt, floret Septemb.

Gratiola quam centaurium aquaticū di-
seris. Hoc fortè est polemonium palustre
amarura, cuius meminit Hippocrates vete-
rinarius, in Hippiatricis Græcis ca. 32. inter
remedia hepatica, equo per nares infundi
iubens cum vino colatum. Sic autē inquit,
ἢ ἐν οἷνῳ διηθήσας διδύκον πολυμάνιον τὸ ἐν ἕλκεσι τιαλῆμαίον, κα-
λαμίνθη ἰοικὸς, ποικίλτα ἔχει πικρὰν. Hoc est, aut pole-
monium, quod in paludibus nascitur, & ca-
lamintham refert, amarū gustu, vino perco-
latum dato. (Incipit aliquando Maio flore-
rere.) nisi de Hydropipere Ruellij sentiat,
quod & ipsum pro Eupatorio (Auicennæ)
à quibusdam accipitur: floret Iul. plerunq;.

Gratiola minor, floret in fine Iunij. Sic vo-
co herbulam fruticosam, etsi subdulcem: se-
mel tantum mihi visam.

H

Hæsent ðl/ floret Iulio.

Hedera terrestris vulgò dicta, gundelrâb
floret Martio, Aprili, & Maio.

DE COLLECTIONE

Heliotropium minus, folio ocimi, odore graui, floribus albis in se retortis *ελιxοειδές*. Semen quidam commendat ad quartanas puto, floret Iulio.

Heliotropij genus quoddam, vergiß *min* nit, floret Iulio & Iunio.

Heliotropio congener, aut scorpioidi herba, flore cœruleo, in palustribus nascens *vergiß nit mein*, floret Aprili.

Helxine, parietaria, floret Iulio & Octob.

Helxine in horto meo, floret Aug.

Helxine cissampelos, vide conuoluulus.

Helxine cissampelos, floret Aug.

Helxine semen fert Octob.

Hepatica terrestris, trinitas, circa initium Aprilis ferè defloruit, & post florem folia noua producit, hyemalibus amissis.

Hepatica terrestris vulgò dicta, Italis trinitas, *guldin läberfrut* vel aurea, floret Martio, hæc per hyemem etiam florum calyces ostendit, & cum primū calor inuitat, aperit.

Hepatica terrestris, semen fert Aprili.

Heptaphyllon, Tormentilla, principio Iunij floret.

Herba Iulia, vel S. Mariæ, vt aliqui vocāt, costo hortensi congener, floret Octob.

Herba Iudaica, floret Iulio. Cognata ei quædam ex loco vmbroso, vß *dem hard* in horto

horto meo, caule quadrangulo, graui odore, floribus purpureis, tanquam vrticæ mortuæ, dilutioribus.

Herba nascens in aruis, similis ferè folijs herbæ Iudaicæ (vide ne sit illa ipsa: videtur sanè) vel tetrahit dictæ, dodrantalis, graui odore, floribus albis vna, altera purpureis, semine nigro, quaterno vt in vrticæ mortuæ speciebus, flores & semina Augusto mense profert.

Herba S. Antonij, Augusto semen fert.

Herba Trinitatis cœrulea sex plerunque folijs florum, alba, id est, albo flore, folijs nouem, vt in meo hortulo apparet: audio etiā purpuream inueniri, floret Martio.

Herniaria de anno superiore, floret Iul.

Herniaria, floret medio August.

Heydenbysop, floret Iulio.

Hieracium vtrunq, floret Aug.

Hieracij genus in pratis, floret Iunij fine & Iulio, herba pauci succi, folijs molli lanugine, &c. & in muris ciuitatum.

Hieracium pratense asperum, quod & in muris ciuitatis, floret Iulio.

Hieracium syluestre in pratis, herba asperæ lanuginis, caule striato, folijs tres aut quatuor digitos longis, integris ferè ambitu modicè angulosis: horum quæ inferiora versus

L

DE COLLECTIONE

radicem sunt, initium habent angustius, & in latius abeunt: superiora verò contrà è latioribus contrahuntur. Caulis simplex, flos luteus, floret Aug.

Hieracium minus, vulgò dens leonis, floret Aprili.

Hieracium minus, sed rarius. Item procerum in pratis, floret Maio.

Hieracium minimum, calyculo nigrante, floret Septemb.

Hieracium quoddam radice satis magna, sed folijs quàm in còmuni minoribus, Martio floret.

Hieraciũ alterũ, Ròz lefrant, floret Octob, & semen profert Octob.

Hippofellinum, olusatrum, floret Iul.

Hippuris vtraq;, floret Iulio.

Hippuris lacustris quædam, folijs mansuarenosis, in fine Iulij floret, vt puto.

Hirci barba, herba dulcis lactaria, habermarcit, alia quàm Tragopogon veterum, floret Iunio.

Hirundinaria, vide Asclepias.

Hordeum Iun. sine fructum fert.

Hordeũ metitur alibi Agu. alibi citius.

Hyacinthi siue bulbi sylvestris, floribus cœruleis genera quatuor, florent Martio.

Hydropiper, persicaria acris, semen fert Aug. Hydro.

Hydropiper, id est, persicaria sine maculis, floret Aug. & subinde semen profert.

Hyoscyamus tota æstate, sed præcipuè Iulio floret.

Hyoscyamus vulgaris, floret medio & fine Maij.

Hyoscyamus communis & Syriacus, floret Iunio.

Hyoscyamus è sylua semine luteo, floret Iul. medio.

Hyoscyamus Syriacus, semen fert Aug.

Hypericon Fuchsj, perforata, floret Iul. (species maior, caule quadrangulo, folijs nõ perforatis.)

Hypericon, vel androsæmon perforata, floret Augusto.

Hypericon minus, floret initio Iunij.

Hypoglossis vel laurus Alexandrina, floret initio Decemb.

Hyssopus, floret Iulio.

Hyssopus alba, floret Iulio.

Hyssopus rara, floret Nouemb.

Hyssopus in horto meo, floret Aug.

I

Iacea, Iunio floret.

D. Iacobi herba, floret Iun.

D. Iacobi flos, floret Iul. & Aug.

Iasminum, medio Iunij incipit florere, Iulio.

DE COLLECTIONE

Iberis, gauchblumen, genus nasturtij syl-
uestris, floret Maio.

Iberis Matthioli, floret Aug. & Octob.

Ibiscus, floret Iunio, Iulio & Augusto.

Herba ignota, Lepidion vel Iberidi cog-
nata, puto, flosculis albis, priusquam se ape-
riant puniceis, folijs serè nasturtij maioris,
ramulis multis distortis, bipedalis: radice al-
ba, simplici, intus nervosa, acri, cum superfi-
cies insignem acrimoniam non habeat, flo-
ret Septemb. Est autem Iberis Matthioli.

Ignota circa lacum Felium, flosculis cœru-
leis, vt in hederâ terrestri, geminis semper,
&c. floret Iul.

Herba ignota, quam heliotropium puta-
bam, folio ocimi, læui, Corchorus vocari po-
test, floret Iulio.

Innominata quædam fœtida, pinguis, fo-
lijs vt botrys, floribus senecionis, floret
Iulio.

Ilex aquifolia, Stehend palmen. Fructū
Septemb. fert.

Illecebra, vel Telephium sedi genus mini-
mum, floret Iunio.

Indici flores crocei, Caryophylli Indici
dicti: minor & maior specie, floret Septerm.
(Sed maior nunc primum incipit florere:
minor Iunio) simplices & cōfercti in vtrōq;
genere. Intubus

Intubus satius Iunio & Iulio floret. Cichorium etiam, id est, syluestris intubus eodem tempore incipit florere, in autumnum usque durans.

Intubi genus quoddam luteo flore, scabrum, subtenerum, ex amaro subdulce, floret Iunio.

Intubus, vide supra Cichorium.

Inula, floret Iulio, Augusto.

Iouis flos, Dondernägele/himmelrösle, floret Iulio.

Iouis flos, floret Octobri, purpureus & albus.

Iouis flos rarissimus, floret Nouemb.

Irio non foetidus (dentelaria quibusdam) acerrimus, in horto meo fructum ferebat Octobri.

Iris, floret in fine Aprilis, Maij principio & medio.

Iris minor syluestris in horto meo, floret Maio.

Et satiua itidem in horto meo Maio floret, Isatis syluestris, floret Maio.

Iua illa aruensis, forte arthemisia heptaphyllos: quæ & pro scordio videtur substitui posse, paulò minus efficax amarore, simili flore, toto similiter viscido, floret Iulio.

Iulia Italis dicta, sub finem Iun. incipit flo

DE COLLECTIONE

rere. An Iulia à mense Iulio dicitur?

Iuniperus Maio mense, cum pluuium fuerit cœlum, luteam è cortice sudat lachrymā, quæ magna in copia tanquam fungi exigui arbori adhærent, nec admodum adorata est.

Iuniperis, Maio mense tenuissimus, ac luteus puluis in auras auolat: quod semen illi esse animaduerti, quanquam & è nucleis lapidosiss, quæ baccis continentur, nouæ iuniperi plantulæ fructificant, Tragus.

Iuniperus cuius baccæ altero demum anno maturescunt, Septemb. fert.

Iuniperus, baccas fert Octob. maturas.

L

Lactucæ, florent Iulio & Sept.

Lactuca syluestris, qua pro endiuia hactenus vsi sunt Pharmacopolæ, Fuchsius: floret Iulio.

Lactucæ syluestris genus in muris, flosculo cœruleo instar calathi exigui, floret Sep. & eodem semen fert.

Lactucæ syluestris genus quoddam procerum, flosculis exiguis luteis, pappis nullis, floret Iun. Lactuca syluestris Galeni in muris sæpe nascens, rote Bletter, floret Iun.

Lactucæ syluestris genus læuis, floribus flauis, in arca mea, floret Aug. La

Lactucam syluaticam, quæ cœruleum flo-
rem apud nos fert, in altis montibus, vidi
melino flore, mensis Augusti fine florere.

Lactucæ syluestres semen habent No-
uembri.

Lagopus, aruense trifolium, floret Iunio,
Iulio.

Lagopus, fagle flee, floret Aug.

Lampfana, floret Maio.

Lampfana, flore luteo vel Lapsana, (& al-
bo flore puto rapistrum) floret Iunio.

Lancea Christi, quæ locis riguis prouenit,
folijs oblongis, dissectis, quadratis caulibus,
verticillatis, vt in marrubio, flosculis albis,
cum exiguis parpureis punctis, floret Iulio.
Sideritin primam facit Matthiolus.

Lantana vulgò Italis dicta frutex, virgis
lentis, floret Maio & Iun. dictus fortè à len-
tis ramulis: Fleiner mälbaum.

Lantana frutex rubros potius adhuc aci-
nos habet, in Iul. qui Aug. demum puto ni-
grescunt, & Sept.

Lappa maior, vide Personata.

Lapathi genera quatuor, florent Maio.

Lapathi seu rumicis genus, quod vul-
gò bonum Heinrichum vocamus, Fuchsius
tertium genus Lapathi facit, floret Sept.

Lapathū, cuius radicis vsus est ad scabiē,
floret Octob.

L 4

DE COLLECTIONE

Lapathum hortense magnū, floret. April.
Lapathum aquaticum, hydrolapathum,
folijs angustis, parum lanuginosis, ad fossas
aquarum. Hydrodracuntium Aldrouando
à floris similitudine cum bistorta, floret Iul.

Lapathi genera semen faciunt Iulio.

Lapathum, oxalis, fructum fert Iunio.

Lathyris floret in fine Maij & Iunio.

Lathyris, cataputia minor, floret Augusto.

Lattoris Plinij secundum aliquos, in hor-
to meo, genus lactucæ sylvestris, floret O-
ctobri.

Lauendula floret Iunio.

Lauendula Iulio mense ferè defloruit.

Lauendulæ paucæ, florent Septemb.

Laureolæ illud genus, quod vulgò *Sy-
land* vocant nostri, ante folia floret Feb.

Laureola vulgaris, *Syland* in alpibus se-
men fert Augusto.

Laureolæ puto species in monte propè
Curiam, parua, angustis folijs, paulò maio-
ribus quàm roris marini, flosculis purpu-
reis, odoratis, ut etiam *Syland*. Cauliculus
lignosus, sed valde lentus est, non ultra sep-
tem digitos altus, floret Iunio.

Lens palustris flosculis tripartitis, floret
Maio.

Lens floret Iunio & Iulio.

Lenti-

Lentibularia, vide Meon aquaticum.

Lepidium Æginetæ, in horto meo flo-
ret Iulio.

Lepidium folijs lauri, semen profert O-
ctobri.

Lepidium Æginetæ folijs laurinis ma-
ioribus, floret Iunio.

Leucoij genera tria, florent Maio.

Leucoia, florent Septemb.

Leucoium, keiri, Martij principio e-
mergens, statim floris rudimenta ostendit,
integer apparet ad finem eiusdem.

Leucoium, keiri: & Strasburger nä-
gely puniceum, & Roseum, odoratius, rari-
usque: & album, flor. Maio.

Leucoiō bulbosum, weißho:nung bli-
men/violas subolet.

Leucoium bulbosum, Theophrasti, flo-
ret Mart.

Leucoium, floribus violaceis, in horto
Didymi, flor. Iul.

Leucoion luteum, & album, floret A-
prili.

Leucoia medicorum, florent Aug.

Leucoium purpureum, Strasburger
nägely / flor, Octob.

Leucoium sylvestre floribus luteis, par-
uis, flor. Iul. Argent.

DE COLLECTIONE

Leucoia, rara, floret Nouem.

Libanotis, coronaria, rosmarinus, floret
Septem. & Octob.

Libanotis Italica vel Ferula, floret Iu-
lio.

Libanotidis species ex Italia, floribus
luteis in umbellis, &c. flor. medio Iul.

Libanotidis ferulaceæ genus, ex Italia
missum, his annis, in hortis nostris satum nō
potuit semen perficere ante frigora, etiam
Octob. Perfecit postea anno 57. circa medi-
um Octobrem pauca, eadem planta, quæ
iam annos durauerat circiter octo, & fortè
diutius durat, quod seminibus maturandis
non exhaustur & radices, validas ac li-
quore plenas habeat.

Lichen, hepatica, flor. Iun.

Lichen, flosculis stellatis, loco humido,
Bym rad (non videntur odorati, vt in lapidi-
bus) flor. Iul.

Ligustraria, qua pro elleboro nigro qui-
dam vtuntur, flor. in fine Apr.

Ligustrum, incipit florere Maij medio.

Ligustrum, vel (vt aliqui putant) philly-
rea, Iunio plerunq; floret.

Ligustrum, Beinhölzen / Ferngerten/
fructum fert Sept. Octob. & Nouemb.

Ligustrum aquaticum, faulbaum / 3ae
prena

pfenbaum/in medio medicinæ vsu, Septem.
fructum habet.

Lilium Mariæ, quod quidam narcissum
putant: mihi non videtur, vnser frauwen gil
gen/flor. April.

Lilij genus quod pro Asphodelo vsur-
pant, floret Maij medio & fine.

Lilium rubrum flor. Maio.

Lilium album in fine Iunij: & croceum,
vel rubrum, medio eiusdem floret.

Lilium aquaticum, vide Acorus fal-
sus.

Lilium conuallium, cui & nomen a-
pud nos ab hoc mense, Meyenryß / floret
Maio, & aliquando April.

Lilium conuallium, fert semen Iulio.

Limonium Fontanoni, in horto Didy-
mi, flor. Iul.

Limonium nostrum, vide Bistorta.

Limonium, bistorta rara, floret Au-
gusto.

Linaria, floret circa finem Iunij, alijs me-
dio eiusdem: itemq; Iul.

Linaria, quam aliqui veterum osyrim
putant, flor. Aug.

Lingua herba, Natterzung / flor. Maio.

Linum, floret Iun. & Iul.

Linum syluestre, flor. Iul.

DE COLLECTIONE

Lithospermi florum principia Decem.
se ostendunt locis tepidis.

Lithospermon, vnicaule locis cultis, flo-
ret Aprili.

Lithospermon minus, aruense, vnicaule
& multi caule, Maio florent.

Lithospermon, floret Iun. & Iulio.

Lithospermum, milium Solis, semen
fert Augusto.

Locusta herba, *Nüßle Fraut* / in acetarijs
grata, floret Iulio & Maio & præterea No-
uembri.

Lotus vrbana *gäl stund Fraut* / id est, Tri-
folium caballinum, floret Aug.

Lotus vrbana, floret Octobri & sylue-
stris, aliquando, pro sationis diuersitate.

Lotus syluestris, floret in fine Iunij, *das
gmein stund Fraut mit wyssen Blumen* / Vr-
bana eiusdem generis, eodemque odore, flo-
re tantum luteo, & siliquis differt, tardius in
horto meo, ex Italia nuper missa, floruit Au-
gusto, Septembri, & Octobri mensibus, Ita-
li veram melilotum putant.

Lotus syluestris, id est trifolium caballi-
num, floret Iunio, & semen fert Augusto.

Lotus syluestris, *ziger Fraut* / principio
Iul. ferè defloruerat.

Lotus inodorus floribus luteis, crispis,
flor. Iun. Loti

Loti vel Meleloti quædam species inodora, gälē Dubenfröpple / primo quo nascitur anno, florem edit Iulio. Itemq; species alia maior, em farzen see.

Lunariæ species folijs oblongis, asperis, albicantibus, crispis plerisque: flosculis ceu in umbello subflauis, singuli flosculi foliolis constant quaternis, reflexis. Seui initio veris, & Octobris nono primum, in vna stirpe flores apparuerunt: in alijs nulli dum.

Lunaria Græca, toto Aprili floret.

Lunaria montana circa stabula pecorū, Böni / floret Maio.

Lunaria Græca, quæ siliquas latas producit, vna rotundiores, altera oblongas, Augusto semen fert,

Lunarea lusia Alyssos quorundam, floret Aprili.

Lunaria Fuchsi, Non frant, alia quam lunaria arthritica, floret Iunio.

Lunaria in horto meo Glüblumen / gäl / audio & albas inueniri circa Vefam. Græca, siliquis argenteis. Alia à Gratorolo missa, siliquis scabris, flosculis luteis, in planta à superiore anno relicta, florent Maio omnes.

Lunaria Græca tert semen Iulio.

Lupinus floret Maio, & Iunio, & in horto meo Iulio.

DE COLLECTIONE

Lupus salictarius flor. Aug. & eodem mense semen habet.

Lyfimachij genus secundum quosdam, quod herba scilicet Antonij vocatur, & filius ante patrem. Habet autem cum flore, semen quoq; partim maturum, partim etiam elapsum Augusto mense.

Lyfimachium luteum & rubrum radice lignosa, weiderich/ flor. Iul.

Lyfimachium flauum, incipit Iunij fine florere, paulò post purpureum lyfimachiũ.

Lyfimachij genus, in quo flosculus purpureus exilibus siliquis extremis enascitur, flores & semina profert Aug.

Lyfimachij genus flore rubro: & alterum luteo, floret Augusto.

M

Mahaleb ad Vuesam semen facit Iul.

Maiorana, flor. Iul.

Malux tria genera Fuchσιο: quorum primum vocat hortense, Ern roffen/ nobis dictum quod messibus floreat, flore magno, & patulo rosarum instar, & similiter aut multiplici, aut simplici flore, purpureo, vel candido: hanc Apuleius videtur hastulã regiam dicere: (malua maxima,) Sed hanc veteribus

bus pro hortensi, & sativa in cibis vsitatam. fuisse, non est veri simile: quin potius vulgarem maluam: siue punilam siue maiusculam (quam Fuchsius arborecentem vocat. Nos longè aliam dendromalachem id est arborecentem maluam cognoscimus) sativam olim fuisse crediderim. Hortensis (inquit Fuchsius) floret Iulio, & Augusto præcipuè. flos ei diuturnus. Sylvestris minor per totam æstatem & in maximam autumnii partem durat: maior Iunio, & Iulio mensibus in primis floret. Est & aliud malux hortensis genus, paruum, pulcherrimum, quod Tragus depingit, & alceam peregrinam seu Venetam vocat, id quoque Iulio floret: Item aliud flore flauo, folijs integris in acutū desinentibus, sativum.

Malux maxima, hastula regia Apuleij
Fuchsi, *Ernrosen/gfült/einfach/wyß/vnd
rot/flor Iul.*

Malua hortensis maior, cui nomen a-
pud nos à messe, flor. Aug.

Malua magna hortensis *ernrosen / flor.
in fine Iunij.*

Malua vulgaris, flor. Aug.

Malua quædam domestica, item *die ern
rosen / Septemb.*

Malua crispa, magna, magnis & crispis

DE COLLECTIONE

ambitum folijs, floribus paruis, floret Augusto.

Malua crispa in horto meo, Septembr. floret & Octob.

Malua sylvestris, flor. Maio.

Malua sylvestris maior, Iunio & Iulio in primis floret.

Malorum genera initio Maij ferè florent.

Mala diuersorum generum, Augusto & Septembri maturescunt.

Mali vernæ, Theophrastus meminit Iunio fructum facere.

Malus præcox, paradysle batum, fructû Iunio fert, & Iulio.

Mala quædam in primis cotonea, & sylvestria (quæ sint ex malis priora, quæ tardiora) Octob.

Mala insana maturantur Augusto: herba personatæ ferè folijs, & caule.

Malum insanum Fuchsj & aliorum, flore cœruleo, apicibus luteis, flor. Augusto.

Malum insanum, in horto meo 59. Septemb. florebat, nullum ostendebat fructû, neq; Augusto.

Marrubium floret, Iunio, Iulio, & Augusto.

Marrubio similis herba, verticillis suis aculea-

aculeatis, purpureis floribus, folijs mercurialis, &c. Veteres quidam huiusmodi alyson describunt, flor. Aug.

Malua crispa, flor Iul.

Medica duplex. Satiua flore violaceo. Iunij fine floret: crescit ad duos cubitos, & vix iam sustinet seipsam: tertio anno altius crescit, hominis statura, & citius floret. Altera sylvestris, medio & fine Iunij floret, corymbis flosculorum luteis: sapore eodem & reliqua specie similis: folia vtrisque modicè mucronantur: & versus mucronem margines leuiter exasperantur. Calidæ sunt in secundo gradu, inodoræ. Crescit hæc ad murum & in muro, & albi ad margines aggerum, & fossarum siccos.

Medica sylvestris & hortensis, flor. Iun.

Medica ex Italia floribus violaceis, floret Aug.

Medica cœrulea in fine Maij flor.

Medica, vide inter Trifolia.

Melampyrū vel Myagrus in horto meo, floret Maio.

Melampyrum, vide Myagros.

Melissa Fuchsij, flor. Maio & Iun.

Melilotus albus, flor. Iun.

Melissophyllon flosculis albis, & peregrinum (quod fœtidius & magis cimices

M

DE COLLECTIONE

refert) cœruleis, floret Augusto.

Mellissophyllum floribus pallidis, flor. Iulio.

Melilotus, lutea & alba, *guldiner Flee*, eius gûten geruchs / sunderlich so er dîr ist, *ale Theophr. leert.* Medica quibusdam credita, vtraque flore coloris violacci, & altera apud nos vulgari (locis saxosis) flaua, meliloto nostro similis inodora, &c. flor. Iul.

Melilotus lutea, & alba, odorata, florent Augusto.

Melilotus inodora folijs ternis à caule remotis, & ad caulem binis, *gâle Dubenfrö* pflc / Lotus puto Fuchsj, flor. Iun.

Melilotus crispa, flore crispo, inodora, semina conuoluta habet cochleatim ferè vti medica, sed minus & minora, floret Iunij initio.

Meliloti inodori species in muro fossæ ciuitatis, in fine Maij flores habet in corymbis luteos. Calida est in secundo gradu, subacris, tenuium partium: non reperiò in Tragopogono. An Medicæ species?

Meliloto similis inodorata, capitulo florum rotundo, flauo, *stein Flee*. Medicæ species aliquibus, flor. Aug.

Meliloti inodori species *stein Flee*, quæ Medica syluestris dici potest, flor. Iun.

Meliloti

Meliloti syluestris species humilis, binis
 & regione foliolis, cuius lutei flores, suauem
 quendam & ferè lactis odorem referunt: in
 prato infra turrim in *Hard* / floret Maio &
 Iunio. Siliquas curuas & vnguium specie
 profert Iunio adulto, vel in fine Iunij.

Melilotus agrestis, flor. Iun.

Meliloti loco quidam herba trifolia flo-
 ribus luteis, sed inodora vtuntur: *steinlee*.
 Sed est alia quoque saxifraga lutea, quam
 sic nominant, in Germania inferiore, fo-
 lijs ferè aquilegiæ, radice lutea, floret Iu-
 lio.

Melo, vel Melopepon, floret Augu-
 sto.

Menthæ genera, flor. Aug.

Menta, flor. Iul.

Mentastrum florere incipit initio Iunij.
 Iul. & Aug.

Meum quorundam, alijs species seselis,
Beerwurtz / flor. Iun.

Meon aquaticum circa lacum felium,
 folia enim vt Meon *Beerwurtz* exilia & si-
 militer diuisa habet, ijsque adnatas passim
 bullas quasdam *phaxoides*, floret Iulio
 dentibularia nominetur (nam Meon alij a-
 liud ostendunt) sine radice floribus fla-
 uis, &c.

DE COLLECTIONE

Mercurialis, floret Maio, Iulio, Augusto, Septemb. Nouemb.

Mercurialis fœmina, flor. Iun.

Mercurialis syluatica mas & fœmina, sed ille rarior nobis, Martij medio floret. Mercurialis syluatica, teste Trago, se occultat vel interit Maio vel paulò post.

Mercurialis mas & fœmina semen ferunt Augusto.

Mespilus nostra, in fine Aprilis, quando que in Maio floret: fructum Octob. profert.

Millefolium vulgò dictum, garben/ album & rubens, flor. Iul. & Aug.

Millefolium flore rubro, floret Iunij medio.

Millefolium luteis floribus: item peregrinum vel odoratum, flor. Iul.

Millefolium aquaticum quoddam, flore albo ranunculi, insipidum, &c. floret Maio.

Milium, flor. Aug.

Milium Indicum vel Æthiopicum, anno 58. in horto meo flor. Iul.

Nießbeere fructum ferunt ad finem Martij, sub niuib. maturescunt, Sim Fasten see.

Morsus diaboli, flor. Aug. & Sept.

Morus fructum fert Augusto.

Musca-

Muscattella Cordi (Ophiogloss.) Maio
interit vel se potius occultat.

Myargus aliquando, relictus nimirum a
superiore æstate, Feb. flor.

Myrica floret medio & fine Maij & Iul.

Myrica Iunij initio ferè defloruerat.

Myrrhis, id est cicutaria, vt quidam pu-
tant, flor. Maio.

Myrrhis cerefolij ferè sapore, dulcior,
floret anno secundo, medio & fine Apr.

Myrrhidis (sic nominemus vel cicuta-
riæ, vel Pastinacæ syluestris) species in vijs
inter vites versus Sollicken. Item Peregri-
na quædam satiuæ: vna olet folijs cuminum
Romanum, alia veluti raphanum syluestrè,
habent radices magnas & validas, flor. Iun.

N

Nardus vulgaris, pseudonardus floret
Iun. Iul. deflorescit.

Narcissus ille quorundam, & Tragi ve-
ras, qui mihi potius anemone limonia vi-
detur, nostri Lilium diuæ Mariæ vocant,
cuius floris odor suauissimus sed lenis, flo-
ret Apr. & Maio.

Nasturtium floret Iun. Sept.

Nasturtium pratense, gaudy Blumen/

M 3

DE COLLECTIONE

floret April. Itemque hortense anni superioris.

Nasturtium palustre, floribus melinis, parum acre, flor. Maio.

Nasturtium aquaticum, floribus flavis, circa lacum, flor. Iul.

Nasturtiolum petræum, herbula omnium minima, flosculis candidis, floret Aprili.

Nigella, flor. Maio.

Nigella flore luteo, flor. Iul.

Nigella coronata calyce, satiua, maior, foliosa. Minor sylvestris puto flore è luteo subuiridi: prior cœruleum florem habet, floret Iunio.

Nigella satiua, flor. Octob.

Nigella, Schabab semen edit Iulio, Augusto.

Noli me tangere, flor. Iulio, & Iunio: locis verò frigidioribus & vmbrosis, medio, & fine August.

Nummularia floret in fine Maij (& genus minus acutius erectum in syluis) floret & Iunio.

Numularia Fuchsj, Vide Centimorbia.

Nux Iuglans, iulis verè floret: Augusto & Septembri maturescit fructus & excutitur.

Nux

Nux vesicaria, pimpernißle, floret Maio: maturefcit Septemb.

Nux Methel, Vide strammonia.

Nymphæa vtraq; apud nos Maio, Iunio que floret.

Nymphæa lutea floret Iulij principio in lacu nostro.

O

Ocimū basilicū fl. Iun. & Aug. Basilien.

Ocimi duo genera, Flein vnd groß Basilien/florent Iulio.

Ocimum, basilicum medium, album & purpureum, & ocimum citratum, odore molissæ in horto meo, flor. Aug.

Ocimi folijs herba circa sæpes nascens, flosculis albis, post quos verrucæ relinquuntur, flor. Aug. Heliotropij genus aliquando putabam.

Ocimum Tragi, heidenkorn: quod aliqui crysimon Theophrasti putant, flor. Iun.

Ocimoides, flor. Sep.

Ocimoides album duplex, rubrum duplex, & flauum, quod semel tantum vidi Lindauiz in horto Matthiæ Kurtz mercatoris, floret Iulio.

Ocimoides rubrum, quod floret in Iunio, in hortis consitum.

Ocimoides rubrum, rarum inuentu:

EE COLLECTIONE

& facilius in montibus quam alibi, floret Augusto

Ocimoides rubrum alpinum, Maij medio floret: & mox etiam album, quod tamen aliàs Iunio primum floret. Huius flores in sole flacescunt, vesperi & nocte redintegrantur: rubri semper integri manent, minusq; odorati sunt. Videtur & Ocimoides quoddam album minus odoratum esse in horto meo.

Ocimoides albo flore, calyce purpurascente vel viridi: vnum, medio apicem exerit: minus odoratum: alterum non, odoratius, quod eodem die marcescit: eadem differentia est in purpureis, floret Iunij fine.

Ocimoides albis floribus odoratis, quod aliqui non rectè ben album vocant, vt alij polemonium, Lidweich mit linden/ haraschen Bletteren/ gstatet wie die großen Basilien/ vt ego interpretor, flor. Aug.

Ocimoides purpureum floret in fine Apr. & Octob.

Ocimoides purpureum dilutum albo cognatius odoratiusque alpino, etiam die se claudit: at album alpinum non clauditur, flor. Maio.

Ocimoides croceo flore, floret Iunij medio. Vocari verò sic potest propter floris

ris speciem, omnino inodorum tamen.

Ocimoides peregrinum maius perenne:
& minus, quod eodem anno floret, floret
Augusto.

Ocimoides peregrinum minus, floret Se-
ptembri.

Ocimoidis species peregrina minor, Au-
gust. semen profert.

Ocimoides iam rarum, circa finem No-
uemb. mensis floret.

Oenante herba filipendula, floret Iunio.

Oleæ plantula, in calidioribus locis Ger-
maniæ, vt circa Rhenum, floret circa S. Ioan-
nis diem, in Iunio.

Olusatrum in horto nostro floret Maio
anno secundo puto à satione.

Ononis floret in fine Iunij & Iulio.

Ophrys Fuchsi, quæ alismatis species vi-
detur, Maio & Iunio mensibus floret, dein-
de euanescit circa festum D. Ioannis Ba-
ptistæ.

Orchis, vide Satyrium.

Orchis, genus bifolium ante caulem, cùm
& bulbum vnicum ostendit, postea caulis ac-
cedit, flores è viridi pallidi, & foliola alia in
caule, floret Maio.

Orchis genus illud rarius & elegãs, quod
in flores habeat albicantes, minutos &

DE COLLECTIONE

punctis rubicundis asperfos, capitulum ostendit puniceum, quod floribus nondum apertis constat, floret in Maio.

Orchis gen^o illud quod *Tüfels angficht* vocant, flore albo, item flore purpureo, vel communi, floret Iunio. In genere testiculorum, odoratiores sunt, quibus flosculi minores.

Orchis, id est, testiculi herbæ genera quædam: ex quibus id quod Serapiadem vel triorchin aliqui esse putant, in fine Maij, & initio Iunij apparet, deinde nusquam inueniri potest.

Oreoselinum aliud circa Basileam, floret Iulij principio.

Oreoselinum von Baden, floret Iul. & aliq species duæ oreoselini.

Origanum vulgare, floret Iunij fine, Iulio & Augusto.

Orminum hortense & pratense *scharlach*, floret Iulio: ferè enim tardius floret satiuo. Sed Fuchsius orminum vtrunq; Iunio mense floribus & semine prægnans esse scribit.

Orminum hortense, id est, Gallitricum, vt recentiores multi putant, *Scharlach*/vel potius *alektorolophos*, id est, gallicrista, à folijs cristæ gallinacæ instar serratis, vnde & gallitrici vox corrupta videtur, floret Iunij

Iunij principio & medio.

Orminum sylvestre, floribus purpureis, nunquam prius mihi visum, floret 8. Iunij.

Orminum sylvestre, vel schlarea sylvestris, flore albo: & commune cœruleo, floret Maio.

Orminum sylvestre, quod & cœruleum & album inuenitur, floret Iunio.

Orminum vel gallitricum sylvestre, flore cœruleo, semen fert Iulio.

Ornithogalum, floret April.

Ornus, grosser mälboum/wielâsch, vt ego interpretor, floret Iunio.

Ornus aucuparia, wielâschen. Aug. fructum fert, & Sept.

Orobanche nostra, quam nonum satyrij genus Tragus facit, floret Maio.

Orobanche Ruellij, floret Aug.

Oxalis, floret Maio.

Oxyacantha, Berberis, Erbßlen. Sed aliqui spinam albam vulgò dictam oxyacantham potius esse asserunt, quibus assentior: vtraq; floret Maio, fructum facit Aug. Sept. & Octob. Augusto autem collibus & locis calidioribus.

Oxylapathum vulgare, floret Aug.

Oxys, alleluia, floret April. & Maio.

DE COLLECTIONE

P

Panaces Chironium, herba Doria, ni fallor, quorundam, nonnulli Limonium Matthioli vocabant, quod tamen non probo: in horto meo floruit Iunio, aliâs Iulio, primo gradu amara.

Panicum, floret Iunio.

Papauer satium, floret Iunio, & Iulio.

Papauer cornutum, floret Iunio, Iulio & in fine Maij. Semina fert Nouembri.

Papauer erraticum, floret in fine Maij, Iunio, Iulio et Augusto: semen fert Septembri.

Paris herba, quam aliqui non rectè aconitum pardalianches faciunt, floret Maio.

Parthenium, matricaria, floret Maio, Iunij medio vel principio potius, & quandoq; Iulio.

Pastinacæ genera tria, radicum colore distincta, florent Iulio.

Pastinaca maior, Pastaney, semen fert Augusto.

Pastinaca erratica purpureo apice in medio umbellæ candidæ, vogelnâst, floret Iunio & Augusto: semen profert Septembri et Octobri.

Pastinacæ genus erraticum umbellis luteis, elaphoboscus quorundâ, floret Iunio.

Pastinaca sylvestris, umbellis luteis, Bren
Fraut/

Frant, diuersa à Dauco syluestri, quem Dioscorides Pastinacam syluestrem vocat; floret Iunio & Iulio.

Pecten veneris, floret Maio, in aruis, qui post flores albos relinquit siliquas tanquam acus: & Iulio.

Pelecinus floret Octob. Securidaca.

Pelecinus syluestris, herba & frutex in colle propè Scaphusiam, floret Maio.

Pentaphylli, id est, quinq; folij, tria genera, florent Maio.

Pentaphyllum, floret Iulio.

Pentaphyllum minus, quod locis apricis & siccis nascitur, præcipuè collibus, floret Mart. aliàs Septemb.

Pentaphyllum petræum, in faxis iuxta aditum fodinæ Ferrariæ in monte supra Sergans: sed plantæ erant paucissimæ, floret Augusto.

Pentaphyllum erectum, magnam, candidum subdus, trib⁹ aut amplius à radice caulibus, floret Iunij initio

Peplus, esula rotunda, floret Iulio

Peplus, floret Maio.

Perfoliata, *Surchwads*, floret Iunio.

Perfoliata alia, quam aliqui ineptè centaureum maius vocant floret in fine Iunij in colle vbi calamentum gegē der sylb:ugg.

DE COLLECTIONE

Flores in corymbis sunt lutei, folijs octenis conditi, subamari, bono sed leui odore. Item in colle ob der Spitaaler wysen.

Perfoliata rubra, Iunio floret.

Perforata, vide Androsæmon.

Periclymenon, caprifolium, incipit flores Maij medio & fine, Iunio & Iulio: itemque Augusto, semen Septembri producit.

Periclymenon, Speck gilgen, principio Septembris floret. Bis floret in anno eadem ætate, sed fructum post secundum florem non potest perficere.

Periclymenus minor, gemellis acinis, rubentibus viscosis, Iulio fert acinos.

Perficus cuiuscunq; generis (trium generum) floret April.

Perficus Armeniaca, Berillele, floribus albis, odoratis, floret Mart.

Perficus, fructum Sept. profert.

Parfica duracina, carne rubenti, matura sunt Octob.

Perficaria maculata, quam aliqui molybdænam vocant, flore purpureo & albo, floret Iulio, & Iunio.

Perficaria, vide hydropiper.

Personata lappa maior, floret Iulio & Septembri.

Personata

Personata, Lappa maior, cuius seminis ad calculum vsus laudatur, semen fert Octobri.

Pes anserinus Tragi, & Fuchsj, Sewtod, nimirum Chenopus Plinij, floret Iulio.

Pes leonis, Sinnam, floret Iunio.

Petasites, pestilentz wurtz, floret Martio, Aprili, & quandoq; Feb.

Petroselinum Fuchsj, si in hortis feratur: putat autem id esse quod officinae vulgò amomum vocant: nesciens fortè Galenū scripisse petroselinum, verum & Macedonicum propriè dictum, adeo amarum esse, vt amarore suo totam Theriacam inficiat, quod amomo vulgò dicto non conuenit, id ego igitur potius ammi verum, aut cuminum Æthiopicū esse suspicor. Pro vero autem petroselino astrantia nostra, vti consulo, donec verum adferatur. Iam enim ex Macedonia & Cōstantinopoli nuperrimè quosdam detulisse audio.

Peucedanum Fuchsj, floret Aug.

Peucedanum in horto meo, caule dorantali, folijs crassiusculis per terram sparsis, vmbellis albis, floret Maio.

Phalangitis, grasgilgen, asphodeli foemina quibusdam: Et eiusdē species maior montana, odore & sapore in flore radiceq; lilij albi, floret Iul.

DE COLLECTIONE

Phalangium vel phalangites Kentmanni, in fine Iunij floret, Die wilden gras gilgely.

Phalaris folijs arundinis, flore gramineo, pallido, spica elegante & conferta, latiuscula. Olingerus Norinberga misit, floret Iulio.

Phillyrea nostra, ferngerren/ floret Maio.

Phœnix, roten wilden haber. Iunio floret.

Phu tota æstate floret. Fuchsius, qui Phu in maius, hortense, & minus, vulgare distinguit. Est & saxatile quoddam montanum, & palustre minimum, quod Aprili floret.

Phu hortense (& sylvestre in horto meo) circa finem & medium Maij floret & semen fert Iulio.

Phu (maius) Dioscoridis, floret Iunio.

Phu saxatile, & phu paruum saxatile, quod in vmbrosis & humidis montium saxis crescit, floret Aprili.

Phu minimum sylvestre, geniculatis radiculis, floret Aprili.

Philosella maior & minor. Maio & Iunio florent.

Pimpinella, floret Aprili, Maio & Iunio: Maior in pratis humidis Iulio: semen facit Iunio & Iulio.

Pimpinella, quæ & sanguisorba, Maio & Iunio floret.

Pirus plerunq; cum ceraso, floret Aprili.

Pirorum

Pirorum genera diuersa maturescunt August. & Sept.

Pira quæ à fœno denominamus *heuwbyren*, quod hæc sola immatura etiam fœno obruta & calore emollita, edantur, Iulio maturescunt.

Pira præcocia, & superba, *Muscatbyrle*, Iulio maturescunt.

Pira quæ nostris *heerenbyren*, maturescunt Aug. medio.

Pira quæ *schûrbyren* à nobis, maturescunt in fine Aug. & Sept.

Pira quæ nostris *Grauwengstler* dicuntur, à calore nomen habent, boni saporis, & succo mediocri prædita, id est, non sicca aut friabilia, maturescunt medio August. & post.

Pira quædam, præsertim strangulanea & syluestria, matura sunt Octob.

Pirola vulgò dicta, *wintergrûn*, quam quidam limonium putant, floret Iunij principio: ego bistortam pro limonio semper habui, nec dum muto sententiam.

Pisum, floret Iunio.

Plantagines florent Maio & Aug. Iulio item, quo & semen edit, itemq; August. Nouemb. & Sept.

Plantago maior vel media potius, floret Iun.

N

DE COLLECTIONE

Plantago minor, floret Iul.

Plantago aquatica, quam aliqui alisma veterum esse putant, floret Iunio.

Plantago aquatica semen fert Iul.

Pœonia, floret Maij principio & medio.

Pœonia, floret circa finem April. Mas in principio in horto meo, alias in fine, loco umbroso & hyeme longiore.

Polemonium, floret Maio & Iulio, præsertim eius principio.

Polemonium Dioscoridis, floret Iul.

Polemonium petræū, floret Iulio: & hoc & Dioscoridis dictum, suavius olent vesperi: in meridie flos ferè euanuit, vt hesperides dici mereantur, vtriq; ferè idem odor, suavis, non plenus.

Polemonium: quod duplex esse puto, vnum maius & longioribus folijs, nisi natalitij soli differentia est, floret Iun.

Polemoniū, Widerstoss, vt ego interpretor quod aliqui ben albū nō rectè vocitant, vt aliqui ocimoides album, in quo genere etiam rubrum habetur. Polemonium verò album tantum, floret Aug.

Polemonium Fontanoni in horto meo, floret Iunij principio.

Polemonium viscosum vel saxatile, floret Iunio.

Polemo-

Polemonium palustre, vide Gratiola.

Polemonium petrzum, floret Maio, semen fert Iunio.

Polium nostrum Maij fine & Iunij principio floret.

Polycnemon, langer doft, floret Aug.

Polycnemon, origano simile, floret Iulio & Septemb.

Polycnemon origano vulgari simile, sed raram, Lunariz speciem refert, folijs oblongis, asperis, albicantibus, crispis plerisque: flosculis ceu in umbella subflavis, singuli flosculi foliolis quaternis constant. Scui initio veris, & Octobris nono primum flores apparuerunt, in alijs verò nulli dum.

Polycnemon origano simile, quod & Clinopodion fortè appellari posset à figura: nam verticillum florum, aut seminum in summo caule impositum habet, veluti capitulum, vna hæc herba, quod sciam, semen Octob. facit.

Polycnemon vel Clinopodion maius semina gerit rotunda & subruffa, Nouembri.

Polygonatum, Weyßwurtz vtrumque, initio Maij floret, vel medio: alterum tamen prius sæpe Aprili.

Polygonatum erectum, semen fert Aug.

DE COLLECTIONE

Polygonon, wāgtritt, floret Aug.

Polypodij radix colligenda est in fine Augusti.

Polytrichum Apuleij, vt quidam vocant, guldinwiderthon, floret Iun.

Populus suis iulis, floret Mar.

Populi nigrę gemmę turgentes colliguntur mense April.

Populi nigrę gemmę, mensis Sep. 19. turgere succo suo flauo vidi: & fortè is hoc tempore vtpote sicciore melior est, & minus aqueus quàm vere.

Porrum, floret Maio & Aug.

Porrum sectiuum syluestre in rupibus ripę Rheni zū Clausenberg, floret Iun.

Portulaca, Iunio & Iulio floret.

Potamogeton, Sanfraut, floret Iul.

Prunella vulgò dicta, floret Maio, Iunio, Iulio, August. Septemb. Octob. & Decemb. mensibus.

Prunus plerunque cum ceraso, floret Aprili.

Pruni genera quędam urbana, inter quę tardissima sunt minima, cerea ferè per maturitatem. Zipparten, maturescant Septe. & Octob. Alia verò cerea magna sunt, quę Augusto, si benè memini maturantur.

Pruni genus, maturescit fructibus circa finem

finem Iulij, cui fructus parui cœrulei dulciores, blaue friechen.

Pruna cerea vel cereola, magna subdulcia, minima subcœrulea, acida, parum humida, Weynfriechen, maturescunt Aug.

Pruna nostra maturescunt Augusto.

Cœrulea, blaue friechen.

Haberfriechē fleiner dan die anderen.

Weynfriechen/fleine sure, subcœrulea vt & Haberfriechen.

Wyßfriechen/tardi⁹ aliquando matura gar vnd gar wyß.

Bockshödle halb wyß / halb rotlecht/aluum puto magis soluunt:& hæc aliqui alba vocant, sed minus propriè.

Prunus syluestris, in fine Martij floret perunq;, & April. principio.

Prunus syluestris, spinus, Schleehenbaum, Sept. & Octob. maturus est fructus.

Pseudamonium, floret April.

Pseudochamædrys, Schaaffkraut der wild, caule puto simplici & longiore, floret Iunio.

Pseudochamædrys, gamanderle, floret Maio.

Pseudocyperus corymbis fœtidis, semen fert Iulio.

Pseudomelanthium, Ratten, floret Iun. semen fert August.

N. 3

DE COLLECTIONE

Pseudonardus, vide Nardus vulgaris.

Pseudorhaponticum, folijs oblongis, florere puto mense Iunio circa finem.

Psyllium, Iulio & Aug. floret.

Parmice, floret Iunio & Augusto, quam Ruellium quidam sequuti pyrethrum palustre esse putant. Ego verò aliam noui parmice[m] montanam, folijs ferè plantaginis, flore aureo, radiculis ruffis, non sine odore, acribus, *Bälbe mütter wurtzen*.

Pulegium saxatile (regale puto quibusdā) polycnemon fortè, floret Iulio.

Pulegium ceruinum, floret Iulij fine Monspelij.

Pulmonaria Plinij, floret Mart. & April.

Pulmonariæ Plinij species, sine maculis foliorum, *kleine walwurtz*, floret April. Vide Symphytum.

Pulmonaria Gallis vulgò dicta, floret Maij fine, semen fert in Iulio.

Pulmonaria muralis, *Büchspick*, species syluestris Lactucæ, fortè reseda Plinij: nam similis eius vsus est hodie apud nos ad collectiones aut inflammationes sedandas, præsertim Paronychias, in quarum remedijs multi etiam incantationes adhibent, magis quàm ad vllas alias inflammationes, &c. floret Augusto.

Pyre-

Pyrethrum, in Aprili floret.

Pyretrum alpinum chamæmalo simile,
(perenne) radicibus repens, floret Iulio in
alpiibus nostris.

Q.

Quercus circa diem D. Georgij flores seu
cachryes suas emittit.

Quercus quædam fructificant, circa diem
D. Bartholomæi, aliæ tardius.

Quercus quædam glandes ferunt, quæ-
dam etiam pilulas fungosas : in quibus ver-
miculi conduntur : aliquando squamu-
las rotundas, candidas, in sinistro foliorum
latere, quas rustici flosculos vocant, indiciū
copiosi prouentus glandium anno sequen-
te: glandes Septemb. producit.

Quinquefolium, floret Iunio.

Quinquefolium minus in locis siccis, ra-
dicibus suis repit, floret Aprili & Maio.

Quinquefolium palustre floribus puni-
ceis, radicibus repens oblongis, floret me-
dio Maij.

R

Ranunculi genera hortēsia & syluestria, sar-
doniū, aruenſe, echinatis seminib. Aquaticū
flore plantaginis : & alterum minimū folijs

N 4

DE COLLECTIONE

minimis, multifidis, vt in cottula. Item flammeus. Item maior albus nō hortensis, tantū puto, apud nos: florent Maio.

Ranunculi species diuersæ, & quę apium risus vocatur, florent Iunio.

Ranunculi genus primum, Martio floret & initio Aprilis, deinde disperit.

Ranunculi genus quartū Fuchsius, quod vulgò vocamus Martios flores, qui albi & purpurei sunt: & secundū Fuchsiū etiā lutei, apparent Martio & Aprili.

Ranunculus sardonius, quem apium risus vocant, & alius quem aliqui flammulam, floret Aprili.

Ranunculus sardonius semen fert Maio.

Ranunculus hortensis, albus flore denso, florem ostendere incipit in fine Aprilis.

Ranunculi quidam (hortensis, flauus, dēsus) florent Iulio.

Ranunculi pratenses pauci, florent Oct. vt & hortensis, flore denso, paucus.

Ranunculus pratensis sine plumbo: cæteri enim præter aquaticos, pleriq; plumbum id est, maculas nigras habent, Causticus: florent Aprili.

Ranunculus pratensis, floret Septembri.

Ranunculus pratensis, hirsutus, floret Augusto.

Ranuncu-

Ranunculus albus in summo Braulio,
monte Rhetorum, folijs simplicibus oblon-
gis, angustis, &c. flor. Iul.

Ranunculus syluestris, albus, fiderische/
medio April. flor.

Ranunculus alpinus petreus, albus, ex
monte Pilati mihi translatus, flor. Apr.

Ranunculus palustris, quem Dodonæ-
us ouibus exitialem esse scribit, flor. Iun.

Ranunculus palustris am Farzen see/ flo-
ret Iulio.

Ranunculus chamæmeli folijs, rara her-
ba & caustica, locis palustribus, flor. Apr.

Ranunculus, rarus, flor. Nouem.

Ranunculus hannen süß/plumbum ha-
bet: interea serpit, in olera recipitur, flores
habet maiores, iuxta semitas crescit, Maio
flore.

Ranunculus humilis, radice crassa digi-
tali, causticus, rarus, flor. Apr.

Ranunculus parvus calyce inuerso, flo-
ret Maio.

Ranunculo cognata herba, quæ in ole-
ra admittitur, flor. Aug.

Raphanus æstate, flore Iul. & Octob.

Raphanus maior, flor. Maio.

Raphanus syluestris rapistrum, siliquis
acumatis, acribus, flore albo, flor. Maio.

DE COLLECTIONE

Rapistrum flore albo, vel sinapi agre-
ste, flor. Iun.

Rapistrum flauis floribus, heiderich/ flo-
ret Iul. August. & Octob.

Rapum, flor. Iun.

Rapum syluestre, flore

Calathi, cœruleo (Vuularias etiam vo-
cant.

1 Maius, quod medium putant, &
albo etiam flore inuenitur.

2 Minus, quod suis radicib. serpit.

3 Die rächten rapünzle/ in quibus
cœruleus color dilutior est.

4 Petræum, in muris.

5 Partense, flore in corymbos col-
lecto.

6 Vnguium instar recuruatis in sum-
mo floribus, in collibus & montib.

7 In spica quadam, in syluis, tolia ma-
culosa.

8 Non Maculoso.

Rapum syluestre, rapünzle/ floret Iun.
Iulio. Itemq; minus.

Rapi sylvestris species parua in muris,
campanulis cœruleis: primum & fermè vio-
læ folijs minoribus, flor. Iul.

Rapi sylvestris genus pratense, puniceo
flore in corymbis, confereto, & syluaticum
in mon-

in montibus cæruleo, floret Maio.

Rapum sylvestre petræū, augen fraut/
fl. c. fen. aut, flor. Aug. Vide Vuularia.

Rapum sylvestre, Rapünzle/ duorum
generum, commune quod procerissimum
est: minus cui corymbi sunt in summo: me-
dium folijs latiusculis, non longis vt primū,
(sunt & sylvestria quædam genera.) Item
minimum petræum in muris ciuitatis, flo-
rent Iunij fine.

Rapunculi sylvestris genus floribus cæ-
ruleis in se recuruis: Item die rächten Ka-
pünzle/ flor. Maio.

Rhamni genus Sandthorn/ fronthorn/
fructum fert Septem.

Rhaponticum spurium, flor. Iun.

Rhaponticum ignobile, collinū vel pra-
zense folijs angustis, valde dissectis, flo. Aug.

Rhapontici genus degener, flore rubro,
calyce squaroso, flor. Septem.

Raponticum minus & degener, calyce
infra florem, protuberante squamis alter-
nis viridibus & fuscis corticato, flor. Iul. Vi-
de Centaurium.

Rhododaphne vera, in horto Massarij,
flor. Iul. medio.

Rhododaphne, pumila. vel filius ante
patrem maximus, flor. Iul.

DE COLLECTIONE

Rododaphne minor vel herbacea *feura-
frant* / floret in fine Iunij aliàs in principio.

Ribes vulgò dictum, floret Martio, April,
li, Maio.

Ribes frutex vulgaris, cuius fructus, à
tempore, acinos D. Ioannis vocamus, Iunio
producitur.

Ribes syluestre, aquaticum, sabinæ ferè
odore, flor. Apr.

Rosa Maij sine spina, floret April. me-
dio & fine.

Rosæ minoris fruticis, quæ à Maio d-
nominantur, *Elleyen rōle*: circa Maij medi-
um florent in monte Alpjo propè Tigu-
rum copiosè proueniunt: inde in hortos
transferuntur.

Rosa vna & altera etiam Augusto, in ro-
seto meo nascebatur.

Rosæ, primum albæ, deinde purpureæ
vel incarnatæ, tertio rubræ, florent Iun.

Rosæ albæ & incarnatæ dictæ: & cynor-
hodon, flor. Maio.

Rosæ semina Septembri maturescunt &
Nouemb.

Ros solis, die 20. Iulij iam ferè deflo-
ruerat.

Rosmarinus, flor. Maio.

Rubia satiuâ in horto meo, floret Iu-
lij fi-

lij, fine, minima squinantia.

Rubię genus prauum, asperula puto, folijs per genicula inferius quaternis, superius binis, floribus albis, specie vt in Phu, floret Iun. & Iulio.

Rubia syluestris, flor. Iun. & Aug.

Rubia alia parua syluatica flosculis paucis violę dilutę colore, flor. Iul.

Rubea syluestris, waldmeyster / floret Augusto.

Rubea minor syluestris, flor. Maio.

Rubię syluestris species hepatica, hertz froyd / flor. medio & fine Maij, & Iun,

Rubea syluestris, floret Augusto, Sonchi genus vt videtur, floribus luteis, pastillicantibus, barbatis multis, calyce foliosa (vt & lactuę syluestris genus quod in area creuit, & aster Fuchsj) folijs molliter aculeatis, flor. Augusto.

Rubia palustris parua, flor. Iul.

Rubus humilis, chamębatus, floret Maio & Augusto.

Rubus maior, & minor siue chamębatus sua mora maturant Aug.

Rubus maior Augusto, & Septembri fructus fert.

Rubus maior, & florem adhuc, & fructum Augusto mense producit.

DE COLLECTIONE

Rubus Idæus, hindbeere/ Maio & Iulio
flore.

Rubus idæus in montibus semen fert
Augusto. Et quidam in monte Pilati sine vl-
lis spinis.

Ruscus in horto meo semel perpaucis
flosculis Martio floruit, anno 1562. & rursus
63. pluribus.

Ruscus flore medio & principio Apr.
in horto, medijs è folijs flosculi radiati cum
orbiculo puniceo in medio.

Ruscus florū rudimenta viridia, sed clau-
sa Decemb. ostendit.

Ruta flore Iunio, Iulio, & Augusto: se-
men fert Octob.

Ruta capraria, flore Maio: semen fert
Augusto.

Ruta, rara, flor. Nouemb.

Ruta pratensis, cui flos capillaris, vt viti
syluestri causticæ, flor. Maio.

Ruta pratensis circa finem Aprilis

S

Sabina, flor. Apr.

Sabina fœmina rudimenta quædam ger-
minum exiguorum ceu flosculos subluteos
in summis ramulis in Martio & Aprili o-
stendit.

Sabina

Sabina medio & fine Maij floret exiguis flosculis quadripartitis.

Sabina baccas profert Septembri, & Octobri.

Sabina flosculis exilibus, quadrangulis, albicantibus, flor. Iunij principio.

Salices incipiunt florere Martio, & Aprili mense, sed ante cæteras sylvestris latifolia.

Saliunca in horto meo è montibus Vallesæ allata mensis Septemb. 7. flosculos ostendere incipit.

Salvia, flor. Iul.

Salvia nobilis, floret Iunio: communis etiam incipit florere medio Iunij, Iulio.

Sambucus Maij medio floret & circa finem eius, Iunio etiam: baccas fert Sept.

Sambucus montana vel rubra, floret Aprili.

Sambucus montana, Büchholzer/ acinis rubris, non in umbella, sed ~~horrida~~ fert, in Iul. & Aug. maturescunt.

Sambucus aquatica Tragi, schwelcken/ in fine Maij floret, & eadem floribus densis hortensi cultu.

Sambucus aquatica flore denso sterilis: item in sepibus nascens, flor. Apr.

Sambucus aquatica Tragi: fructum Septembri facit.

DE COLLECTIONE

Sampfucus, maiorana, flor. Iul.

Sanicula vulgò dicta, floret Maio & Iun.

Sanicula alpina, flor. Apr. & Iul.

Sanicula alpina, guttata, id est guttis sanguineis in flosculis albis, flor. Maio.

Saponaria vulgò dicta, quam Struthium aliqui malè nominant, floret in fine Iunij, Iul. & Aug.

Satureia, flor. Iul. semen fert Octob.

Satureia sed rara, flores simul & semina matura habet Octob.

Satyrium basilicum, quod palmā Christi vocant, (vti etiam Ricinum) mas, sine maculis foliorum floret Maio & Iunio.

Satyrium basilicum fœmina, maculosa folijs, Maio flor.

Satyrium basilicum alpinum flor. principio Iulij: Rüssölble an à colore fuliginoso? sicut & Brendle? Styracem olet calamitham.

Satyrium basilicum alpinum, Brendle à colore, rüssölble, ab odore suauis puto, quo etiam rosas vincit. Rölble verò à figura flores in capitulum quasi clauæ coacti, floret Augusto.

Satyrij genus exiguum, in apricis montibus, flor. Iun.

Satyrij genus quoddam exiguum, autumno

cummo appetente, floret in vliginosis campis, & pratis, Septembri nempe.

Satyrion trifolium Fuchsj, quod potius orchis species fuerit, floret Iunio.

Satyrionis genus quadrifolium, folijs angustis, floribus purpureis, paruis, odoratū, lactis quodam odore, vt genus quoddam meliloti, flor. Iun.

Satyrion Erythraicum Augustæ in horto Berwarti/ flor. Apr.

Saxifraga Fuchsj, floret Iunio, *Maurer* rauten, vere, & æstate inuenitur, potissimū autem Iunio, hanc ego adiantum nigrum dixerim, sed ea nunquam floret.

Saxifraga maior seu alba, cui radix multis granis orbiculatis compacta est, flor. Maio: Deinde statim euanescit.

Saxifraga alba in fine Iun. flor.

Saxifraga granata flor. albis, flor. Ap. Semen verò habet in fine Augusti, & Septem.

Saxifraga pinpinellæ similis, vel hircina minor & maior. Item maior alpina, purpurea umbella in Pilati monte, flor. Iunio, Aug. & Nouemb.

Saxifraga hircina pimpinellæ similis, maior & minor: & maior montana, floret in horto meo in Iul.

Saxifraga montana, radice alba, nodosa,

O

DE COLLECTIONE

quam nulli alteri compares nisi saniculæ albæ Hæfforum, aut ægolethri radicibus initio: duplex est: alia folijs quinis, alia septenis, in vno coliculo, flor. Apr.

Saxifraga alba radicibus granulosis, floret Maio.

Saxifraga montana folijs quinis flore purpureo: alia septenis flore ex albo pallescente, floret ad finem Martij in horto meo.

Saxifraga aurea Dodonei, flor. Apr.

Saxifraga aurea Dodonei florebat Feb. cum tepidior ille esset.

Saxifraga lutea, umbella parua, floribus albis sui generis, radicibus luteis, flor. Iul.

Saxifraga semen fert Nouemb.

Scabiosa, (trium aut quatuor generum,) floret in fine Maij, Iunio, & Iulio. Paucae florent Octob. & Nouemb.

Scabiosa læuis, flor. Octob.

Scabiosa læuis & hirsuta minor, floret Iulio.

Scabiosa læuis & hirsuta minor, insipida ferè & hirsuta maior in montibus florèt Augusto.

Scabiosa maxima incipit florere Iunij medio. Item communis læuis & media aspera, floret vt prima.

Scabio-

Scabiosæ

Hirsuta folijs

Semper integris, in collibus & montibus, humidioribus locis.

Diuisis, in der spitaler wysen alicubi.

Læuis, plenus est ager polij hac herba, flor. Iul. decimo simul omnes.

Scolymus, cinara, Artischoc / floret Iulio.

Scordium, floret Iun.

Scordium in horto meo, floret Iulio, & Augusto.

Scorpioides secundum aliquos herba palustris odore borraginis, flosculis cœruleis, &c. vergiß nit mein / floret Maio, Iunio, & Iulio.

Scorpioidi palustri cœruleæ cognata herba, sed floribus albis, nec ita in se retortis, floret Martio.

Scorpioides minus, in muris, fleinet uer giß nit min / flor. Apr.

Scorpioides Matthioli in horto meo, floret Iulio flosculis luteolis, binis, an semper?

Scrophularia maior, Brunwurtz / floret medio Maij. Vide Climenum.

Secale, Roßhen / non (vt alij volunt) sili-go, flor. Iun.

DE COLLECTIONE

Securidaca, flor. Iul.

Sedum, id est, semperuiua, & species eius vermicularis dicta, florent Iunio.

Sedum maius vulgare, flor. Iul.

Sedum minus (vulgare) album & purpureum, flor. Iul.

Sedum minus obtusioribus folijs, flor. Iunio.

Sedi genus tertium, illecebra, *Maurpfeffer*/floret Maio.

Sedi montani genus, *fischzung*/ floribus candidis, guttis sanguineis, vt sanicula alpina, flor. Maio.

Sedi vel Phylli montani genera quædam, vnum longè minimis foliolis in orbem circinatis candicantibus, flosculis albis. Et duo sedi minoris genera floribus croceis, maculosis perpulchris, flor. Aug.

Sferra cavallo Italis, floret Iunij principio.

Senecio, *freutblum*/ floret Martio, Aprili, Maio, Iun. Iul. Octo. Nou. & Decemb. initio: In vineis Febr. Semen facit Octob.

Serpillum, flor. Iul. Aug. Septemb.

Serpilli quædam genera, odore inter se differentia: alia pilosa, albiora, alia glabra, alia sat ureiam odore refert quàm proximè & acrimonia ferè: quædam marginibus foliorum

rum punicantibus, florebat Iunij initio.

Serpillum acinarium, Moosbeere/acinis rubentibus, subacidis, astringentibus, floret Maio. Incipit autem eodem tempore in paucis à superioribus fructus se ostendere.

Sesamoides Anglor. flor. Maio.

Seselis genus in pratis palustribus, floret Aug.

Seseli montanum, semen fert Aug.

Sideritidis vel geranij species, herba Roperti, Iulio floret. Herba Iudaica. (Cognata ci quædam ex loco umbroso, vñ dem Bard/ in horto meo, caule quadrangulo, graui odore, floribus purpureis, tanquam vrticæ mortuæ dilutioribus.)

Sideritis prima quæ & Tetrahit, in aruis, floribus albis, flor. Aug.

Sideritis prima Matthioli: lancea Christi, flor. Iul.

Sideritidis species, gratia Dei, flor. Maio, & Iunio, & Octob.

Sideritis prima, Vide Lancea Christi.

Sideritis, Blütwurz/ floret Maij medio, & fine.

Silybus in montibus, überwurz/ floret Iulio, & Aug.

Sinapis duo genera Fuchſio, florent Iulio.

DE COLLECTIONE

Sinapi sylvestre vel lapsana floribus luteis in aruis, flor. Iun.

Sinapium sylvestre quoddam luteis floribus, floret Maio.

Sisarum hortense, flor. Iul.

Sisarū sylvestre Fuchsj, wildpasteney/ floret Iulio.

Siser, girgelin/ semen facit Septemb. maturescunt Octob.

Sisymbrium capitulis purpureis & albis, flor. Aug.

Sium, cardamine, Brunnenfressich/ floret Augusto.

Smilax hortensis, id est phasiolus, floret Iulio.

Smyrnum vulgo Libisticum, flor. Iul.

Solanum, floret Iulio, Aug. & Septemb.

Solanum commune & lignosum semen habet Nouemb.

Solanum perpetuum vulgò dictum aliquibus, ie lenger ie lieber/ cui flores cœrulei, acini rubri, fortè Malacocissus, floret Maio, Iunio, Iulio, & Augusto, semen facit Aug.

Solanum vesicarium, halicacabus, alkekengi, flor. Aug.

Solanum Indicum, floret medio & fine Iulij strychnodendron ad aquas stantes ferè.

Sola

Solanum pomiferū, poma amoris vulgò, flor. Aug. Iul. Iun.

Solanū syluaticum, baccæ vna cum flore, Aprili.

Solanum syluaticum tetraphyllum, non propagat sese in horto, flor. April. & principio Maij früzglefrant.

Solanum somniferum vulgare, schlaffbeere/ flor. principio & medio Iulij.

Solani somniferi genus, flore purpurascante, cauo, instar calathi, vt hyoscyami fore, floret Maio.

Solidago Saracenica heidnisch wunde frant/ flor. Aug. Virga aurea. Species eius alia maior neruo folij p uniceo, &c. in monte prope Sergans, flor. Aug.

Sonchus vterq;, Iunio, & Iulio floret, ci cerbita, gens distel.

Sonchus agrestis marginibus foliorum aculeatis, Augusto mense semen & flores emittit, semen fert Octob.

Sonchi genus quoddam syluestre, procerum, luteis floribus, subdulce, in horto meo, folijs non dissectis, angulosis, totum lœue est, id est sine aculeis, flor. Aug.

Sonchi species, terra crispa, lactuca syluestris Gal. flor. Iun.

Sonchi vel lactucę syluestres, flor. Nou.

DE COLLECTIONE

Sonchi species lævis, floribus lactucae paruis, luteis: herba est odore grauiore quam alia huius generis, frigidior scilicet, in muris nascitur, floret in fine Iunij, & Iulio.

Sonchi species, *milchen*/flor. Iul.

Sonchus pinguis, caulibus & neruis rubicundis, floret & semen facit Octob.

Sorbus, fructum fert Septem.

Sorbus torminalis, quam Tragus pingit, fructum fert Octob.

Sorgi, *welscher hirs*. Panicum Indicū vocant Parisijs, Iulio, & Aug. floret.

Spatula foetida, quam aliqui veterum xyrin esse conijciunt, flor. Aug.

Spica nardi herba vulgò dicta, flor. Iun.

Spina ceruina, flosculis viridibus circa novos surculos conferetim erumpentibus, odoratis, odore fragorum ferè perquam suauis, flor. Maio.

Spinæ ceruinæ acini leguntur, messis tempore Iul. mense, ad croceū colorē: autumnō (initio Septem.) ad viridem: circa D. Martini diem, ad puniceum.

Sphondylium, floret Iunio, Aug. Vide Branca vrsina.

Spina alba vulgò quam eruditi oxycantham putant, floret initio Maij.

Spinæ albæ species Fuchfio, vulgò carduus

duus Mariæ, *ſtechfrut*/floreſt Iunio & Iulio.

Spina alba Dioſcoridis, cardui genus, ſemen habet Auguſto.

Spina alba quorundam fructu echini marini ſpecie rotunda, floreſt Iulio.

Spina ſolſtitialis, &

Spina citrina, Argentinx in horto D. Didymi Obrechtii, floreſt principio Iulij.

Spina appendix, frutex ſpinofus, quem aliqui *oxiacantham* putant, vulgò *ſpina alba* dicitur, *wyßdoim*, Auguſto fructificat, Septemb. & Nouemb.

Spinachia olus, floreſt Iunio.

Stachys herba alba, hirsuta, odorata, *marrubio* congener, locis ſiccis & aſperis naſcens, bicubitalis ferè, caule quadrato, ſubacris, nulla verò amaritudine, quam ſux *Stachyi* Galenus tribuit, *marrubio* congenerem eſſe figura odorq; oſtendunt, *μηλιζει γάρ πῶς τὸν οὐλὸν ὁμοίως τῷ πράσιῳ*, deſcriptio Dioſcoridis planè cum hac herba facit. Habet non modò verticillos vt *marrubium*, ſed *ſtachyn* quoq; id eſt ſpicam ſupra in qua flores partim albi, partim purpurei, figura ferè vt in vrticæ mortux floribus, minores, floreſt Iulio.

Stachys Fuchſij, *Riechender andoim*, floreſt Iun.

DE COLLECTIONE

Staphisagria, floret Iulio.

Stichas, floret Iunio.

Stichas citrina, quam aliqui stichadem veterum, alij ageraton esse putant, Reinblumen, floret Iulio.

Stramonium, folio oleracio, grauis odoris, vt venenatae herbae frigidae. Flos conuulsiui, maior candidus: suauis odore nescio quali, medicato, alijs nuxmethel dicitur: Augustae etiam albo flore reperiri audio, floret Aug.

Symphytum maius April. floret: semen Augusto fert.

Symphytum alterum, floret Maio, Iunio, Iulio, walmurtz.

Symphytum alterum minus flore caeruleo purpurascete, Blauwer augentrost. V. Pulmonaria, floret April.

T

Tamarix. myrica, floret in vere, Iun. pappos verò suos fundit, in quibus nimirum semen continetur, Septemb.

Tanacetum, floret Iulio & August. semen fert August.

Tanacetum fatuum, floret in fine Iunij.

Tanacetum minus dixerim, quod Basileae circa Birsam nascitur, locis arenosis, odore
&

& sapore tanacetum referens, imbecillius tantum: umbellis ad millefolium accedit. Ramosa est herba, multis ab una radice caulibus, cubitalis ferè, folia quoq; nonnihil ad tanaceti folia accedunt, minora. Flores sunt minuti albicantes, radix lignosa, fibrosa. Meminit eius Tragus in millefolio & tanaceto, ambigit inter utrumque, floret Iunij initio.

Tarchon, floret Iulio.

Tarchon sylvestre serratis folijs, floret Iulij medio.

Taxus floret Martio: Acinos rubros umbilicatos fert Sept.

Telephium, id est, crassula maior seu faba inuersa, ut quidam interpretantur. Sed mihi diligenter conferenti Telephium Dioscor. (quod caput in veterib. exemplaribus non legitur) eadè planè herba cum tertio sedi genere (*Maurptäffer*) illecebra siue portulaca sylvestri (quod nomen utriq; tribuitur) esse videtur. Cæterum faba inuersa fortè fuerit epipetron Aristotelis, quod lib. 4. cap. 5. de partibus animal. etiam absolutum à terra, & suspensum diu viuere scripsit, & Hippocrates in lib. de vlceribus, ubi Cornarius non rectè ligustrum transtulit. Hippocratis locum citat Galenus libr. 4. Methodi, epipetro siccandi vim tribuens, ut doctissimus medicus

DE COLLECTIONE

Michael Alysius nos admonuit. Eadem & Anacampseros Plutarchi in libro de facie apparente in orbe Lunari mihi videtur, quā ait euulsam etiam virere & germinare adhuc: id quod facit ferè cacumine reflexo, nimirum quia paulatim siccatur, & ceu spasmo conuellitur, ut inde veluti amoris etiam redeuntis seq; reflectentis vim quandam habere superstitiosè existimata sit. Aniculæ nostræ talem vim vocant *widerthon*, ut in Adianto Apuleij. Hoc est quod Plinius dicit, *anacampserotis herbæ amores vel cum odio depositos redire*. Varinus quoq; meminit, apud Plutarchum non rectè *anacampseros* legitur. Nec aliud apud veteres reperio.

Thaliætrum, Aprili floret.

Thlaspi quod Matthiolus pingit, *bursæ pastoris* dictæ planè similis herba, ut pro ea fallere legentem possit, adeò floribus, folijs, fructu & magnitudine totaq; specie illam representat, sed gustu acri: floret Iunio. Aliud est *thlaspi Syluij*, quod alliū redolet. *Thlaspeos* folia non sunt incisa, ut *bursæ pastoris* adultæ.

Thlaspi Lucæ Gyni, amarum, floret Iulio in horto meo, Augusto & Octobri.

Thlaspi verum *Tragi* in aruis nascens, folijs cauli adhærentibus, ut in *sesamo*, *unicau*
le, &

le, & alterum multicaule in hortulo nostro,
florete Maio.

Thlaspi allium redolens vnicaule, idem
fortè Tragi, Maio florete.

Thymelææ genus illud (Zyland) & Februa-
rio & Martio florete, nisi nix impediatur.

Thymelææ generis quod nostri Zylād vo-
cant, baccae Septemb. rubent, cum florem
Februario ædat, vt nulli fortassis fructus à
flore tardius perficiatur.

Thymelæa, vide Daphnoides.

Thymus, huic flos etiam pro semine est,
Maio & Iunio florete.

Tilia urbana, circa diem D. Urbani (qui
est Maij 25.) florete, syluestris tardius quàm
latiua.

Tilia urbana: nam syluestris sterilis est,
Augusto fert semen.

Tithymalli quidam, vt helioscopius, &
myrsinites, florete Februario.

Tithymallus myrtites, principio Aprilis
florete.

Tithymallus folijs myrti ferè subhirsutis,
vnicaulis in aruis, alibi multicaulis, florete
Maio.

Tithymalli species myrti folio, florete Iun.

Tithymalli genus paruum in cultis, na-
scens, quibusdam peplus videtur, florete No-
uemb.

DE COLLECTIONE

Tithymallus minimus flores & semina ascendit Augusto.

Tithymallus heliotropius, floret Octob.

Tithymalli heliotropij semina in medio Nouemb. nondum matura reperi.

Tithymallus Helioscopius, floret principio Decemb.

Tithymallus Paralius albicans, in horto meo, floret Iun.

Tomentum (vulgaris herba) floret in horto meo Iul. medio.

Tormentilla, heptaphyllum serò apparere incipit, & cum iam vites florent, Iunio floret.

Tormentilla, floret Iul. Aug. semen fert Augusto.

Tormentilla, vide Heptaphyllon.

Tribulus terrestris in hortis satus, floret Iun. & August.

Trichomanes, carpitur estate, & autumnus initio.

Trifolij pratensis tria genera, florent Iun. Maio, Octob. & Nouemb.

Trifolium pratense album, floret Iun. August. Sept.

Trifolium pratense purpureum, floret Iunio & Aug.

Trifolium, steinklee (sapore medicæ) luteis
Tri-

floribus, nullo odore, flor Iul.

Trifolium odoratum Fuchsj, quod Mat-
thæolus ineptè cytisum facit, omninò est Lo-
tus, siue sativa, siue potius sylvestris: vide su-
pra, Lotus, floret Iun.

Trifolij species alta, inodora, florum co-
rymbis flavis, circa aggeres & dumeta, nitro-
so sapore, folijs in summo tantùm incisis, flo-
ret Iunio.

Eiusdem puto species alia in horto meo
sata, est Medica, flore violaceo, floret Iun.

Trifolium asphaltites, floret Iunio & Au-
gusto.

Trifolium asphaltites verum. Primo quo
nascitur anno, floret Iul.

Trifolium acre maculis foliorum, & ip-
sum albis, aliquando nullis puto, in colli-
bus siccis & aruis aliquando, floret Iun.

Trifolij genus calidius & tenuiorum par-
tium flore purpureo, rariore (folijs minus
latis nec maculosis) aliquando per ambi-
tum purpurascens, acris in gustu, ca-
lidis in tertio gradu, nascitur in collibus,
itemque aruis, floret in fine Iunij.

Aliud genus in area mea (Medica est) flo-
ret Iunij fine, folijs mucronatis parum, post
medium serratis, flosculis purpurascens,
sapore nitroso.

DE COLLECTIONE

Trifolij species floribus purpureis ad cœruleum inclinantibus per corymbos quinis aut senis, aliquando nouenis aut pluribus inodora, folia leuiter post medium serrata, Medica est, floret Iunio.

Trinitas, das guldinlärerfraut/alba, cœrulea, maior & minor, floret Februario.

Trinitatis (vt Itali vocant, nostri Hepaticam auream) flo. rudimenta, cœruleo colore proximè terram se ostendunt Decemb.

Triticum, floret Iunio.

Triticum vaccinum, Brand/füweizen, à Trago descriptum, inutile medicinæ, vitium tritici, floret Iulio.

Tussilago, Martio floret & etiam Feb. & Aprili.

Typha, Enospen, floret Iulio, herba nascēs in locis palustribus, gladioli aquatici folijs. Vocant autem locum palustrem Græci τῖφος per iota, & sic typha etiam herba scribi deberet, nisi fortè differentię gratia à typha tritici genere per y scriberetur.

V

Valerianæ diuersæ, vna plantaginis folio, odoratissima, floret in Alpibus nostris, Iul.

Valeriana minima, semina fert in fine
Maij

Maij cauliculis pedalibus cauis.

Valeriana, vide Phu.

Verbascum, floret in fine Innij, Iulio & Augusto: Germanis wulfrant.

Verbascum murale, in muris ciuitatis nostræ flores lutei in pappos soluuntur, vt in Conyzis in corymbis, floret Aug.

Verbasci genus apicibus purpureis, floret Aug.

Verbasco similis herba in muris nascens, flore luteo, &c. in nullo vsu, floret Sept.

Verbenaca supina, vt ego nomino, consolidam quibusdam dicta, flore cœruleo, *Blauw oder guldin gunsel*, floret Maio & Aprili.

Verbena, floret Augusto & Sept. semen fert Octob.

Verbena fœmina seu supina Fuchsiij circa canis ortum floret, & colligi debet. Item verbena recta & mas floribus luteis, sed aliquando citius. Sed posterior erysimi herbæ potius, aut sinapis similium uel (nasturtij, erucæ) genus syluestre fuerit: nā cum verbena nihil commune habet.

Verbena lutea Fuchsiij, floret Aug. & Sep.

Verbena altera Fuchsiij, floret Iun.

Verbena alba in locis vmbrosis, flor. Iul.

Verbena quædam rarior (è prouincia)

P

DE COLLECTIONE

pulchrior & maioribus floribus, si benè me
mini, floret Iul,

Veronica, Erenbryß, floret Iunio.

Vetonica, floret Maio.

Vetonica, vide Betonica.

Viburnum: vide vitis sylvestris, floret Au
gusto.

Vicia, floret Iunio.

Vicia minor, vogel wick, filique subrubre
antequam maturescant, floret Maio. Tüben
wick. Vicia maior, ist schier wie erbe, eodem
floret.

Viciæ genus floribus flauis, vide Aphace.
Viciæ quædam species (an Aphaca) angu-
stioribus, longioribus folijs, locis humidis,
floribus è cœruleis ferè, ad ripam lacus, flo-
ret Iunio.

Alia flore luteo, folijs binis: an orobus syl-
vestris? floret Iunio.

Viciæ sylvestres, florent Iun.

Vicia quædam sylvestris (circa sepes & a-
libi) floribus cœruleis, floret Iul.

Vicia montana, folijs latioribus, floribus
subcœruleis, radice nigra. Vicia floribus ru-
bicundis: Vicia sylvestris flore purpureo,
florent Maio.

Vincetoxicum, vide Asclepias.

Violæ Martiæ purpureæ seu nigre odo-
ratæ

rata & inodoræ: item albæ, quæ nigris præueniunt, florent. Mart.

Viola purpurea vel Martia, Iunio semen fert.

Violæ nigræ syluestres, florent Aug.

Viola matronalis Fuchſij, alba, purpurea, punicea, quam aliqui bacharin eſſe putant. Fuchſius hoc nomen ad imitationem vocis Germanicæ, *Fraumen veiol*, effinxit, nos quòd circa pentecoſtem florere incipiant, vocamus *pfingſtnägelc*, floret medio Maij, Iulio & Auguſt.

Viola trinitatis vel septicolor, heptachr⁹, floret April. Maio, Iunio, Octob. Nouemb. Decemb.

Violæ purpureæ odoratæ, inodoratæ & septicolores dictæ, florent April.

Violæ inodoræ genus, quam vulgò Trinitatis appellant, à triplici colore florū, aliqui iaccā, Iul. mense & flores & semina edit. Itali Trinitatem vocant hepaticam terrestrem.

Violæ inodoræ, quas nostri vocant septicolores, Iulio mense florent & semina proferunt.

Viola inodorata, quam septicolorem dicimus, floret Sept.

Viola multicolor inodora, floret Maio.

Viola quædā anonymos inodora est, è vio

DE COLLECTIONE

lacco purpurea, inter fruges (Auicularia Syl-
uij) floret Iunio.

Violæ genus inodorum, in aruis, albicâs:
in hortis purpureum & maius colunt, floret
Augusto.

Viola flammea, ut quidam vocat, Caryo-
philli Indici vel Portugallici, floret Sept.

Viola dasypus, vide paulo ante in Clema-
tide.

Viola alpina, folijs asari minoribus: floscu-
lo cœruleo; campanulæ instar conglobato,
sed minutatim dissecto, floret Maio.

Virga aurea, solidago Saracenica, floret
Iulio.

Virga aurea, vide Solidago.

Virga sanguinea Plinij (quam aliqui cor-
num fœminam putant) Itali sanguanum vo-
cant, hartrygel, floret Maio & Iunio: semen
fert Septemb.

Viscum, veris initio floret.

Viscum baccas fundit Septemb. & Octo.

Vitis sativa floret Maio & Iunio, & quæ-
dam Iulio: locis verò calidioribus fructum
profert Iulio & Augusto, & Septembri.

Vitis alba & nigra, floret Maio.

Vitis Idæa, heidelberg, ut ego ex Theo-
phraستي descriptione interpretor, floret Ma-
ior: acinos suos cum cerasis maturat mense
Iunio

Iunio & Iulio. Itemq; moosßbery, vitis Idæa maior Sueuis sic dicta.

Vitis Idæa duplex in alpibus nigra & rubra, cuius acini acidiores sunt, sine umbilico, maturefcunt Augusto.

Vitis syluestris caustica, nielen, quam & viburnum aliqui vocant, ab usu viendi. Galli viornam vulgò. Fuchsius non rectè vitem nigram facit, Iulio & Augusto florent: semē profert Augusto, Octob. & Nouemb.

Vlmus ante folia florem Martio producit, qui & fructus eius est.

Vlmaria, in fine Iunij floret: semen fert Septembri.

Vlmaria, vide Barba caprina.

Vnifolium palustre, läberblümly alicubi, semen Iulio fert.

Vrticæ, florent Iunio & Augusto.

Vrtica mortua flore purpureo, Martio floret.

Vrtica mortua, Binsang, floret Aprili, & Augusto.

Vrtica mortua, floret Octob.

Vrtica mortua, Galliopsis, floret Decem. principio, & semen facit Augusto.

Vrtica mortua, Lamium, floret Maio.

Vrtica mortua, & cognata ei quædam in ripa lacus nostri, conceptaculis florum spi-

DE COLLECTIONE

nos. Vim habet discutendi, floret Iul.

Vua crispa, *Frußelbeere*, floret Mart. April. Maio.

Vua crispa, Galli *grossularium* vocant, unde Germanica vox corrupta videtur, nimirum quod acini eius crassi quodammodo, hoc est, pleni, & solidiusculi sint, maturescunt Iunio: Frustui præpilantur reliquæ floris, etiam maturo.

Vua quercina circa radices quercuum, sub terra vere inuenitur, ut Christophorus Encelius observavit.

Vulneraria quædam corymbis florum luteis, dulcibus, glaucis quibusdam, non rectè. Flores sunt penè *wie gälte rubent röp fle/hasen fle*, floret Maio.

Vuularia siue campanula vulgaris, *halskraut*, alia quàm laurus Alexandrina, quam aliqui vuulariam vocant, floret Iulio.

Vuularia maior, flore intus piloso, ex cæruleo purpurascete. Campanula, *halskraut*, floret Aug.

Vuularia minima, *Glauber augentrost*: cuius flos calathi vel campanulæ instar, cærulei coloris est, herba lactescit, nascitur in muris & locis saxosis, floret Aug.

Vuularia pratensis, *Stane gloggenblumen*, vide Rapum sylvestre, floret Maio.

Vuula-

Vuularia illa quæ flores cœruleos habet,
qui prodeunt è singulis per caulem folijs al
ternatim positis, multos verò & conferctos
in summi caulis corymbo, floret Iun. Hæc
puto humilior & pratensis est. Item altera
maior, in horto meo, durat annos aliquot,
radicibus putō se propagat, floret itidem
Iunio.

Vuularia, vide Rapum syluestre petræū.

X

Xanthium, Lappa minor, Flein Fletten, se-
men habet Sept. & Octob.

Xiphion siue gladiolus, floret Iun.

Xiphium radice simplici Curio missum,
floret Iulio.

Z


Zea, spelta, Einform, floret Iunio.

TABVLA SE-

CVNDA STIRPIVM NOMINA
LATINA ET GERMANICA

continens, quæ singulis mensibus
aut florent aut fructum
maturant,

IANVARIO FLORENT.

 I frigidior sit, vt solet apud nos, nullæ
florent stirpes, nisi paucae forsan in
cellis aut hypogeis incluse: Sin tepi-
dior, circa finem eius aut florent, aut
florere incipiunt, eadem quæ Februario. Circa
medium huius mensis, locis præsertim apricis,
floret

Arthritica, cui flores singuli in singulis petio-
lis: hæc tepida ferè hyeme tota floret, & inde vsq;
ad aprilem, Schlüsselblümle.

Chelidonium minus, Flein schellkraut.

FEBRVARIO MAXIME CIRCA
finem, & locis calidioribus, florent.

Alfne, heennerderm, albis flosculis.

Alfins cæruleis flosculis.

Arthritica, de qua in Ianuario.

Arthri-

Arthritica communis syl.

Asarum, haselwurtz.

Bellis, Mullenblumen.

Buxus, Buchsbaum.

Chelidonium minus, flein schellwurtz.

Codiaminum.

Cornus interdum, thierlinbaum.

Coryli, haselstand.

Consiligo, leißfraut.

Crocus montanus.

Elleborus niger, Chistwurtz.

Erica montana.

Fragaria sterilis.

Fumaria, erdranch.

Leucoium bulbosum, wyß Hornung Blümen.

Myagrus.

Petasites.

Saxifraga aurea, guldin steinbredh.

Senecio.

Tithymallus Helioscopius.

Tithymallus myrsinites.

Trinitas, guldin läber fraut.

Tussilago, Roßhub/Brandlattich.

Zyland.

MARTIO FLORENT.

Alfinc due species, hânendarm.

Anemone species, Anemon rößlin.

Aristolochia phragmites.

Arthritica species.

P 5

MARTIVS.

- Arum, teut scher pfäffer.
 Azarum, Haselwurtz.
 Bellis minor, Nüllenblümlin klein.
 Betonica Pauli Turnero.
 Bulbus syluestris. Ackerzwibeln.
 Bulbina minor & maior.
 Bursa pastoris, Teschelkraut.
 Caltha palustris, Moßblümen.
 Clematis, peruinca, Blaw vnd Braun syno
 grün/yngrün.
 Consiligo, Leußkraut.
 Cornus, Thierlinbaum.
 Corylus. Haselstaud.
 Crocus montanus.
 Erica montana.
 Fragaria minor sterilis.
 Gramen duriusculum, Kiedtgras.
 Hedera terrestris, Gündelrüb.
 Helleborus vterq;, weiß vnd schwarz Nieß-
 wurtz.
 Herba trinitatis coerulea, Denckenblümlin/
 oder Dreyfalgkeit Blümlin.
 Hepatica terrestris vel aurea, Guldi läber-
 kraut.
 Hieracium quoddam.
 Hyacinthi genera quatuor, Hyacinthen.
 Leucoion, Keiri, Gelbnegeli.
 Leucoion bulbosum Theoph.
 Mercurialis syluatica.
 Penthaphyllon minus, Klein fünffinger Frut.
 Persicus

Persicus armenica, Berillen.

Pet. sites, Pestilenzwurtz.

Populus, Sackbaum.

Prunus sylvestris, Schlehdorn.

Pulmonaria, Lungenkraut.

Ranunculi genus primum, Ranenfuss / Moß
blumen. & Ranunculi genus quartum.

Ribes, S. Johans treibel.

Ruscus, Meißdorn.

Sabina foemina, Seuybaum.

Saxifraga aquatica.

Saxifraga montana.

Salices, Wydenbaum.

Senecio, Creutzkraut.

Taxus, Ibenbaum.

Thymelææ genus, Zylant.

Thussilago, Rossbüß.

Viola martiæ diuersæ, Violen.

Vlmus, Vlmerbaum.

Vrtica mortua purpureo flore.

Vua crispa, Kruselbeer.

APRILI FLORENT.

Aegolethras, Bößblüm. *Guinßblüm / Hippocrepis*

Allium vrsinum, Waldknoblauch. *ranunculus*

Alliaria, Knoblauchkraut.

Alnus, Erlenbaum.

Amomum falsum.

Amygdalus, Mandelbaum.

Antirrhinum, flore cæruleo. Vian.

A P R I L I S

Apij genus palustre.
Aquilegia, agleyen.
Aristolochia phragmites.
Arthritica odorata, schlüsselblumen.
Arthritica alpina lutea.
Arthritica pallida.
Asarum, haselwurtz.
Asphodelus marinus, ein geschlecht der gold
wurtz.
Bellis urbana & sylvestris, Müllen blümle.
Borrago, Buretsch.
Bryonia, hundtsfürbs.
Bulbine, Blaw meyen rößlin.
Betonica Aeginetæ.
Betula, Bircken baum.
Castanea, festenen baum.
Chamæmalum, Chamomillen.
Calathiana verna, Brendel blümli.
Caryophyllata aquatica.
Cerasus omnis, Firsy baum.
Chameleuce Ruellij.
Chelidonium minus, Klein schell Fraut.
Clematis Aegyptia, Peruinca, Ingrün.
Consiligo, Leuß Fraut.
Crucis flores.
Consolida quædam, gurselen/Bugla.
Cruciata folijs in geniculis quaternis.
Cyanus montanus.
Cynocrambe Fuchsj, id est, *Mercurialis syl-*
uestris.

Christo

Christophoriana.

Chamaebuxus.

Caros, Kümch.

Cerisolum, Rößlyfraut.

Calceoli diuæ Mariæ.

Caltha palustris.

Daphnoides Fuchsj, Zyland.

Daucus quidam sylvestris.

Elleborus agrytarum.

Elleborus rterq; weiß vnd schwarz Vieß-
wurz.

Esula, pityusa.

Esula dulcis.

Fagus suis Iulis.

Fragaria, Erdberfraut.

Fungorum genera, Psifferling.

Geranium primum, Storchenschnabel.

Geranium maius, vel montanum.

Gnaphalij genus, Mattenflachs.

Gramen vulnerarium.

Hedera terrestris, Gündelrâb.

Hieracium minus, dens leonis.

Heliotropio congener, Vergiß mein nütz.

Hepatica terrestris, trinitas, guldte leberfrut

Iris, Blaw gilgen.

Lapathum hortense, magnum, groß Lend-
wurz.

Lapathi vel acetosæ species.

Leucoion bulbosum.

Leucoium luteum, Geiß negeli.

A P R I L I S.

Ligustraria.
 Liliū conuallium, Meyenryßli.
 Liliū Mariae, vnser frauen gilgen.
 Lithospermon, Nieerhirsß.
 Lunaria Græca.
 Lunaria lutea, alyssos quorundam.
 Mespilus, Meispelbaum.
 Myrrhis, Wilderfoßfel.
 Narcissus quorundam, quibusdam liliū diuæ
 virginis.
 Nasturtium pratense, Wyssen Kressich.
 Nasturtium petraeum.
 Nux iuglans, Nußbaum.
 Ocimoides purpureum.
 Ornithogalum, Erdnuß.
 Oxys, Saurenklee.
 Pæonia mas, Pæonien rosen.
 Pentaphyllum minus.
 Persicus cuiuscunq; generis, allerley pfer sich
 böum.
 Petasites, pestilenzwurtz.
 Phu minimū syluestre, Baldrian gschlechter.
 Phu paruum saxatile.
 Pimpinella, Bibinell.
 Polygonaton, Weyßwurtz.
 Populus nigra, schwarz Sarbachbaum.
 Prunus, Kriechen ald pflaumenböum.
 Prunus sylvestris, Schlehdorn.
 Pseudamomum.
 Pulmonaria Plin. species, Kleinwalwurtz.
 Pyretrum,

Pyretrum, Bertram.

Pyrus, Byrbaum.

Quercus Eichenbaum.

Quinq; folium minus.

Ranunculi genus, quod flores Martij appellant,

Wolfsbülmen, hanenfuß.

Ranunculus alpinus, petraeus.

Ranunculus hortensis.

Ranunculus sylvestris albus, Fiedertsche.

Ranunculus Sardonius.

Ranunculus quem flammulam dicunt.

Ranunculus chamemali folijs.

Ranunculus humilis.

Ranunculus pratensis.

Ribes vulgò dictum, Sant Johans treffe
bel.

Ribes sylvestre, aquaticum.

Rosa Maij sine spinis, Meyenrößlin.

Ruta pratensis, thalictrum.

Ruscus.

Salices, Wydboum.

Sambucus montana vel rubra, Holder-
boum.

Sambucus aquatica.

Sanicula alpina.

Satyrion erythraicum.

Saxifraga aurea Dodonci, Steinbrech.

Saxifraga granata.

Saxifraga montana.

A P R I L I S.

Senecion, Creütz frant.
Solanum syluaticum.
Symphytum maius, Schmärwurtz.
Symphytum alterum minus.
Tithymallus myrtites.
Thymelæa.
Tußilago, Rosshüb.
Valeriana, Baldrian.
Verbenaca supina.
Vetonica, Graß blumen.
Viola heptachrus, matronalis, Winteruiolē.
Viola purpureæ odoratæ.
Vitis nigra & alba puto.
Viscum, Mistel.
Vrtica mortua, Taubneßlen.
Vua crispa, Kruselbeer.
Vua quercina.

S E M I N A P R O F E R V N T
& fructum.

Aristolochia phragmites.
Cyclaminum, Seuro brot.
Hepatica terrestris.
Nieß Beere.

M A I O F L O R E N T.

Abietes, Sannen.
Absinthij species, Wurmet.

Accr

- Acer maius*, Thorn.
Acorus falsus.
Alismatis species, Archus Fuchs.
Alliaria, Knoblauchfraut.
Allium alpinum.
Allium ursinum, Waldknoblauch.
Alfina species.
Alysson Plinij.
Alysson Ruellij.
Anagallis aquatica, Wasserpungen.
Angelica inodora, Angelicken.
Angelica odorata.
Antirrhinum, Diant.
Aparine, Klebfraut.
Aphace Fuchsj.
Apij aquatici genus.
Aquilegia genera omnia, allerley agleyen.
Asclepias, Schwalbenwurtz.
Asparagus, Spargen.
Argemone, Genseric.
Aristolochia clematis, Geschlecht der Oster-
lincey.
Argentaria alpina.
Barba caprina.
Barba senis, Habermarck.
S. Barbaræ herba.
Barba hirci, Hocksbart.
Bellis maior, Mülkenblümlin.
Betonica, Battonicken.
Betonica Aeginetæ, Turnero.

Q.

M A I V S.

Betonica species minor, Friesnägell.
Bistorta maior, Naterwurz.
Borrago, Buretsch.
Brassica, Rabiß / Edel Kraut.
Bryonia, vitis alba, Hundstürbs.
Englossus italica.
Cacalia lutea.
Calceoli D. Mariae.
Caros albus et purpureus, Wyßkümmel.
Caryophyllata urbana. et sylvest. Benedicks
 wurz.
Caucalidis species, caro similis.
Cerisolum, charephyllon, Rößly Kraut.
Chamaecyperissus, Cyp:ß.
Chamaedry similis, Schaffkraut.
Chamaepithys, Je lenger je lieber.
Chamaesyce.
Chamaesyce flore unico, paruo.
Chelidonium maus, Großschelkraut.
Chalidonium alpinum.
Cheiri, Gälbe negeli.
Chondrilla.
Christophoriana, costus niger.
Chrysanthemon Fuchs, Hanenfuß.
Cicuta, Scherling.
Cicutaria minor.
Clematis purpurea.
Colytea Fuchs.
Consiligo, Letißkraut.
Convolvulus arvensis, gschlecht der windel.
 Cono

- Convolvulus separius.*
Conyza alpina.
Cornus foemina, Thierlin boum.
Cotula foetida, Hundesdill.
Cruciatarubiae congener, Gulde waldmey.
Cucumis erraticus. (ster.
Cyanus, Kornblumen.
Cyanus montanus.
Cynoglossa, flore puniceo, gschlecht der hunds
Cynorrhodon. (zungen.
Daucus Tragi.
Dictamnus vulgo dicta.
Digitalis Fuchs Fingerhut.
Doronicum vulgo dictum.
Eruca hortensis, Weisser senff.
Eruca sylvestris Fuchs.
Eruca sylvestris nostra.
Eruca sylvestris foetida.
Eryngium, Raddestel/manstreu.
Erysimum, Hederich.
Esula.
Esula scabiosa non floret.
Flos Iouis.
Fraga, alba, rubra, Erdbeere.
Fraxinus aucuparia.
Fraxinella.
Fungorum genus praecipuum, Psifferling.
Genista maior, groß pfrimen.
Genistella, klein pfrimen.
Geranium, Blütwurtz.

MAIVS.

Geraniij genus secundum, Storchenschnabel.
 Geranium montanum.
 Gladiolus aquaticus.
 Graminis genera diuersa, allerley grass.
 Gramen Fuchsj.
 Gramen collinum.
 Gerontopogon.
 Geum, Benediktenkraut.
 Gratiola
 Hedera terrestris, Gündelreb.
 Heliotropium flore albo, Krebskraut.
 Hieracium, Sebuckkraut.
 Hyoscyamus vulgaris, Bilsamkraut.
 Iberis, Bauchblum.
 Illecebra, Maupfeffer.
 Iris, Blauwogel.
 Iris minor sylvestris.
 Isatis sylvestris, Wilderweyd.
 Iuniperus, Weckholterstaud.
 Lampsana, Wildsenffkraut.
 Lantana frutex Italicorum.
 Lappathi genera 4. Lendywurzen/Grind-
 wurzen gschlechter.
 Lathyrus, Springkorn.
 Lens palustris, Meerlinse.
 Leucoion, Keiri, Gelb negeli.
 Leucoium puniceum.
 Leucoium roseum.
 Leucoium album.
 Ligustrum, Beinhülzen.

Lilium

Liliū conuallium, Meyenrößlin.
 Liliū genus, quod pro Asphodelo vsurpatur.
 Liliū rubrum, Rottgülden.
 Liliū aquaticum.
 Lingua herba, Mäterzung.
 Limonium nostrum.
 Lithospermon, Meerbirß.
 Lithospermon minus.
 Unicaule
 Multicaule.
 Locusta, Müßlefraut.
 Lunaria Græca, Mionsfraut.
 Lunaria, Glüblumen/gäl.
 Lunaria montana,
 Lunaria lutea.
 Lupinus, Feigbaum.
 Malorum genera, Villerley öpfelbüm.
 Malua sylvestris, Wildpapelen.
 Medica cærulea.
 Meliloti sylvestris species, Wilderstein Flee.
 Meliloti inodori species.
 Melissa Fuchsj.
 Melampyrum, Rüweysen.
 Mercurialis, Scheißfraut.
 Mercurialis syluatica.
 Millefolium aquaticum.
 Moschatella Cordi.
 Myagrus, Flachdotter.
 Myrrhis, cicutaria, Wilderfößel.
 Narcissus, Narcisen blümlin.

MAIVS.

Nasturtium, Kressich.
Nasturtium palustre, Brunenkressich.
Nigella, Schwarzkümmel.
Nummularia, Pfennigkraut.
Nux vesicaria, Dimpelnüßle.
Nymphaea vtrq., Seiblumen.
Ocimoides rub. alpinum.
Ocimoides album.
Olusatrum.
Orchis genus bifolium, Geschlecht des Frauenkrauts.
Orchis herbe genera quaedam.
Orchis genus rarum.
Orminum sylvestre, Wilderscharlach.
Orobanche nostra.
Oxalis, Sauampferen.
Oxyacantha, Erbfeilen.
Oxys, alcluia, Sauwöllee.
Paeonia, Deonien.
Papaver cornutum, Gehdinter Nagel.
Paris herba, Wolfsbeer.
Parthenium, Mütterkraut.
Pecten veneris.
Pelecinus sylvest.
Pentaphylli tria genera, Waldwinden.
Periclymenon.
Peplus, Teufelsmilch.
Peucedanum.
Phu, Baldrian.
Phyllirea nostra, Kerngarten.

Piceae

Piccaſter.
 Pilofella maior & minor, Nagelkraut.
 Pimpinella, Bibinell.
 Plantagines, Wegerich.
 Polygonatum, Weyßwurtz. vtrunq.
 Polemonium.
 Polium noſtrum.
 Porrum, Lauch.
 Prunella vulgaris, Braunnellen.
 Pſeudochamædrys, Gamenderly.
 Pulmonaria Gallica, Lungenkraut.
 Quinq; folium minus, Fünfffingerkraut.
 Quinq; folium aquaticum.
 Ranunculi genera hortenfia et ſylueſtria, allee
 Raphanus maior, Kettich. (ley benenfuß.
 Rapi ſylueſtris genus.
 Rapunculi ſyl genus, flor cœruleo.
 Ribes vulgò dictum, S. Johans treübel.
 Roſe, Roſen.
 Roſa minor. Meyenröſlin.
 Roſe albe, Weyß roſen.
 Roſe incarnite, Leybſarb roſen.
 Roſmarinus, Roſmarin.
 Rubia minor, & ſyl. zame vnd wilde rötte.
 Rubus humilis, Aiderbrombeerſtaud.
 Rubus idæus, Rindbeere.
 Ruta, ruta prætenſis, Rauten.
 Sabina, Senybaum.
 Sambucus aquatica Tragi, Bolder.
 Sanicula guttata, alpina, Sanickel.

M A I V S.

Sanicula.
Sanguinea virga.
Saxifraga alba, Wyßersteinbrech.
Satyrium basilicum.
Scabiosa, Aposternfraut.
Sclarea sylvestris.
Scorpioides, Vergiß mein nit.
Scrophularia mas, Brunwurtz.
Sedigenus tertium, Maurpfäffer.
Sedum mont. Fischzung.
Serpillum acinarium, Moosbeere.
Sesamoides Anglor.
Seselis genus, Bärwurtz.
Sideritis, gratia Dei, Gottes gnad.
Sideritis. Blüt wurtz.
Sinapium syl. Wilder senff.
Spina alba, oxyacantha, Erbselen.
Spina ceruina.
Spina appendix.
Solani genus syluat.
Solanum somniferum.
Symphytum alterum.
Thlaspi alterum Tragi, Wilderfressich.
Thlaspi allium redolens.
Tilia urbana, Linder boum.
Thymus, Thym.
Trifolium pratense, Wylsen flce.
Trifolium, Biber flce.
Valeriana minima, Bald:ian geschlecht.
Valeriana saxatilis.

Vene

Veneris pecten.
Verbenaca supina, guldin gunsel.
Veronica, Ehrenbreyß.
Vetonica sylvestris, Nütwill.
Vicia flor. rubicundis, wicken.
Vicia montana.
Vicia sylvest.
Vicia minor, vogelwicz.
Viola Alpina.
Viola matronalis, pfingstnägele.
Viola multicolor.
Viola trinitatis, denckenblümle.
Viola alba & nigra, Violen.
Virga sanguinea, cornus foem.
Vitis, weynrâb.
Vitis idca, Heidelbeer.
Vnifolium.
Vrtica mortua, taubnessel.
Vulneraria, hasentlee.
Vua crispa, Fruselbeer.
Vuularia pratensis, Brune glockenblümle.

M A I O SEMINA FERUNT.

Aegolethros, Bößblüm.
Asarum, haselwurtz.
Cerasa, Kirse.
Fraga, Erdbeere.
Ranunculus Sardonius.
Saxifraga alba, weyßer steinbrech.

IV N I V S.

IV N I O F L O R E N T.

- Absinthium commune*, Wurmiet.
Abietes, Tannen.
Aconitum luteum, coeruleum, flauum, Wollf-
 wurtz.
Acorus vulgaris, Gälb wassergulgen.
Alcea, Rouwenzan.
Alliaria, Knoblauchkraut.
Alfinae Italicae.
Alfinae species, Beñendarm.
Amgracus, Mayoran.
Anagallis, Gauchheyl.
Anagallis aquatica, Bachpungen.
Anagallis rubro flore, Gauchheyl mit roten
 blümen.
Androsamon, Unser frouwen Bettstrouwe.
Anethum, Dill.
Antirrhinum purpureū, album, Sterckkraut
 mit roten blümen.
Antirrhinum folijs hyssopi.
Antirrhinum aruense, Großer süßer flec.
Aphaca species, S. Christoffels kraut.
Apios quorundam, Erdnuß.
Apium, Garten eppich.
Apium montanum, Berg eppich.
Argentaria.
Arthemisia tenuifolia, Wildercypreß.
Ar hritica alpina, Gschlächte der schlüffels
 blümen.

Aristo-

- Aristolochia clemat.* Lange osterlucy.
Asclepias siue hirundinaria, Vincetoxicum,
 Schwalmenwurtz.
Ascyrhoides, Gschlächt des S. Johannis
Aspergula, Bläberkraut. Kraut.
Asphodelus, Goldgilgen.
Astrantia, vulgò Laser.
Astrantia nigra, Schwartzmeisterwurtz.
Atriplices, Durchharts Freüter.
Auicularia Syluij.
Avena, Haber.
Ballote, Stinckender andorn.
Barba caprina, Ymbenkraut.
S. Barbara herba, Weysser senff/S. Bar-
 blenkraut.
Bellis maior, Geyßblümen.
Bellis albus & ruber, Weysser/rote müly-
 blümly.
Betonica altilis, Betonien/Graßblümen.
Betonica foetida.
Bistorta, Waterwurtz.
Blattaria Fuch. Gschlächt des wullkrauts.
Blitum, Meyer.
Blitum rubrum, Rotmeyer.
Botrys, Traubenkraut/Frottenkraut.
Branca ursina, Bärenklauwen.
Bryonia, Schmarwurtz/hundskürbs.
Bulgossun min. & ma. Ochsenzungen.
Bursa pastoris, Teschekraut.
Cepa, Zwiebeln/Böllen.
Calamintha, Steinmüng.

IV N I V S.

Calendula, Ringelblumen.
Campanula coerulea, Zäpflekrant.
Cantabrica quorundam.
Cardiaca, Hertzkraut.
Caros vulgò Carui, Weyssen Kümmech.
Carduus arvensis, Haber distel.
Cardui genus maculis albis.
Carduus palustris.
Caryophyllata, Benediktenwürtz.
Cassutha, cuscutha, Filtzkraut/flachs syden.
Centaureum minus, Tausendguldin kraut/
 Erdgall.
Chamaedrys vera, Gamanderlin.
Chamaecyparissus, Cypresskraut.
Chamaepithys, Ye lenger ye lieber.
Chamaemalum.
Chamaemalum nobile, Chamomillen.
Chelidonium maius, Schellwurtz.
Chrysanthemum Fuchsij.
Chrysanthemum verum, Goldblüm.
Cicuta, Schirling/falberkorn.
Cicutaria quaedam.
Cichorium, Wägwurt.
Clymenum utrunq;.
Condrylla, Wild Endiuien.
Consiligo, Letißkraut.
Convolvulus minor, Winden / zaunglog-
 Gen.
Conyca species, Dürrewurtz.
Conyza collina.

Corcho-

- Corchorus*, Gauchheyl.
Coronopus, Krayenfuß.
Costus hortensis minor, Costwurgel.
Cotyla foetida, Hundtsdill.
Cucumis anguinus, Gschlächt der Cucu-
 meren.
Cyanus mont. Gschlächt der Kornblumen.
Cymini sylvestris genus, Ritterspöly.
Cynoglossum, Hundtzung.
Daucus sepiarius.
Dauci tria genera, Wilde rüblin.
Dentillaria, aliquibus Schuppenwurz.
Digitalis Fuchsij, Fingerhut / fingerkraut.
Dipsacus albus & purpureus, Bartendistel.
Doria herba.
Dulcis radix, Süßholz.
Ebulus, Artich.
Echion, Wildochsenzung.
Eruca syl. Wilder weyßer sänff.
Erysimon Fuchsij, Hederich.
Erysimon hortense.
Faba, Bon.
Filius ante patrem, Schoßkraut.
Flos louis, Himmelrößly / Marienrößly.
Flos Portugall. Indianische nägele.
Foeniculum, Fänchel.
Fumaria, Erdrauch / rote taubenfröpfle.
Fungi, Pfifferling.
Gallion, Gälb augen trost.
Genista minor, Pfingstblumen.

IV N I V S.

Gentiana, Rentian/Bitterwurtz.
 Gentiana species, Madelgeer.
 Geranium, gratia Dei, Gottes gnad.
 Geraniū montanū, Gschlächte der Storchen
 Schnabel.
 Gladiolus, xiphiū, Klein Blaww schwertel.
 Gramen minus.
 Gratiola minor.
 Helxine cyssampelos, Winden.
 Heptaphyllon, tormentilla, Tormentill.
 Hieracij genus in pratis, Habichfraut.
 Hirci barba, Habermark.
 Hyoscyamus cōmunis & Syriacus, Bilsam.
 Hypericum minus, S. Johannis kraut.
 Iacea, D. Iacobi herba, S. Jacobs Blum.
 Iasminum, Veielrāben.
 Ibisus, Ybschen.
 Intubus sativus, Endiuien.
 Iulia Italis dicta.
 Lactuca sylvest genus procerum, Wilder lat.
 Lagopus, Katzenflee/hasenpfädlin. (riph.
 Lampsana flore luteo, Wild senffkraut.
 Lantana ital. Kleiner mälbaum.
 Lathyrus, Treybförner/springföner.
 Lauendula, Lauendel.
 Lens, Linse.
 Lepidium Aegineta, Art deß sänffkraut.
 Ligustrum, Kerngert.
 Lilij genus montanum, Art der gilgen.
 Liliū albū, crocēū & rubrū, Allerley gilgen
 Gschlächte. Lina

Linaria, Leynfrant.

Linum, Flachs. (brech.

Lubospermum, Meerbirß/weyßer stein-

Lotus inodorus floribus luteis, Ein fle-
schläch.

Lotus syl. Strandfrant.

Lunaria Fuch. Gschläch des Monatsfrant.

Lupinus, Fergbonen.

Lichen hepatica, Steinläberfrant. (frant.

Lysimachia flaua, Gälber weiderich/schoß

Lysimachia purpurea, Roter weiderich.

Malua syl. maior.

Malua magna, Ernrosen.

Marrubium, Lungentrant/erlichen läber-
frant.

Medica syluestris & hortensis, Art der fle.

Melampyrum, Büweißen aliquibus.

Melilotus inodora, alba, Steinfle.

Melilotus crispus.

Melilotus agrestis.

Melissa Fuchsij, Melissen.

Mentastrium, Wilde müntz.

Mercurialis, Scheyßfrant.

Millefolij species, Gard.

Millefolium commune.

Myrica, Tamarisc.

Myrrhidis species, Art des wilden petro-
line.

Narcissi species, Unser vrouwen gilgen.

Nardus vulgaris.

I V N I V S.

Nasturtium, Kressich.
Nigella coronata, Schabab.
Nymphaea vtrāq; Seebäumen.
Noli me tangere, Springkraut.
Nummularia, Pfännigkraut.
Ocimum Tragi, Heydenform.
Ocymon Basilicon, Basilien.
Ocymoides album.
Ocymoides rubrum.
Ocymoides croceo flore.
Oenante, Roter Steinbrech.
Olea, Ölbaum.
Ononis, Ochsenbräuch/heuwechel.
Orchis, Unser frauen trähen.
Origanum commune, Boden costenz.
Orminum vtrūq; Scharlach.
Ornus, grosser Mälbaum.
Ophris Fuchsi, Zweyblatt.
Panaces Chironium, Sonnenblumen.
Papauer Erraticum, Kornrosen.
Papauer triplex, Magsaamen geschlecht.
Parhenium, Mutterkraut.
Pastinaca erratica umbellis luteis.
Pentaphyllum erectum, Fünffingerkraut.
Perfoliata rubra.
Perfoliata, Durchwachs.
Perforata, Androsomon, S. Johanskraut.
Periclymenon, Späctgilgen.
Persicaria maculosa, Flöckkraut.
Pes leonis, Sinnauw.

Phoenix

Phœnix, Roten wilden haber.
Phalangium, Wilde graß gilgenli.
Phu(maius) Dioscor Baldrian.
Pilosella maior & minor, Nagelkraut.
Pimpinella, Bibenell.
Pyrola, Wintergrün.
Pisum, Erbs.
Plantago maior aquatica, Wasserwägerich.
Polymonium Fontanoni, Lidwey ch.
Polymonium viscosum.
Polium commune, Feldpolium.
Porrum sectuum, Louch.
Portulaca, Bürzelkraut.
Polytrichon Apuleij, Guldiwiderthon.
Polygonum, Wäggras/wägritt.
Prunella, Braunellen.
Pseudochamedrys, Schaaffkraut.
Pseudonardus.
Pseudomelanthium, Ratten.
Ptarmice, Mütterwurtz.
Quinq; folium, Fünffingerkraut.
Ranunculi diuersæ, Allerley moosblumen/
 hanenfuß.
Raphanus, Rettich.
Rapistrum flore albo.
Rapum syl. Rapunzly.
Rhaponticum spurium.
Rhododaphne min. Shürkraut.
Rosa, Roosen.
Rubia syl. species, Eschläch der rôte.

R

I V N I V S.

Rubus, Brombeerstand.
Rubus idaeus, Hindbeere.
Ruta, Rauten.
Sabina, Senuybaum.
Salvia nobilis, Edle salbey.
Sambucus, Holder.
Sanicula, Sanickel.
Saponaria, Wespfraut.
Satyrion trifolium Fuchsj, Gschlächt der Enn-
 benfraut.
Satyrion basilicon quadrifolium.
Saxifraga Fuchsj, Maurrauten.
Saxifraga pimpinella similis.
Scabiosa, Apostemfraut.
Scabiosa maxima.
Scordium, Wasser Battennig.
Scorpioides coeruleum.
Scrophularia maior, Biauwwurz.
Sedum, Haußwurz.
Sedum minus, Klaffenfraut.
Senecio, Creüzfraut.
Sphondylium.
Syderitis, Gottsgnad.
Sinapi, Sänff.
Sinapi syl. Wilder sänff.
Solanum perpetuum, Ye lenger ye lieber.
Solanum pomiferum, Nachtschatten.
Sonchus oleraceus, Genß Distel.
Sonchus levis.
Spicanardi vulgo dicta.

Spina

Spinae albae species.

Stachis Fuchsi, Riechender andorn.

Stichas, Rhein Blumen.

Symphytum alterum, Wallwurtz.

Thamarix, *Myrica*, Tamariscen holz.

Tanacetum fatuum,

Tanacetum minus, Reinfarn.

Telephium, Mundfraut.

Thlaspi, Wilder sänff.

Thymus, Thym.

Tilia, Linden boum.

Tithymallus parallius, Wolffs milch.

Tithymallus myrthites.

Tormentilla, Tormentill.

Tribulus terrestris.

Trifolia, Klee.

Triticum, Korn.

Verbascum, Wullfraut.

Verbena, Eysenhart/ eysenfraut.

Verbena altera Fuchsi.

Vicia sylvestres, Wild wicken.

Vicia, Wicken.

Vincetoxicum, Schwalmbenwurtz.

Vitis sativa & *sylvestris*, Weynrab zam vn.

Vlmaria.

(wild.

Viola septicolores, Sibenfarbwen blüme

Viola anonymos.

(lyn.

Virga sanguinea Plinij, Bartrigel.

Vrtica, Vießlen.

Vuularia flore caeruleo, Balß fraut.

R 2

IVNIVS.

FRUCTVS ET SEMINA
proferunt.

Alysson pratense.
Azarum, Haselwurz.
Barba caprina.
Caros.
Cerasus, Kirschenbaum.
Colchicon, Zeytosen/herbstblumen.
Fragaria maior, minor alba, Erdbeerfrant.
Filix, Farn.
Graminis vel auenae syl. genus.
Graminis genera varia, Mancherley gras.
Hordeum, Gersten.
Lapathum oxalys, Saurampfer.
Malus praecox, Paradyß opfel.
Malus verna.
Ocymoides rubrum.
Pimpinella, Bibenell.
Piper montanum, Zyland.
Polymonium petraeum.
Ribes, S. Johannis treibel.
Viola purpurea.
Vitis idaea.
Vua crispa, Krauselbeer.

IULIO FLORENT.

Absinthium commune, Wurmet.
Aconitum luparia dictum, Lelißfrant.
Aconitum coeruleum, Napellus, Wolffwurz.
Alcea

Alcea, Sigmarwurtzen.

Alge palust & fluviales, Wasser violen.

Alkali, Ein meerfraut.

Allium hortense & sylvestre, Knoblauch.

Alysson Ruellij.

Amaracus, Mayoran.

Ammi, Gschlächt des Kümmichs.

Anagallis purpurea, Gauchheyl mit pur-
purfarben Blümlinen.

Anagallis aquatica maior.

Androsæmon minus & maius.

Androsæmon Fuchsij, Künradt.

Anemone altera, Genserich.

Anethum, Dill.

Angelica aquatica, Wasser angelicken.

Anisum, Anis.

Anonis, Ochsenbrech.

Anthemis, Chamillen Blumen.

Antirrhini genus albis floribus.

D. Antonij herba.

Apij genera, Eppich gschlächter.

Apparine, Kleberfraut.

Aristolochia longa, Osterluccey

Arthemisia, Bcyfuß/rot Ruggeln.

Asclepias, Schwalinenwurtz.

Ascyron Fuchsij.

Asparagus, Spargen.

Aspergula, Kleberfraut.

Astrantia, Meysterwurtz.

Atriplex syl. Wilder Burchhart.

R 3

IV LIVS.

Ballote, Stinckender andorn.
 Bellis maior & minor, Metulle Blümlin.
 Beta duo genera, Weysser vñ roter man.
 Betonica, Bastonicken, Betonien. (golt.
 Betonicum altile, Steinnägely.
 Betonica Pauli.
 Blitum (album) Meyer.
 Borrago, Burretsch.
 Botrys, Traubenkraut.
 Branca vrsina, Bärenflawen.
 Bryonia, Hunds fürbs.
 Buphthalmus, cotyla non foetida, Kinds au-
 gen.
 Bursa pastoris, Teschelfraut.
 Cepe, Zwiebeln.
 Calamintha tria genera, Steinnümtz ge-
 schlächter.
 Calamintha montana.
 Caltha, Ringelblümen.
 Campanula, Balß kraut.
 Cannabis, Hanff.
 Capsicum, Indianischer pfäffer
 Caput monachi, haliacabus peregrinus.
 Cardiaca, Hertz gspan.
 Carlina, Eberwurtz.
 Carduus fine caule.
 Carduus aruensis maior.
 Carduus benedictus, Cardenbenedicten.
 Caryophyllus Indicus, Indianische nägele.
 Caryophyllata syluestris.

Centaur

Centaurium maius & minus, Tausend gul.
Centimorbia, Pfennigkraut. Dikraut.
Chamaecyparissus, Hirtzwurtz.
Chamaedrys vera, Gamanderly.
Chamaedrys f. Fuchsj.
Chamaeleon, Eberwurtz.
Chamaemelum, Camillen Blumen.
Chamaepithys, Ye lenger ye lieber.
Chamaesyce, Gschläch der wolffs milch.
Chondrylla minor, Genß distel.
Cicer sylvestre.
Cichorium, Wägwurt/wäglügen.
Cicuta aquatica, Schirling.
Cicutaria, Wilder Edißel.
Consolida regalis, Rittersporn.
Conuoluulus maior, Saungloggen.
Conuoluulo similis, Schwarz winden.
Conyza species, Gschläch d' dürrwurtz/
oder Donnerwurtz.
Conyza genus tertium.
Conyza muralis.
Conyza palustris.
Conyzoides.
Corchorus quidam.
Coronopus flore coeruleo, Kränsfuß.
Cucurbita, Kürbis.
Cumini syl genus.
Cyanus, Kornblumen.
Cyclaminus prima.
Cyperus, Cypressbaum.

I V L I V S.

- Cytisus suffrutux*, Weltsch Linsen.
Daucus sylvestris maior.
Daucus creticus, Bärwurtz.
Daucus palustris.
Dauci sylvestris species.
Dentillaria.
Dentillaria *σινι ποειδης*.
Digitalis duplex, Fingerhütkraut.
Dipsacus, Kartendistel.
Dorychnium Monff.
Draco hortensis.
Ebulus, Actenwurtz.
Echinopus meus.
Elleborus albus, Weyß Nießwurtz.
Eruca vera.
Eruca sylvestris, Wilder senff.
ἐρωια δ' ὕψαμις Polonor.
Eruca Fuchsij.
Eruum Fuchsij.
Eruum syl. minus, Eruen.
Eryngium marinum, Gschlächht der mans-
 treiw.
Erysimum hortense.
Erysimum sylvestre, Hederich wild vñ zam.
Esula tria genera.
Esula rotunda, *πέπλος*, Teüfelsmilch.
Eupator, Auic.
Eupator, Græc. Agrimüngen oder monig.
Euphrasia, Augentrost.
Filius ante patrem triplex, Braun ald rot
 weiderich. Flos

Flos Iouis, Himelrößli.

Flos Portugal, Indianische negli.

Fœniculum, Fenchel.

Fœnugrecum, Bockshorn/kühorn,

Fragaria, Erdbeerfraut.

Fru mentum turcicum, Türkisch Korn.

Fumaria, Kotte taubenrößli.

Gallion, Gelber augentrost.

Galiopsis, Braunwurtz.

Genista minor non spinosa & spinosa, Erda
pfrummen.

Gentiana species, Modelgär.

Glycyrrhiza, Süßholz.

Gnaphalion, Kürfraut.

Graminis genus, gschlecht deß gras.

Gratiola.

Hasenföl.

Heliotropium minus, Flein Frebsfraut.

Heliotropij genus, Vergiß min nit.

Heidenhyssop/Bruchfraut.

Helxine, tag vnd nacht.

Helxine cyssampelos, Winden.

Herniaria, Bruchfraut.

Hirundinaria, Schwalmenwurtz.

Hyperacium pratense.

Hypericum Fuchsi.

Hyperici species maior, S. Johansfraut.

Hyppuris vtrq;

Hyosciamus, Bilsamfraut.

Hyosciamus ex Syria.

I V L I V S.

Hyssopus, Byssop.
 Hyssopus alba.
 Diui Iacobi flos, S. Jacobs blüm.
 Iasminum.
 Ibisus, Ibschen.
 Intubus, Endinien.
 Inula, Alantwurtz.
 Iouis flos, Tondernägeli.
 Iua aruensis quedam.
 Lâberblümmün. *herba d'arue.*
 Lactuca syl Lattich.
 Lagopus, Hasen Flee.
 Lancea Christi, Matteredzünglin.
 Lapathum aquaticum, Gschlecht der grind-
 wurtz.
 Lappa maior, Kletten Fraut.
 Lauendula, Lauander.
 Lens, Linse.
 Lentibularia.
 Lepidium, Pfeffer Kraut/senffkraut.
 Leucoium marinum.
 Libanotis Italica.
 Libanotidis species.
 Lichen, Brunnen läberkraut.
 Limonium Fontanoni.
 Linaria, Flachsfraut.
 Linum, flache.
 Linum syl. Wilder flach.
 Lithospermum, Meerbirß.
 Locusta herba, Nüßlefraut.

Loti

Loti species.

Lotus sylvestris, Zigerkraut.

Lupini, Feig bonen.

Lysimachia lutea, *rubra*, gelb roth weiderich.

Maiorana, Mayoran.

Malva tria genera, pappelen schlecht.

Malva crispa.

Malva maxima.

Marrubium, Andorn.

Medica quaedam.

Melilotus lutea & *alba*.

Meliloti species, Stein fleck.

Melissophyllum, Melissen.

Mentastrium, Katzenminze.

Mentha, Minze.

Meon aquaticum.

Mercurialis, Scheiß kraut.

Millefolium, Garb.

Millefol. luteum.

Milium indicum, Indianischer hirs.

Myrica, Tamariskenholz.

Nardus vulgaris.

Nasturtium aquaticum, Brunnen fressich.

Nigella flore luteo, Schwarzkümel.

Noli me tangere, Springkraut.

Numularia Fuchsij, Pfennig kraut.

Nymphaea lutea, Seeblumen gelb.

Ocymus duo genera, Basilgen.

Ocymoides album & *rubrum*.

Ononis, Ochsenbrech/höwbrech.

I V L I V S.

Oreoselinum.

Origanum vulgare, Wilder wolgemitt.

Orminum hortense & pratense, Scharlach.

Osyris, Harnkraut/flachskraut.

Panaces Chyronium.

Papauer cornutum et erraticum, & sat. Mag
samen geschlechter.

Parthenium, Mütterkraut.

Pastinaca tria genera, geschlecht der rüblie
nen/vnd Bastney.

Pastinaca syl. Brennkraut.

Pecten Veneris.

Pentaphyllum, fünffingerkraut.

Peplus, Esula rotunda, teuffels milch.

Periclymenon, Speckgilgen.

Persicaria maculata, flöhs kraut.

Pes anserinus, Seewort.

Phalangitis, Graßgilgen.

Phalangitis maior.

Phalaris, Hispanisch saet.

Phu, Baldrian.

Plantago vtraq; Wegerich.

Pimpinella maior, Bibenell.

Polymonium palustræ.

Polymonium.

Polycnemion.

Portulaca, Burtzelkraut.

Potsmogeton, Samkraut.

Prunella, Braunnellen.

Psyllium, flöhs kraut.

Pulegium

- Pulegium*, Poley.
Pulegium saxatile.
Pulegium ceruinum.
Ranunculus parvus.
Ranunculus palustris.
Ranunculi quidam, Hanenfuß gschlechter.
Rapum syl. Rapünzly.
Rapi syl species.
Rapistrum, Hederich.
Rhaphanus, Rettich.
Rhaponticum minus.
Rhododaphne vera, Oleander baum.
Rhododaphne pumila.
Ros Solis, Sonnen touw.
Rubia palustris parua, Kleiner rötte.
Rubia sativa, Rötte.
Rubiae species, aspergula, Waldmeyer.
Rubia sylvatica, Wilder rötte.
Ruta, Kautten.
Sansuchum, Mayeran.
Salvia, Saluyen.
Saponaria, Weschfrant.
Satyrion basilicon alpinum.
Satureia, Garten brisop.
Saxifraga hircina duplex. Stein brech artt.
Saxifraga lutea.
Scabiosa trium aut quatuor generum, Apo-
 steinfrant.
Scolymos, Cynara, Artischatu.
Scordium, Wasser battenig.

IV L I V S.

Scorpioides Math.
Scorpioides quorundam.
Securidaca, Peltschen.
Sedum maius et minus, Groß vnd Klein haug
wurtz.
Serpillum, Quendel.
Sisarum hortense, Gerlin.
Sysarum s. l. wild pasteney.
Syderitis prima, Blüt wurtz.
Syderitidis species, herba Roberti.
Silibus, Eberwurtz.
Sinapis duo genera, Senff.
Smilax hortensis, Welschbonen.
Smyrnium, groß Eppich.
Solanum, Nachtschatten.
Solanum somniferum, Schlaffbeere.
Solanum perpetuum, Lenger ie lieber.
Solanum indicum.
Solanum pomiferum.
Sonchus vterq;, Gensdistel.
Sonchi species, Milchen.
Sorgi, Welscher hirsß.
Sphondylium.
Spica celtica falsa, Barentappen.
Spina albæ species Fuchß.
Spina alba quorundam.
Spina solstitialis.
Spina citrina.
Staphisagria, Speichelfrant.
Stachys herba, Weiß andorn.

Stor

Stoecha citrina, Kein blümen.
Symphytum alcerum, Wallwurtz.
Tanacetum, Keinfarn.
Tarchon, & syl.
Telephium, Wund Fraut/forzzwang.
Thlaspi Luca Gyni.
Tomentum.
Tormentilla, Tormentill.
Trifol. pratensis tria genera, Blee.
Trifol. bituminosum.
Triticum raccinum, Rüweizen.
Typha, Knospen.
Verbascum, Wullfraut.
Verbascum murale.
Verbena scemina, Eisenfraut
Verbena rara.
Verbena recta, mas, Eisenhart.
Vicia syl. Wicken.
Viola matronalis, Wintter violen.
Viola trivittatis, Senckenblümlin.
Virga aurea, Guldinrütt.
Vires quaedam adhuc, etlich weynraben.
Vitis syl caustica, Vielen.
Ulmaria.
Urtica mortua, Taubneßlen.
Vuularia, Heßle oder halßfraut.
Xiphium, Schwertel.

IN IVLIO SEMINA PROFERVNT.

Acer minus, Ahorn.

IV LIV S.

Aconitum coeruleum, Kappenblümen.
Anacampteros, Knabenkraut.
Anagallis, Gauchheil.
Anguria, Angurien.
Aron, Teutscher jamber.
Beinhölzer.
Barba caprina, Geißbart.
Caryophyllata, Benedickt wurtz.
Clematis Aegyptia.
Cerasa dulcia, Süße firsy.
Eldtsbeere.
Fraga rubra & alba, Erdibeere.
Lantana.
Lapathi genera, Allerley ampferenlendy
 wurtz.
Lilium conuallium, Meyenblümlin meyen-
 ryßlin.
Lunaria Græca, gschlecht des Mons Faut.
Mala præcocia, Paradyßopfel.
Mahaleb.
Nigella, Schabab.
Orminum, Scharlach.
Periclimenon, Speckgilgen.
Phu hortense, Garten baldrian.
Pimpinella, Bibenell.
Pira præcoria & superba, Muscatbyrly.
Pira à sceno denominaa, Höwbyren.
Plantago aquatica, Wegerich.
Pruni genus, Blauw friechen.
Pseudocyperus.

Pulmo.

Pulmonaria, Lungenfraut.
Rubus idaeus, Hindbeerin.
Sambucus, Helder.
Spina ceruina, Creutz bere.
Viola inodora, Dreyfaltigkeit blümli.
Vitis, Weynrab.
Vitis idaea, maior, Moßbeer.
 Wyßmoßblumen.

• AVGVSTO FLORENT.

Absinthium, Wurmet.
Abrotonum mas & foemina.. Stabwurtz.
Alcea, Sigmarßfraut.
Aconitum luteum, Rappenblumen.
Allium montanum, Bergknoblauch.
 Alprosen.)
Althaea, Ibschen.
Alysson, Klaffen Fraut.
Amaracus, Mayeron.
Amaranthus, Sainet blümē/tausend schön.
Ammi, Ammey.
Anagallis, Gauchheil.
Anacampteros, Knabenfraut.
Angelica odorata, Angelicken.
Angelica aquatica.
Arthemisia, Buckelen/Beyfuß.
Arundo, Ror.
Asclepias, Schwalmenwurtz.
Aster atticus Fuchs. Sternfrut/wägstrow.

AUGVSTVS.

Astrantia nigra.
Attractilis vtraq;, Wilder Veldsaffran.
Ballote, Stinctender andorn.
Balsamine vtraq;, Balsam öpfel.
Bellis hortensis, syluest. maior, minor, müllen-
 blümli.
Betonicum mont. duplex.
Borrago, Buretsch.
Botrys, Traubenfraut.
Buphthalmu, cotyla non fœtida, Rindsaug-
 fûdillen.
Bursa pastoris, Teschel fraut.
Bryonia, Hundsfurbs.
Calamintha montana, Stein müng.
Caltha, Ringelblumen.
Capsicum, Calcutischer pfeffer.
Carduus asininus com.
Caryophyllata syl. genus, Nüt willen.
Centaurium minus flore rubro, Tausendguld-
 dinfraut.
Chamæmalum, Chamillen.
Chamaesyce, geschlecht der wolffsmilch.
Chelidonium maius, Schellfraut.
Chondrylla, Wild endiuien.
Cichorium syluest satium, Sam Endiuien/
 wegwart.
Cici, Wundel boum.
Clinopodion. Steinpoley.
Cicuta, Schirling.
Cnicus, Wilder saffran.

Colo

Colchicon. Zeitloß/herbstblüm.

Consolida regia, minor, maior, Geschlecht v
Schwarz wurtz.

Conuoluulus maior, minor, Zunglogen.

Conuoluulo similis, Orobanche.

Conyza vtraq;, Dürr wurtz.

Conyza aquatica.

Conyzoides cœrulea.

Conyzoides in collibus.

Costi hortensis genus minus.

Cucumis erraticus.

Cucurbitarum genera, allerley Kürbisen.

Cuminum genus sylvestre.

Cyperus, Cypress.

Cyclaminus, Seiwurze.

Dauci genus. Wildrüblin.

Detrahit.

Dipsacus minor, Kartendistel.

Doronicum, Gemßwurtz.

Dorychnium.

Echinopus carduus.

Erica, Heide.

Eruca, Wilder weyßer senff.

Erysimum, Bederich.

Eryngium alpinum, Mansthrutzw.

Esula.

Euphrasia, Augentrost.

Eupatorium Mesuae, frömb leberkraut.

Eupatorium aquaticum.

Filius ante patrem maior & *maximus*, weiden
rich flein vnd groß.

AVGVSTVS.

Flos Portugal. maior, Indianische negeli.
 Flos Iouis, Himmel rößli.
 Foeniculum vtrunq;, Fenchel.
 Frumentum Turcicum, Türkisch Korn.
 Galliopsis, Braunwurtz.
 Gentiana minor & maior.
 Gentiana palust. Bitterwurtz gschlechter.
 Geranium gratia Dei, Gottes gnad.
 Geum, Benedicta, Benedicten fraut.
 Granum Nil.
 Helxine, tag vnd nacht.
 Helxine cyssampelos, Winden.
 Herniaria, Bruchkraut.
 Hyeracium vtrunq;, Gänßdistel.
 Hydropiper, Flöh kraut/wasserpfeffer.
 Hypericon, S. Johans blüm.
 Hyssopus, Byssop.
 D. Iacobi flos, S. Jacobs blüm.
 Ibisus, Ibis.
 Iberis Matthioli, Besemkraut.
 Inula, Allantwurtz.
 Lactuca sylvestris, Wilderlattich.
 Lagopus, Rätzlyflee.
 Lancea Christi, Aatterzünglin.
 Lathyrus, Springböner.
 Leucoia Medicorum.
 Limonium, bistorta, Aatterwurtz.
 Linaria, Flachskraut.
 Lotus urbanus, trifol. caballinum, Seiben-
 zeyt.

Lupus

Lupus salictarius, Hopfen.
 Ly simachij genera, gschlächter d weiderich.
 Malum insanum, Dollöpfel.
 Malua vulgaris, Pappeln.
 Malua hortensis maior.
 Malua crispa.
 Marrubium, Andorn.
 Marrubio similis herba.
 Medica floribus violaceis.
 Melilotus lutea & alba, Unser frouwen
 schüchlin.
 Melilotus inodora, Steinflee.
 Melon, Melopepon, Melan.
 Menthae genera, Münz gschlächter.
 Mentastrum, Wilde münz.
 Mercurialis, Scheyßfraut.
 Milium, Hirß.
 Millefolium album, purpureum, Garb.
 Morsus diaboli, Teufels abbiß.
 Nasturtium alpinum, Bergfressich.
 Noli me tangere, Springfraut.
 Nux Methel.
 Ocimum, Basilien.
 Ocymoides peregrinum.
 Ocymoides floribus albis.
 Ocymoides rubrum.
 Orobanche Ruellij.
 Origanum vulgare, Rohencostentz.
 Oxylapathum vulgare, Lendy wurtz.
 Papauer erraticum, Kornrosen.

AUGVSTVS.

Pastinaca erratica, Vogelknäuel.
Pentaphyllum petreum.
Periclymenū, Speckgulgen.
Persicaria, Pfersichkraut.
Petroselinum Fuchsj.
Peucedanum, Haarstrang/seriowenfchel.
Plantago, Wägerich.
Polycnemon, Langer doß.
Polymonium, Widerstoß.
Porrū, Louch.
Prunella, Brunellen/guldegungel.
Psyllium, Flöhkraut.
Ptarmice, Mütterwurz.
Pulmonaria muralis, Büchspick.
Ranunculus pratensis, Moßblum.
Rapum petreum, Augenkraut.
Rapistrum.
Raponticum ignobile.
Rosa aliquando, Rosen.
Rubus maior, humilis, Brombeer.
Rubia sylvest. Waldmeister.
Ruta, Kaurten.
Saponaria, Wäschkraut.
Satyrion, Unser frauen trähren.
Scabiosa, Apostemkraut.
Scordium, Wasser Rachenig.
Sedum vel phylli mont. genera.
Serpillum, Quendel.
Seselis genus.
Syderitis prima.

Sisym-

Sisymbrium, Vissch oder wasser münz.

Sylibus, Eberwurtz.

Sium cardamine, Brunenfressich.

Solanum, Nachschatten.

Solanum vesicarium, Alkekengi, Judenkirse.

Solanum perpetuum, Ye lenger ye lieber.

Solanum pomiferum, Goldopfel.

Solidago Sarracenica, Heydnisch wunda
Fraut.

Sonchus agrestis, Hasenföl.

Sonchi genus quoddam.

Sorgi, Sorgsamen.

Spatula foetida, Welsch schwertel.

Sphondylion.

Strammenia Stechöpfel.

Tanacetum, Wurmfraut.

Thlaspi, Gyni.

Tormentilla, Tormentill.

Tribulus terrestris, Burtzeldorn.

Trifolia, Klee.

Verbascum, Wullfraut.

Verbascum apicibus purpureis.

Verbena, Eysenfraut.

Verbena lutea Fuchsj.

Viburnum, Schlingbaum.

Viola matronales Fuchsj, Winter violen.

Viola nigra syl. Same vnd wilde violen.

Viola inodora.

Virga dura, Guldin rüt / Heydnisch wūd
Fraut.

AVGVSTVS.

Urtica, Nessel.

Urtica mortua, Taubnessel.

Vuularia minima, Blauw augentrost.

AVG. PROFERVNT SEMINA.

Aconitum luteum, Gälb wolffwurtz.

Anemone mont. gschlächt der fuchenschell.

Aron, Teütscher Ingber.

Balsamine pomifera, Balsam opfel.

Botrys, Traubenfrant.

Cerasa duracina, Knelkirse.

Cornus, Thierlinbaum.

Corylus sativa, Haselstand.

Dauci genus humile, Gschlächt des fümms.

Digitalis vtraq;, Fingerhut. (michs.)

Ebulus, Attich.

Eruca, Wilder weyßer pfäffer.

Ficus in Italia, Feygenbaum.

Filius ante patrem maximus, Weiderich.

Fraga, Erdbeere.

Gentiana cruciata, Gschlächt der Bitterwurtz.

Genistella, Pfrimmen blümle.

Herba S. Anthonij.

Hordeum, Gersten.

Hydropiper. Wasser pfäffer.

Hyosciamus Syriacus, Syrischen Bilsam.

Laurcola vulgaris, Zyland.

Lithospermon, Meerhirs.

Lotus

Lotus sylvest. Wilder steinlee.

Lunaria Græca, Gschlächter des Monats
Fraut.

Lupus salictarius, Bopfen.

Lysimachij genus purpureis floribus.

Mali diuersæ, Allerley opfelbaum.

Mala insana, Soll opfel.

Mercurialis mas & fœmina, Scheyßfraut.

Morus, Maulbeerbaum.

Nigella, Schwartz kummel.

Nux iuglans, Nußbaum.

Ocymoides peregrinum.

Oxyacantha, Erbselen.

Pastinaca maior, Rübli.

Phalaris, Canarien saamen.

Pira diuersa, Mancherley birein.

Plantagines, Wägerich.

Polygonaton erectum.

Pruna diuersa, Mancherley friechen.

Pseudomelanthium.

Quercus, Eichbaum.

Rubus Idæus, Hindsbeerin.

Rubus maior & minor, Brombeer.

Ruta capraria, Geyß raute.

Sambucus, Holderbaum.

Saxifraga hircina.

Seseli montan. Berg kummel.

Sonchus, Hasenöl/gänß distel.

Sorbus aucuparia, Vieläschchen.

Spina appendix, Weyßdoorn.

T

AUGVSTVS.

Spina alba Diolcor. Mariendistel.
 Symphiu magnu, Wallwurts / schwarz.
 Tanacetum, Wurmkraut. (wurtz.)
 Tilia urbana, Lindenbaum.
 Tormentilla, Tormentill.
 Trifolium bituminosum, Hartzklee.
 Vitis daea, nigra & rubra.
 Vitis syluest caustica, Vielen.
 Vitis satina, Weynraß.
 Vrtica mortua, Taubnessel.

SEPT. FLORENT.

Alfene maior, Lännendarm / vogelkraut
 Amaracus, Meyoran. (gschlächt.)
 Ammi.
 Asteratticus, Fuchsj.
 Ballore, Stinckender andorn.
 Bellis minor, Mülleblümlin.
 Betonicum altile, Graßnägel.
 Borrage, Boretzsch.
 Bursa pastoris, Täschlekraut.
 Calendula Ringelblümen.
 Calamintha mont. Gschlächt der Mäing.
 Cardamomu Arabicu, Calecutischer psäffer.
 Carduus asininus.
 Carduus benedictus. Cardobenedict.
 Chamemalum, Chamemillen.
 Cichorium syl. Wilder Endiuien art.
 Colchicon, Herpstblümen.
 Costus hortensis.

Crocus,

Crocus, Saffran.

Cucurbita, Kürbs.

Cyclaminū, Seiwibrot.

Dipsacus, Kartendistel.

Dorycnium.

Echion, Wilde Ochsenzung.

Ennea dynamis Polonor.

Erice, Heyd.

Filices, Farn.

Flos Iouis, Himmelrößli.

Fœniculum, Fändel.

Granum Nil.

Hieracium minimum.

Indici flores crocei.

Lactuca, Lattich.

Lactuce sylvestris genus, Wilder Lattich.

Lapathi genus, Geschlecht der Ländea
wurz.

Lauendula pauca, Lauendel.

Leucoia, Gälbe Vögeli.

Libanotis, *Coronaria*, *Rosmarinus*, Roß-
maryn.

Lotus urbana, Seibengezeyt.

Malua quædam domestica, Pappeln.

Malua crispa.

Malum insanum, Dollöpfel.

Mercurialis, Scheyßkraut.

Morsus diaboli, Teufels abbis

Nasturtium, Kressich.

Nil granum.

T 3

11

S E P T E M B E R.

Ocymoides peregrinum minus.
Pentaphyllum minus, Fünffingerkraut.
Personata, Groß Fletten.
Polycnemon origano simile.
Prunella vulgaris, Braunnellen.
Ranunculus pratensis, Moßblümen/hanen
Rhapontici genus degener. (fuß.
Saliunca.
Satyrii genus quoddā, Gschlächte der Stendel
Serpillum, Quendel. (wurz.
Solanum, Nachtschatt.
Trichomanes, Roter Steinbrech.
Trifolium pratense flore albo, Weissen Flee.
Verbascum similis, Gschlächte des wulfrants.
Verbena, Eysenkraut.
Verbena lutea Fuchsi.
Viola inodora, Sencckenblümlin.
Viola flammea, Dreyfaltigkeit Blümlin.
Viola autumnales caerulea, Gschlächte des
 Modelgeers.

S E P T E M B R I P R O F E R V N T semina.

Acer minus, Klein Maßholtern.
Acorus vulgaris, Gälb schwerttel.
Alnus, Erlinboum.
Amygdalus, Mandelboum.
Apium, Loppich.
Arbutus, Bagdorn.
Balsamine utraq;, Balsamöpfel.

Bellis

Bellis, Mäulenblümlin / Maßlieben.
 Betula, Birchen.
 Bryonia, Hundstürbs.
 Buxus, Buchsboum.
 Cardamomum Arabicum,
 Castanea, Kestenbaum.
 Cicuta maior, Schirling.
 Conuoluulus maior, Winden.
 Corylus syl. Wildhaselnuß stand.
 Cucurbitarum genera, Allerley Kürbisen.
 Dauci genus humile, Wilder Kümmel ge-
 Echion, Hundszung. schläch.
 Fagus, Buch.
 Ficus, Feigenboum.
 Foeniculum, Fenchel.
 Glycyrrhiza, Süßholz.
 Ilex aquifolia, Sträuchend palmen.
 Juniperus, Reckholteren.
 Lactuca syluest. genus.
 Lantana, Kleiner mälboum.
 Ligustrum, Kernigerten.
 Mala diuersorū generū, Mancherley äpfel.
 Nux iuglans, Nußboum.
 Nux vesicaria, Dimperrüßle.
 Ornus, Großer mälboum.
 Oxyacantha, berberis, Erbselen.
 Papauer erraticum, rheas, Koinrosen.
 Pastinaca erratica, Wilde rüblin.
 Periclymenum, Speckgilgen.
 Persicus, Pfersichboum.

SEPTEMBER.

Pirorum genera diuersa, Allerley biren.
Plantago, Wägerich.
Populi nigra, Schwartz Sarbach.
Pruni genera quaedam urbana, Siparten.
Prunus syluest. Schleehenboum.
Quercus quaedam, Etliche Eichboum.
Rhamni genus, Sandthorn.
Rosa, Rosen.
Rubus maior, Brombeer groß.
Sabina, Seuy boum.
Sambucus, Holderboum.
Sambucus aquatica Tragi.
Saxifraga pimpinellæ similis.
Sifer, Mören oder gälb rüben.
Sorbus, Sperwerboum.
Spina ceruina, Creutzbeer/wägdorn.
Spina appendix, spina alba, Mariendistel.
Tamarix, Tamarisc.
Taxus, Ybenboum.
Thymelææ genus, Wolfsmilch gschlächt.
Virga Sanguinea Plinij, Bartrigel.
Viscum, Mistel.
Vitis domestica, Weynrâb.
Vlmaria
Xanthium, lappa minor. Spitzflessen.
 OCTOB. FLORENT.
Alfinc mator & minor, Bännendarin.
Althæa peregrina.
Amaranthi Pliniani species.
Ammi.
Bellis maior & minor, flein vnd groß mü-

lin Blümlin/maß lieben.

Betonica altilis, Graßnägelin.

Borrago, Buretsch.

Bursa pastoris, Teschel frant.

Calendula, Ringelblumen.

Cardamomū Arabicū, Calceuscher pfeffer.

Cichorij genus, Nulchen.

Cicuta, Schirling.

Clematidis Aegyptie genus

Conyze genus, dürrwurtz gschlecht.

Costus hortensis, costwurtz.

Doronicum.

Erysimum hortense garten hederich.

Foeniculum, Fenchel.

Gentiana pumila, gschlecht der Enzian.

Herba Iulia, frömbd leberfrant.

Helxine, tag vnd nacht.

Hieracium alterum, Rösle frant.

Iberis Mathioli, Sentsfrant.

Iouis flos purpureus & albus, Bün Irößlin.

Iulia herba, frömbd läber frant.

Lapathum, Lendy wurtz.

Latoris Plinij.

Leucolum purpureum.

Libanotis coronaria, Rosmarin.

Lotus urbana & syl

Lunaria species, monns frant gschlechter.

Ocinoides, Basilien gschlecht.

Malua crispa, Winter rosen.

Nigella sativa, Schabab.

T ↑

OCTOBER.

Polycnemum origano simile.
Prunella vulgaris, Braunellen.
Ranunculi pratenses. Weißblumen/hanen-
fuß.
Raphanus, Rettich.
Satureia, Hünerfülle/Isöple.
Scabiosa, Apostemkraut/grindkraut.
Securidaca, Peltchen.
Senecio, Weinbrech/creutzwurtz.
Sideritidis genus, geschlecht des Juden-
krauts.
Sonchus quidam, Hasenöl.
Thlaspi Gyni, Wildkressich.
Tithymallus heliotropius, Milch kraut.
Trifolium pratense, groß flec.
Viola dasypus, geschlecht der Osterluecy.
Viola septicolor, Däncken/treysaltigkeits-
blümlin.
Vrtica mortua, Taubneßlen.

OCTOBRI SEMINA
proferunt.

Atriplex sylvest. wilderburchhart.
Cardamomū Arabicū, Calcutischer pfeffer.
Carduus asininus.
Cichorij genus, Wärgwart.
Conuoluulo similis.
Cornus, Welsch kirschen/kurbeere.
Cucurbita, Kürbsen.

Fraxi

Fraxinus, Aeschbaum.

Helxine, tag vnd nacht/S. Petters kraut.

Hieracium alterum, Teuffelskraut.

Iris non foetida.

Iuniperus, Wäckholterren.

Lepidium, Senffkraut/pfefferkraut.

Libanotidis ferulaceæ genus.

Ligustrum, Kerngert/Beynhölzlin.

Mala quædam, etlich öpfel.

Mespilus, Nâsplen.

Oxyacantha, erbselen/weynlegelin.

Pastinaca erratica, Wilde rüble.

Persica duracina, Rotte pferfich.

Personata, Klettenkraut.

Pira quædam, etlich biren.

Polycnemō, origano simile, gschlecht deß wil
den wolgemüts.

Prunus, Kriechenbaum.

Prunus syl. Schlehen.

Ruta, Reut.

Sabina, Seuenbaum/seuenpalmen.

Satureia, Hünnerfülle/Isöple.

Senecio, Creütz wurtz.

Sifer, Gelbe rüben.

Solanum amplexicaule, gschlecht der nacht-
schatten.

Sonchus pinguis, Hasenföl.

Sorbus torminalis, Baum der holzbirly
treget.

Verbena, Eisenkraut.

OCTOBER.

Viscum, Mistel.

Vitis urbana, Weynträben.

Vitis sylvestris caustica, Vielen.

Xanthium, Klein Kletten.

NOVEMBRI FLORENT.

Arthritica inodora, Schlüsselblumen.

Bellis hortensis Mülleblümle.

Borrago, Buretsch.

Bursa pastoris, Teschelkraut.

Calendula, Ringelblumen.

Carduus asininus.

Cichorium sylvestre, wägwurt.

Consiligo, Leißkraut.

Conyza Laniflora, groß dürrwurtz.

Fumaria, Erdrauch/rotte taubenkröpplin.

Hyssopus rara, Kirchen hyssop.

Iouis flos rarissimus.

Leucoia rara, Gälbe nägelin.

Locusta herba, Nüßlin kraut.

Mercurialis, Scheißkraut.

Ocymoides, Wildebasilien.

Papauer cornutum, Magsamen mit käsen.

Ranunculus, geißblumen/moßblumen.

Ruta, Rauten.

Saxifraga pimpinella similis, Steinbrech.

Scabiosa, Apostemkraut.

Senecio, /beinbrech /creütz wurtz.

Sonchi vel lactuca syl. Bajen. öl.

Thithy.

Tithymali genus paruum, Milchfraut.
Viola septicolor, Sänckenblümly.

SEMINA PROFERVNT NOVEM.

Alnus, Erlinbaum.
Carduus asininus.
Costus hortensis, Costwurtz.
Dipsacus minor, Kartendistel.
Ligustrum, Kerngarten.
Papaver cornutum, gehornter magsamen.
Plantago, Wägerich.
Polychnemon.
Rosa, Rosen.
Saxifraga, Steinbrech.
Solanum com. Nachtschatten.
Solanum lignosum, Je lenger ie lieber.
Sonchi & *lactuca syl.* Wilder lattich.
Spina appendix, Nälbcere.
Vitis sylvestris caustica, Vielen.

DECEMBRI FLORENT INITIO
 præsertim & locis tepidioribus.

Arthritica species quædam, Schlüsselblü-
 men geschlechter.
Bellis hortensis, Müllly blümlin.
Betonium altile, groß blümen.
Borrago, Buretsch.
Calendula, Ringelblümen.

DECEMB.

Cariophylli Indici, Indianische negeli.
Consiligo, Leußkraut.
Cynoglossus minor, Hundezung gschlecht.
Helleborus niger, Chustwurtz.
Hepatica aurea, Edel läberkraut.
Hypoglossis, Zepflinkraut.
Hieranij species apij solijs.
Laurus Alexandrina.
Lithospermi florum principia.
Ruscus, Neußdorn/Feerbürsten.
Senecio, Creutzkraut.
Tithymallus helioscopius.
Viola heptachrus.
Vrtica mortua, Taubneßel.

F I N I S.

